



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кадастровое дело № 004

Памятник природы регионального значения
«Исток реки Карасук»
Новосибирской области

Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)	Памятник природы регионального значения «Исток реки Карасук» Новосибирской области (далее – памятник природы)
Категория ООПТ	Памятник природы
Значение ООПТ	Региональное
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ	004
Профиль ООПТ	Ландшафтный
Статус ООПТ	Действующий
Дата создания, реорганизации	17.09.1997
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)	Сохранение естественных природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, охрана редких, исчезающих видов флоры, охрана растительного и животного мира, поддерживающего гидрологический режим целостности экосистемы истока реки, сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов, сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий, экологическое воспитание населения
Нормативная основа функционирования ООПТ	Охранное обязательство на государственный памятник природы областного значения от 30.06.1997. Межхозяйственный лесхоз «Коченевский» берет на себя обязательства по охране государственного памятника природы (приложение № 1)
	Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 17.09.1997 «Об образовании памятника природы областного значения «Исток реки Карасук» (приложение № 2)
	Постановление администрации Новосибирской области от 15.03.2007 № 24-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Исток реки Карасук» Новосибирской области» (приложение № 3). Общая площадь составляет 1200 га
Ведомственная подчиненность	Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Международный статус ООПТ	Не присвоен
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)	Не присвоена
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ	1
Месторасположение ООПТ	Новосибирская область, Коченевский район, Коченевский сельсовет

Географическое положение ООПТ	Границы территории памятника природы определяются на местности, с северо-восточной, юго-восточной и юго-западной сторон пограничной линией Коченевского района с Ордынским (12 км) и Чулымским (0,8 км) районами, с северо-северо-западной стороны граница памятника природы четко намечается по южной линии окончания пашни на всем протяжении площади памятника природы и началом интенсивной заселенности
Общая площадь ООПТ (га)	1200
Площадь охранной зоны ООПТ (га)	0
Границы ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 15.03.2007 № 24-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Исток реки Карасук» Новосибирской области». План границ памятника природы (приложение № 4). Географические координаты границ памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 5)
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют
Природные особенности ООПТ	<u><i>Нарушенность территории</i></u> Памятник природы находится по границе с пашнями и началом интенсивной заселенности с северо-западной стороны. С северо-восточной, юго-восточной и юго-западной сторон природный памятник находится по границе с Ордынским (12 км) и Чулымским (0,8 км) районами. Основными факторами воздействия на памятник природы являются колебания гидрологического режима и антропогенные воздействия. Из антропогенных воздействий можно выделить охоту и сопутствующий ей отдых. На растительные сообщества эти воздействия оказывают незначительное влияние. Кроме того, на территории памятника отмечены следы пожаров, повторение которых нежелательно. Состояние памятника природы удовлетворительное. Проводятся работы по обустройству: установка аншлагов, уборка имеющегося мусора, проведение противопожарных мероприятий (прокладывание противопожарных минерализованных полос)
	<u><i>Краткая характеристика рельефа</i></u> Рельеф плоский с наличием тростниковых займищ и наличием блюдцеобразных западин. Высота истока 190 м над уровнем моря
	<u><i>Краткая характеристика климата</i></u> Климат умеренный континентальный. Средняя температура самого холодного месяца – января -24 градусов С, самого теплого – июля +18,7 градусов С. Среднегодовое количество осадков 375 мм, толщина снежного покрова 60 см, а максимальная глубина промерзания грунта 220 см. Снежный покров держится в среднем 160 дней
	<u><i>Краткая характеристика почвенного покрова</i></u> Почвы луговые речных долин, черноземы выщелоченные с участием черноземов оподзоленных, лугово-черноземных и луговых выщелоченных. Почвообразующими породами являются озерно-аллювиальные легкие и средние суглинки, иловато- и пылевато-

	песчаные
	<u>Краткое описание гидрологической сети</u> Исток реки находится в болотистой местности. Болота составляют 160 га (13,3 % от общей площади памятника природы). Река течет на юго-запад по междуречью Оби и Иртыша и теряется среди бессточных озёр на границе с Казахстаном. Питание реки преимущественно снеговое. Основной водный сток проходит в весенний период. Средний из наибольших расходов воды 75,4 м³/с, максимальный расход воды достигает 307 м³/с. Диапазон сезонных колебаний уровня воды составляет около 2,8 м. Ледостав длится в среднем 178 дней (с конца октября до середины апреля). К середине марта толщина льда может достигать 1 м. Река зимой перемерзает, а в летнее время часто пересыхает. Средняя мутность воды около 100 г/м³. Вода реки по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу. Гидрологический режим поддерживается богатым и разнообразным растительным покровом. Имеет большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение
	<u>Краткая характеристика флоры и растительности</u> (приложение № 6)
	<u>Краткие сведения о лесном фонде</u> Коченевское лесничество. Коченевский лесохозяйственный участок № 2; с-з «Верх-Карасукский»; квартал 95, выд. 22 ч., квартал 99, выд. 2, 7, квартал 100, выд. 15, 16, квартал 101, выд. 3, 4, квартал 102, выд. 1
	<u>Краткие сведения о животном мире</u> (приложение № 7)
	<u>Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира</u> (приложение №8)
	<u>Суммарные сведения о биологическом разнообразии</u> Всего объектов животного мира 246 видов, в том числе: – 123 вида позвоночных животных, из них зарегистрировано 93 вида птиц, 22 вида млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся; – 123 вида беспозвоночных животных. Наиболее разнообразной группой позвоночных животных являются птицы из 11 отрядов. Класс Млекопитающие из 5 отрядов. Среди земноводных 2 вида относятся к отряду Хвостатых, 3 вида – к Бесхвостым. Все отмеченные виды пресмыкающихся являются представителями отряда Чешуйчатых. Флористическое разнообразие памятника природы представлено 189 видами высших сосудистых растений, из которых 4 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие». В Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) включены 123 вида животных, 2 вида высших сосудистых растений. В Красной книге Российской Федерации занесено: 4 вида животных, 3 вида высших сосудистых растений. В Красную книгу Новосибирской области занесено 13 видов объектов животного и растительного мира, в том числе: – 9 видов животных, из которых 7 видов отмечаются как «редкие» и

	«крайне редкие»; – 4 вида высших сосудистых, которые отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»			
	<u>Краткая характеристика основных экосистем ООПТ</u> Памятник природы лежит в лесостепном ландшафте среди березово-осиновых колков, лугов и болот, частично заросших кустарниками. Все эти элементы ландшафта служат регулятором сложившихся гидрологических условий и источником вод истока реки. Весь этот природный комплекс функционирует как единое целое: гидрологический режим поддерживается богатым и разнообразным растительным покровом, а функционирование последнего в значительной мере зависит от достаточного количества насекомых-опылителей. Район истока реки является экосистемой исключительного средообразующего значения и выполняет важную водоохранную функцию			
	<u>Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ</u> Элементы памятника природы, а именно березово-осиновые колки, луга и болота, служат регулятором сложившихся гидрологических условий и источником вод истока реки. Район памятника природы является экосистемой исключительного средообразующего значения и выполняет важную водоохранную функцию. Основной объект охраны на территории памятника природы – своеобразный комплекс фрагментов болотных экосистем, луга и березово-осиновых колков, а также популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения 13 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. На территории памятника природы выявлено 189 видов высших сосудистых растений, 93 вида птиц, 22 вида млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 123 вида беспозвоночных			
	<u>Краткая характеристика природных, лечебных и рекреационных ресурсов</u> Отсутствуют			
	<u>Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ</u> Отсутствуют			
	<u>Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий</u> Территория памятника представляет собой уникальный естественный природный комплекс лесостепных и болотных сообществ. Кроме того, данная территория носит большое водоохранное значение для реки Карасук. Степень сохранности уникальной фауны, флоры и растительности следует признать хорошей и нуждающейся в дальнейшем сохранении и защите			
	<u>Экспликация по составу земель</u> Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда			
Экспликация земель ООПТ	<u>Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов</u>			
	№ п/п	Категория земель	Площадь, га	% от общей площади
	1.	Лес	860	71,6

	2.	Болото	160	13,3
	3.	Сенокосные угодья	80	6,6
	4.	Пойменные луга	100	8,3
		ИТОГО	1200	100,0
	<u>Экспликация земель лесного фонда</u> Лесной фонд насчитывает 860 га, что составляет 71,6 % от общей площади территории природного памятника			
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)	<u>Факторы негативного воздействия</u> Памятник природы расположен с северо-восточной, юго-восточной и юго-западной сторон пограничной линией Коченевского района с Ордынским (12 км) и Чулымским (0,8 км) районами. К основным факторам антропогенного воздействия относятся: – охота и сопутствующий ей отдых (по динамике, регулярности и силе воздействия данного фактора на животный мир данных нет, на растительные сообщества эти воздействия оказывают незначительное влияние); – пожары (воздействие локальное, обратимое)			
	<u>Угрозы негативного воздействия</u> Возможно возникновение на территории памятника природы пожаров			
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ	Государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Коченевский лесхоз». Адрес: 632640, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Садовая, 1А. Телефон: 8 (38351) 2-43-61. E-mail: отсутствует Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2007, ОГРН: 1075464001744. Руководитель: председатель комиссии Яковченко Николай Александрович. Охранное обязательство: от 30.06.1997			
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют			
Общий режим охраны и использования ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 15.03.2007 № 24-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Исток реки Карасук» Новосибирской области». На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>запрещается</i> любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе: – предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; распашка земель; – заготовка растительной земли; строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; – проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;			

	– взрывные работы; – движение и стоянка автотранспорта; – устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; – самовольное занятие земель; – разведение костров, выжигание луговой растительности; загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; пастьба и прогон сельскохозяйственных животных; – заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира; – сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>разрешается</i> без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: – проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы; – сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство населением в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов; – проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; – организация экскурсий в воспитательных целях; – проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.
Зонирование территории ООПТ	Отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ	Охранная зона не установлена
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ	Многоконтурный земельный участок, состоит из 11 контуров. Кадастровый номер земельного участка: 54:11:028121:289. Адрес: Новосибирская обл., Коченевский р-н, Федосихинский сельсовет. Контур 1. Площадь: 365810,75 кв. м. Контур 3. Площадь: 149808,67 кв. м. Контур 5. Площадь: 56972,19 кв. м. Контур 6. Площадь: 51 362,86 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. Правообладатель (собственник): Крестьянское хозяйство Анцупова Михаила Ивановича.
	Многоконтурный земельный участок. Кадастровый номер земельного участка: 54:11:028121:294. Адрес: Новосибирская область, р-н Коченевский, с/с Федосихинский. Контур 49. Площадь: 41945,33 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

	Сведения о пользователях, владельцах и собственниках земельного участка отсутствуют. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ	<u>Музеи природы, информационные и визит-центры</u> Отсутствуют
	<u>Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы</u> Отсутствуют
	<u>Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения</u> Отсутствуют
	<u>Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха</u> Отсутствуют
Кадастровые сведения подготовлены	Гуляева Татьяна Владимировна. Главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Телефон: 8(383)296-52-25, e-mail: gutv@nso.ru

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

ОБЛАСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ

Межхозяйственный лесхоз "Коченевский"

(наименование предприятия, организации, учреждения, взявшего на себя обязательство по охране государственного памятника природы)

В ЛИЦЕ

ПОЗДНЯКОВА ГЕННАДИЯ СЕРАФИМОВИЧА

(фамилия, имя, отчество, должность)

ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ

И ИМЕНУЕМОГО В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ОХРАНЯЮЩИЙ», БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

"Исток реки "Карасук"

(название государственного памятника природы)

РАСПОЛОЖЕННОГО В

Коченевского района, Новосибирской области

(республика, край, область, город, район)

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННОГО В ПАСПОРТЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПЕРЕЧНЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР;

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ;

НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ О НАРУШЕНИИ УКАЗАННОГО РЕЖИМА.

АДРЕС «ОХРАНЯЮЩЕГО» р.п. Коченево, ул. Садовая № 1а

Директор межхозяйственного лесхоза "Коченевский"

ПОЗДНЯКОВ ГЕННАДИЙ СЕРАФИМОВИЧ

(фамилия, имя, отчество, должность представителя «Охраняющего»)

ответственного за охрану государственного памятника природы)

ответственного за охрану государственного памятника природы)

(подпись руководителя предприятия, организации, учреждения)

МЕСТО ПЕЧАТИ



30 июня 1997 г.



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

632630, р. п. Коченево, ул. Октябрьская, 43

24.03.97

№

На №

от

Об организации государственного памятника природы "Исток реки Карасук"

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Во исполнении решения седьмой сессии Новосибирского Совета депутатов от 12.11.91 г. № 4 Постановления главы администрации области от 09.04.92 г. № 170 для сохранения уникальных видов растительного и животного мира в их естественном состоянии и имеющих исключительное средообразующее значение, а также для научных, культурно-просветительных, хозяйственных и эстетических целей, администрация Коченевского района входит с предложением:

1. Образовать на территории Коченевского района Новосибирской области государственный памятник природы областного подчинения "Исток реки Карасук" площадью 1200 га в установленных картой-схемой границах с предоставлением земельного участка в бессрочное пользование /акт отвода земельного участка и карта-схема в масштабе 1:100000 прилагаются/.

2. Контроль за соблюдением режима использования земель памятника природы и его финансирование, администрация района просит решить в соответствии с Законом Новосибирской области от 31.01.95 г. "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области".

Глава территориальной администрации

А.А. Карасёв

АТИ



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.03.96

От _____

128-Р

№ _____

р. п. Коченево

О создании комиссии для
организации государственного
памятника природы
"Исток реки Карасук"

На основании решения седьмой сессии Новосибирского областного Совета депутатов от 12.11.91 N 40 и постановления главы администрации Новосибирской области от 09.04.92 N 170, с целью сохранения уникальных видов флоры и фауны в их естественном состоянии на территории Коченевского района и организации государственного памятника природы "Исток реки Карасук", создать районную комиссию в составе:

Председатель комиссии - Литвиненко А.В., зам. главы администрации района, председатель Совета райэкофонда

Члены комиссии:

1. Андрияненко В.А. - председатель районного общества охотников и рыболовов
2. Злобин А.М. - председатель АОЗТ "Верх-Карасукское"
3. Коротаев Е.Г. - председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов
4. Луцких С.А. - глава администрации Федосихинского сельского Совета
5. Поздняков Г.С. - директор межхозяйственного лесхоза "Коченёвский"
6. Руднов Ю.И. - председатель комитета по земельным ресурсам и землепользованию

Глава территориальной администрации

А.А.Карасёв



9ЖА



А К Т

выбора и обследования земельного участка для создания памятника природы "Исток реки Карасук"

В соответствии с распоряжением администрации Коченевского района от 24.03.97 № 128-р комиссия в составе:

Литвиненко А.В. — председателя комиссии, зам. главы администрации района.

Коротаева Е.Г. — председателя комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Руднова Ю.И. — председателя комитета по земельным ресурсам и землепользованию.

Позднякова Г.С. — директора межхозяйственного лесхоза "Коченевский"

Луцких С.А. — глава администрации Федосихинского сельского совета.

Злобина А.М. — председателя АОЗТ "В-Карасукский"

Андрияненко В.А. — председателя РОО и Р
произвела выбор, обследование и отвод земельного участка для организации памятника природы "Исток реки Карасук" (карта организации указанного памятника природы и положение о памятнике природы прилагаются)


Земельный участок, отведенный под памятник природы, находится на территории АОЗТ "В-Карасукское", на землях межхозяйственного лесхоза "Коченевский".

Исток реки Карасук лежит в заболоченной местности с различными биоценозами: лесными, кустарниковыми, луговыми, болотными. Это обуславливает разнообразие и относительное богатство животного мира данной территории на которой обитает 625 видов животных, в т.ч. 59 видов птиц, 17 млекопитающих, 5 земноводных, 3 вида пресмыкающихся и 541 вид беспозвоночных животных. Наибольшее значение для поддержания стабильности биоценоза имеют беспозвоночные животные и прежде всего насекомые-опылители. Другая важная группа беспозвоночных животных — насекомые-энтомофаги, которые сдерживают численность фитофагов, повреждающих растительный покров. Насекомые опылители и энтомофаги — главное богатство животного мира памятника природы "Исток реки Карасук"

Учитывая важность сохранения растительного и животного мира, которая присуща только истокам реки Карасук, комиссия считает необходимым создание государственного памятника природы "Истока реки Карасук"


Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Лист согласования
организации государственного памятника
природы "Исток реки Карасук"

1. Межхозяйственный лесхоз "Кочетовский"
2. АОЗТ "В-Карасукское"
3. Районное общество охотников
4. Федосихинская сельская администрация
5. Районный комитет по земельным ресурсам и землепользованию
6. Районный комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов



**НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕРВОГО СОЗЫВА**

РЕШЕНИЕ
(тридцать четвертая сессия)
от 17 сентября 1997 года

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИСТОК РЕКИ КАРАСУК»**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Новосибирского областного
Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

В целях сохранения и изучения растительного и животного мира своеобразного участка заболоченной местности, формирующей самые верхние истоки реки Карасук, расположенной в лесостепном ландшафте среди березово-осиновых колков, лугов и болот, частично заросших кустарниками, служащих регулятором сложившихся гидрологических условий и источником вод истока реки и функционирующих как единое целое, являющейся экосистемой исключительного средообразующего значения, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.95 г. «Об особо охраняемых природных территориях» и Законом Новосибирской области от 31.05.95 г. «Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области», Новосибирский областной Совет депутатов решил:

1. Образовать памятник природы областного значения «Исток реки Карасук» в Коченевском районе Новосибирской области.
(в ред. постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

2. Утратил силу с 29 января 2009 года. - Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11.

Председатель Совета
А.П.СЫЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2007 г. № 24-па****ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ
ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ИСТОК РЕКИ КАРАСУК» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 19.12.2007 № 196-па)

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» постановляю:

Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Исток реки Карасук» Новосибирской области.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

И.о. Губернатора области
В.А.ЮРЧЕНКО

Утверждено
постановлением
администрации Новосибирской области
от 15.03.2007 № 24-па

**ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ИСТОК РЕКИ КАРАСУК» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 19.12.2007 № 196-па)

Границы территории памятника природы регионального значения «Исток реки Карасук» Новосибирской области определяются на местности, с северо-восточной, юго-восточной и юго-западной сторон пограничной линией Коченевского района с Ордынским (12 км) и Чулымским (0,8 км) районами, с северо - северо-западной стороны граница памятника природы четко намечается по южной линии окончания пашни на всем протяжении площади памятника природы и началом интенсивной заселенности.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

Постановлением администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па в карту-схему границ территории памятника природы регионального значения «Исток реки Карасук» Новосибирской области внесены изменения.

Карта-схема границ территории памятника природы регионального значения «Исток реки Карасук» Новосибирской области прилагается (не приводится).

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

Экспликация
земель памятника природы регионального значения
«Исток реки Карасук» Новосибирской области
(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 19.12.2007 № 196-па)

Категории земель площади памятника природы:

1. Лес	860 га.
2. Болото	160 га.
3. Сенокосные угодья	80 га.
4. Пойменные луга	100 га.
Общая площадь	1200 га.

(абзац введен постановлением администрации Новосибирской области
от 19.12.2007 № 196-па)

Утверждено
постановлением
администрации Новосибирской области
от 15.03.2007 № 24-па

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИСТОК РЕКИ
КАРАСУК» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 19.12.2007 № 196-па)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

1.2. В состав памятника природы регионального значения «Исток реки Карасук» Новосибирской области (далее - памятник природы) входят комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Район истока реки Карасук лежит в лесостепном ландшафте среди березово-осиновых колков, лугов и болот, частично заросших кустарниками. Все эти элементы ландшафта служат регулятором сложившихся гидрологических условий и источником вод истока реки. Весь этот природный комплекс функционирует как единое целое: гидрологический режим поддерживается богатым и разнообразным растительным покровом, а функционирование последнего в значительной мере зависит от достаточного количества насекомых-опылителей. Район истока реки является экосистемой исключительного средообразующего значения и выполняет важную водоохранную функцию.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

2. Цели и задачи создания памятника природы

2.1. Цели:

сохранение естественных природных комплексов;
сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса;
охрана редких, исчезающих и интродуцированных видов флоры;

охрана растительного и животного мира, поддерживающего гидрологический режим целостности экосистемы истока реки;
сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;
сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
экологическое воспитание населения.

2.2. Задачи:

поддержание целостности экосистемы;
предотвращение дальнейшей деградации экосистемы реки Карасук;
сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия всех элементов ландшафтов, свойственных этой части Новосибирской области;
сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Новосибирской области;
обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

3. Порядок образования памятника природы

3.1. Памятник природы образован решением Новосибирского областного Совета депутатов от 17.09.97 (первый созыв, 34 сессия) общей площадью 1200 га на территории Коченевского района.

3.2. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.
(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

4. Правовой статус

4.1. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятие занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.

4.2. На территории памятника природы допускается ограниченная хозяйственная деятельность, обусловленная его специфическими особенностями и направленная на сохранение естественных природных комплексов.

4.3. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).

(п. 4.3 в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

4.4. Территория памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

4.5. Срок действия - бессрочно.

5. Режим особой охраны территории памятника природы

5.1. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

распашка земель;

заготовка растительной земли;

строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

взрывные работы;

движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения;

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

самовольное занятие земель;

разведение костров, выжигание луговой растительности;

загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

5.2. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

абзац утратил силу. - Постановление администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па;

проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство населением в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

организация экскурсий в воспитательных целях;

проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

5.3. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

(п. 5.3 в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

5.4. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

5.5. Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.


(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

5.6. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

5.7. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

(п. 5.7 введен постановлением администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 196-па)

План границ памятника природы



Координаты границ памятника природы
в системе координат - WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	54°41'34,9"	81°50'6,1"
2	54°41'25,4"	81°49'55,0"
3	54°41'11,5"	81°49'38,3"
4	54°40'57,7"	81°49'21,6"
5	54°41'0,8"	81°48'56,4"
6	54°40'42,9"	81°48'34,7"
7	54°40'27,9"	81°48'16,8"
8	54°40'27,8"	81°48'16,8"
9	54°40'21,1"	81°48'8,5"
10	54°40'16,2"	81°48'2,6"
11	54°40'11,6"	81°47'57,0"
12	54°40'2,3"	81°47'46,0"
13	54°39'59,6"	81°47'42,8"
14	54°39'48,5"	81°47'29,3"
15	54°39'27,7"	81°47'3,7"
16	54°39'25,7"	81°47'1,4"
17	54°39'18,4"	81°46'53,3"
18	54°39'14,9"	81°46'50,8"
19	54°39'7,5"	81°46'45,6"
20	54°39'3,1"	81°46'42,4"
21	54°39'2,8"	81°46'42,1"
22	54°39'4,1"	81°46'38,7"
23	54°39'9,7"	81°46'24,6"
24	54°39'10,0"	81°46'23,8"
25	54°39'12,0"	81°46'18,8"
26	54°39'13,5"	81°46'15,1"
27	54°39'25,9"	81°45'43,9"
28	54°39'21,7"	81°45'35,6"
29	54°39'19,5"	81°45'31,3"
30	54°39'19,1"	81°45'30,4"
31	54°39'12,3"	81°45'17,1"
32	54°39'9,5"	81°45'11,5"
33	54°39'7,8"	81°45'8,1"
34	54°39'5,0"	81°45'2,6"
35	54°39'0,5"	81°44'53,8"
36	54°38'50,8"	81°44'34,7"
37	54°39'1,7"	81°43'58,4"
38	54°39'3,3"	81°43'55,4"
39	54°39'5,4"	81°43'51,4"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
40	54°39'7,7"	81°43'47,3"
41	54°39'8,2"	81°43'46,3"
42	54°39'8,9"	81°43'45,0"
43	54°39'15,2"	81°43'33,5"
44	54°39'20,2"	81°43'24,2"
45	54°39'21,3"	81°43'22,3"
46	54°39'23,8"	81°43'17,7"
47	54°39'27,1"	81°43'11,7"
48	54°39'28,2"	81°43'10,1"
49	54°39'29,6"	81°43'8,5"
50	54°39'32,9"	81°43'4,0"
51	54°39'38,0"	81°42'57,3"
52	54°39'41,8"	81°42'52,3"
53	54°39'48,7"	81°42'43,2"
54	54°39'44,6"	81°43'5,2"
55	54°39'42,6"	81°43'28,3"
56	54°39'42,8"	81°43'30,4"
57	54°39'43,4"	81°43'31,5"
58	54°39'45,0"	81°43'31,5"
59	54°39'48,7"	81°43'30,2"
60	54°39'54,0"	81°43'30,3"
61	54°39'55,5"	81°43'31,8"
62	54°39'56,9"	81°43'34,6"
63	54°39'57,2"	81°43'41,0"
64	54°39'57,2"	81°43'55,0"
65	54°39'56,7"	81°44'1,7"
66	54°39'55,3"	81°44'7,7"
67	54°39'52,5"	81°44'11,4"
68	54°39'50,1"	81°44'13,0"
69	54°39'50,5"	81°44'17,0"
70	54°39'53,1"	81°44'32,5"
71	54°39'55,2"	81°44'42,6"
72	54°40'1,5"	81°44'56,3"
73	54°40'6,7"	81°45'22,7"
74	54°40'11,3"	81°45'43,1"
75	54°40'15,2"	81°46'7,2"
76	54°40'17,4"	81°46'29,1"
77	54°40'21,8"	81°46'44,9"
78	54°40'28,3"	81°47'7,4"
79	54°40'31,2"	81°47'14,7"
80	54°40'33,7"	81°47'21,4"
81	54°40'39,2"	81°47'31,9"
82	54°40'44,6"	81°47'38,5"
83	54°40'48,4"	81°47'42,0"
84	54°40'53,9"	81°47'43,3"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
85	54°41'23,4"	81°48'14,2"
86	54°41'35,5"	81°48'19,3"
87	54°41'40,9"	81°48'15,0"
88	54°41'47,0"	81°48'17,0"
89	54°41'48,7"	81°48'18,4"
90	54°41'49,6"	81°48'22,3"
91	54°41'50,7"	81°48'38,3"
92	54°41'45,7"	81°49'18,4"

Краткая характеристика флоры и растительности (список основных видов растений)

Флористическое разнообразие памятника природы представлено 189 видами высших сосудистых растений. За весь период исследований в памятнике природы зарегистрировано 179 видов высших сосудистых растений. В списке памятника природы было представлено 44 вида. Из них не было обнаружено 10 видов (табл. 1). Флористический список памятника пополнился 145 видами растений. Из всех видов, отмеченных для данной территории, 4 включены в Красную книгу Новосибирской области, а 8 отмечаются как «редкие» в Определителе растений Новосибирской области. Полный флористический список приведен в таблице 2.

Таблица 1

Сравнение флористических списков по результатам инвентаризации

Год образования памятника природы	Число видов			
	по результатам инвентаризации 2013	обнаруженных и ранее указанных в списке	не встреченных	новых для списка памятника природы
44	179	34	10	145

Во флористическом списке памятника природы виды растений, занесенные в Красную книгу Новосибирской области, отсутствуют. Однако за полевой сезон 2013 года на данной территории зарегистрировано 4 краснокнижных вида:

- венерин башмачок настоящий (*Cypripedium calceolus* L.) из семейства орхидные (рис. 1). Статус редкости 3 (R) – редкий вид;
- гнездовка настоящая (*Neottia nidus-avis* (L.) Rich.) из семейства орхидные (рис. 2). Статус редкости 1 (E) – вид, находящийся под угрозой исчезновения;
- венерин башмачок крупноцветковый (*Cypripedium macranthon* Sw.) из семейства орхидные (рис. 3). Статус редкости 3 (R) – редкий вид;
- ковыль перистый (*Stipa pennata* L.) из семейства злаковые (рис. 4). Статус редкости 3 (R) – редкий вид.



Рис. 1 Венерин башмачок настоящий



Рис. 2 Гнездовка настоящая



Рис. 3 Венерин башмачок крупноцветковый



Рис. 4 Ковыль перистый

Таблица 2

Аннотированный список видов флоры памятника природы
(по результатам инвентаризации)

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
1	<i>Achillea asiatica</i> Serg.	Тысячелистник азиатский	Asteraceae	9 повсеместный		+	
2	<i>Achillea millefolium</i> L.	Тысячелистник обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
3	<i>Aconitum volubile</i> Pall. ex Koelle.	Борец вьющийся	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
4	<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) A.DC.	Бубенчик лилиелистный	Campanulaceae	8 ограниченный		+	
5	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Частуха подорожниковая	Alismataceae	9 повсеместный		+	
6	<i>Alium</i> sp.	Лук	Liliaceae	нет данных		+	
7	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Лисохвост тростниковый	Poaceae	8 ограниченный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
8	<i>Androsace lactiflora</i> Pall.	Проломник молочноцветковый	Primulaceae	6 редкий		+	
9	<i>Anemone sylvestris</i> L.	Ветреница лесная	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
10	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Дудник лесной	Apiaceae	9 повсеместный		+	
11	<i>Anthemis subtinctoria</i> Dobrocz.	Пупавка красильная	Asteraceae	8 ограниченный		+	
12	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Купырь лесной	Apiaceae	9 повсеместный		+	
13	<i>Artemisia gmelinii</i> Web. ex Stechm.	Полынь Гмелина	Asteraceae	9 повсеместный		+	
14	<i>Artemisia latifolia</i> Ledeb.	Полынь широколистная	Asteraceae	9 повсеместный		+	
15	<i>Artemisia</i> sp.	Полынь	Asteraceae	нет данных		+	
16	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Полынь обыкновенная	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
17	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Спаржа лекарственная	Asparagaceae	8 ограниченный		+	
18	<i>Astragalus danicus</i> Retz.	Астрагал датский	Fabaceae	9 повсеместный		+	
19	<i>Astragalus</i> sp.	<i>Астрагал</i>	Fabaceae	нет данных		+	
20	<i>Astragalus uliginosus</i> L.	Астрагал болотный	Fabaceae	8 ограниченный	+		
21	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Икотник серый	Brassicaceae	9 повсеместный	+	+	
22	<i>Betula alba</i> L.	Береза пушистая, белая	Betulaceae	9 повсеместный		+	
23	<i>Betula pendula</i> Roth.	Берёза бородавчатая	Betulaceae	9 повсеместный	+	+	
24	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	Коротконожка перистая	Poaceae	9 повсеместный		+	
25	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub.	Кострец безостый	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
26	<i>Calamagrostis epigeos</i> (L.) Roth.	Вейник наземный	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
27	<i>Caltha palustris</i> L.	Калужница болотная	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
28	<i>Campanula cervicaria</i> L.	Колокольчик олений (жестковолосистый)	Campanulaceae	9 повсеместный		+	
29	<i>Campanula sibirica</i> L.	Колокольчик сибирский	Campanulaceae	9 повсеместный	+	+	
30	<i>Campanula wolgensis</i> P. Smirn.	Колокольчик волжский	Campanulaceae	8 ограниченный		+	
31	<i>Carex disticha</i> Huds.	Осока двурядная	Cyperaceae	9 повсеместный	+		
32	<i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	Осока ржаная	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
33	<i>Carex</i> sp. 1	Осока	Cyperaceae	нет данных		+	
34	<i>Carex</i> sp. 2	Осока	Cyperaceae	нет данных		+	
35	<i>Carex</i> sp. 3	Осока	Cyperaceae	нет данных		+	
36	<i>Carum carvi</i> L.	Тмин обыкновенный	Apiaceae	9 повсеместный		+	
37	<i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub.	Хамерион узколистный	Onagraceae	9 повсеместный		+	
38	<i>Cicuta virosa</i> L.	Вех ядовитый	Apiaceae	9 повсеместный		+	
39	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill.	Бодяк разнолистный	Asteraceae	9 повсеместный		+	
40	<i>Cirsium setosum</i> (Willd.) Bess.	Бодяк щетинистый	Asteraceae	9 повсеместный		+	
41	<i>Cnidium dubium</i> (Schkuhr) Thell.	Жгун-корень сомнительный	Apiaceae	9 повсеместный		+	
42	<i>Comarum palustre</i> L.	Сабельник болотный	Rosaceae	9 повсеместный		+	
43	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Вьюнок полевой	Convolvulaceae	9 повсеместный		+	
44	<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch.	Скерда тупокорневищная	Asteraceae	9 повсеместный		+	
45	<i>Crepis sibirica</i> L.	Скерда сибирская	Asteraceae	9 повсеместный		+	
46	<i>Crepis tectorum</i> L.	Скерда кровельная	Asteraceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
47	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Венерин башмачок настоящий	Orchidaceae	3 (R)		+	+
48	<i>Cypripedium macranthon</i> Sw.	Венерин башмачок крупноцветковый	Orchidaceae	3 (R)		+	+
49	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo.	Пальцекоренник мясо-красный	Orchidaceae	9 повсеместный		+	
50	<i>Delphinium elatum</i> L.	Живокость, Шпорник высокая	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
51	<i>Dracocephalum nutans</i> L.	Змееголовник поникший	Lamiaceae	9 повсеместный		+	
52	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	Змееголовник Руйша	Lamiaceae	9 повсеместный	+	+	
53	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs.	Щитовник шартрский, остистый	Aspidiaceae	6 редкий		+	
54	<i>Eleocharis</i> sp.	Болотница	Cyperaceae			+	
55	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski.	Пырей ползучий	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
56	<i>Epilobium palustre</i> L.	Кипрей болотный	Onagraceae	9 повсеместный		+	
57	<i>Epipactis</i> sp.	Дремлик	Orchidaceae			+	
58	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Хвощ топяной	Equisetaceae	9 повсеместный		+	
59	<i>Equisetum hyemale</i> L.	Хвощ зимующий	Equisetaceae	9 повсеместный	+		
60	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	Хвощ луговой	Equisetaceae	9 повсеместный		+	
61	<i>Eryngium planum</i> L.	Синеголовник плосколистный	Ariaceae	9 повсеместный		+	
62	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Овсяница луговая	Poaceae	9 повсеместный		+	
63	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Лабазник вязолистный	Rosaceae	9 повсеместный	+	+	
64	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench.	Лабазник обыкновенный	Rosaceae	9 повсеместный	+	+	
65	<i>Fragaria vesca</i> L.	Земляника лесная	Rosaceae	8 ограниченный		+	
66	<i>Fragaria viridis</i> Duch.	Клубника, земляника зеленая	Rosaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
67	<i>Galatella biflora</i> (L.) Nees.	Солонечник двухцветковый	Asteraceae	9 повсеместный		+	
68	<i>Galium boreale</i> L. s.l.	Подмаренник северный	Rubiaceae	9 повсеместный	+	+	
69	<i>Galium palustre</i> L.	Подмаренник болотный	Rubiaceae	9 повсеместный		+	
70	<i>Galium uliginosum</i> L.	Подмаренник топяной	Rubiaceae	9 повсеместный		+	
71	<i>Galium verum</i> L.	Подмаренник настоящий	Rubiaceae	9 повсеместный	+	+	
72	<i>Geranium bifolium</i> Patrin.	Герань двулистная	Geraniaceae	8 ограниченный		+	
73	<i>Geranium pratense</i> L.	Герань луговая	Geraniaceae	9 повсеместный	+	+	
74	<i>Glaux maritima</i> L.	Млечник приморский	Primulaceae	8 ограниченный		+	
75	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	Солодка уральская	Fabaceae	9 повсеместный		+	
76	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Кокушник длиннорогий	Orchidaceae	6 редкий		+	
77	<i>Gypsophila altissima</i> L.	Качим высокий	Caryophyllaceae	9 повсеместный		+	
78	<i>Helictotrichon</i> sp.	Овсец	Poaceae			+	
79	<i>Heracleum sibiricum</i> L.	Борщевик сибирский	Apiaceae	8 ограниченный	+	+	
80	<i>Hordeum brevisubulatum</i> (Trin.) Link.	Ячмень короткоостистый	Poaceae	9 повсеместный		+	
81	<i>Inula salicina</i> L.	Девясил иволистный	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
82	<i>Iris ruthenica</i> Ker- Gawl.	Касатик, ирис русский	Iridaceae	8 ограниченный	+	+	
83	<i>Juncus</i> sp.	Ситник	Juncaceae			+	
84	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey.	Латук татарский	Asteraceae	9 повсеместный		+	
85	<i>Lapula</i> sp.	Липучка	Boraginaceae			+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
86	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	Чина гороховидная	Fabaceae	9 повсеместный	+	+	
87	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Чина луговая	Fabaceae	9 повсеместный		+	
88	<i>Leonurus tataricus</i> L.	Пустырник татарский	Lamiaceae	8 ограниченный	+		
89	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Нивяник, поповник обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный		+	
90	<i>Leymus paboanus</i> (Claus) Pilg.	Колосняк Пабо	Poaceae	9 повсеместный		+	
91	<i>Lilium pilosiusculum</i> (Freyn) Misch.	Лилия саранка	Liliaceae	9 повсеместный		+	
92	<i>Limonium gmelinii</i> (Willd.) O. Kuntze.	Кермек Гмелина	Plumbaginaceae	9 повсеместный		+	
93	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льнянка обыкновенная	Scrophulariaceae	9 повсеместный	+	+	
94	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Воробейник лекарственный	Boraginaceae	8 ограниченный		+	
95	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Зюзник европейский	Lamiaceae	9 повсеместный		+	
96	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербейник обыкновенный	Primulaceae	9 повсеместный		+	
97	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Дербенник иволистный, плакун	Lythraceae	8 ограниченный		+	
98	<i>Matricaria perforata</i> Merat.	Трехреберник непахучий, просверленный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
99	<i>Medicago sativa</i> L.	Люцерна посевная	Fabaceae	9 повсеместный		+	
100	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Марьянник гребенчатый	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+	+	
101	<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke.	Дрема белая, луговая	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+	+	
102	<i>Melilotoides platycarpus</i> (L.) Sojak.	Мелилотоидес плоскоплодный	Fabaceae	9 повсеместный		+	
103	<i>Mentha arvensis</i> L.	Мята полевая	Lamiaceae	6 редкий		+	
104	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl.	Мерингия бокоцветная	Caryophyllaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
105	<i>Myosotis caespitosa</i> K.F. Schultz.	Незабудка дернистая	Boraginaceae	9 повсеместный		+	
106	<i>Naumburgia thyrsoflora</i> (L.) Reichenb.	Наумбургия кистеццветная	Primulaceae	9 повсеместный		+	
107	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Гнездовка настоящая	Orchidaceae	1 (Е)		+	+
108	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Неслия метельчатая	Brassicaceae	8 ограниченный		+	
109	<i>Nonea pulla</i> (L.) DC.	Ноней темно-бурая	Boraginaceae	9 повсеместный		+	
110	<i>Oberna behen</i> (L.) Ikonn.	Хлопушка обыкновенная	Caryophyllaceae	9 повсеместный		+	
111	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.	Эспарцет песчаный	Fabaceae	9 повсеместный		+	
112	<i>Origanum vulgare</i> L.	Душица обыкновенная	Lamiaceae	9 повсеместный		+	
113	<i>Orobancha</i> sp.	Заразиха	Orobanchaceae			+	
114	<i>Oxytropis</i> sp.	Остролодочник	Fabaceae			+	
115	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Вороний глаз четырёхлиственный	Trilliaceae	9 повсеместный		+	
116	<i>Pedicularis dasystachys</i> Schrenk.	Мытник мохнатоколосый	Scrophulariaceae	8 ограниченный		+	
117	<i>Petasites frigidus</i> (L.) Fries.	Белокопытник холодный	Asteraceae	9 повсеместный		+	
118	<i>Peucedanum morisonii</i> Bess. ex Spreng.	Горичник Морисона	Apiaceae	9 повсеместный		+	
119	<i>Phleum pratense</i> L.	Тимофеевка луговая	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
120	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	Зопник клубненосный	Lamiaceae	9 повсеместный	+	+	
121	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Тростник южный	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
122	<i>Pilosella</i> sp.	Ястребиночка	Asteraceae			+	
123	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Бедренец обыкновенный	Apiaceae	9 повсеместный		+	
124	<i>Plantago cornuti</i> Gouan.	Подорожник Корнута	Plantaginaceae	8 ограниченный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
125	<i>Plantago maxima</i> Juss. ex Jacq.	Подорожник наибольший	Plantaginaceae	8 ограниченный	+		
126	<i>Plantago media</i> L.	Подорожник средний	Plantaginaceae	9 повсеместный		+	
127	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Любка двулистная	Orchidaceae	6 редкий		+	
128	<i>Pleurospermum uralense</i> Hoffm.	Рembroплодник уральский	Apiaceae	9 повсеместный		+	
129	<i>Poa pratensis</i> L.	Мятлик луговой	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
130	<i>Poa</i> sp.	Мятлик	Poaceae			+	
131	<i>Polygala hybrida</i> DC.	Истод гибридный	Polygalaceae	9 повсеместный		+	
132	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce.	Купена душистая, лекарственная	Convallariaceae	9 повсеместный		+	
133	<i>Populus tremula</i> L.	Тополь дрожащий, осина	Salicaceae	9 повсеместный	+	+	
134	<i>Potentilla anserina</i> L.	Лапчатка гусиная	Rosaceae	9 повсеместный		+	
135	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeuschel.	Лапчатка прямостоящая	Rosaceae	6 редкий		+	
136	<i>Primula longiscapa</i> Ledeb.	Первоцвет длинностебельный	Primulaceae	9 повсеместный		+	
137	<i>Ptarmica salicifolia</i> (Bess.) Serg.	Чихотная трава иволистная	Asteraceae	9 повсеместный		+	
138	<i>Puccinellia</i> sp.	Бескильница	Poaceae			+	
139	<i>Pulmonaria dacica</i> Simonk.	Медуница (медунка, легочница) мягчайшая	Boraginaceae	9 повсеместный		+	
140	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	Прострел раскрытый	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
141	<i>Ranunculus lingua</i> L.	Лютик языковидный	Ranunculaceae	8 ограниченный		+	
142	<i>Ranunculus monophyllus</i> Ovcz.	Лютик однолистный	Ranunculaceae	8 ограниченный		+	
143	<i>Ranunculus polyanthemos</i> L.	Лютик многоцветковый	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
144	<i>Ranunculus repens</i> L.	Лютик ползучий	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
145	<i>Ribes nigrum</i> L.	Смородина черная	Grossulariaceae	9 повсеместный		+	
146	<i>Rosa majalis</i> Herrm.	Роза майская	Rosaceae	9 повсеместный		+	
147	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяника, малина каменная	Rosaceae	9 повсеместный		+	
148	<i>Rumex aquaticus</i> L.	Щавель водяной	Polygonaceae	8 ограниченный	+		
149	<i>Rumex</i> sp.	Щавель	Polygonaceae			+	
150	<i>Salicornia europaea</i> L.	Солерос европейский	Chenopodiaceae	8 ограниченный		+	
151	<i>Salix cinerea</i> L.	Ива пепельная	Salicaceae	9 повсеместный	+	+	
152	<i>Salix</i> sp.	Ива	Salicaceae			+	
153	<i>Salix triandra</i> L.	Ива трехтычинковая	Salicaceae	6 редкий		+	
154	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Кровохлебка лекарственная	Rosaceae	9 повсеместный		+	
155	<i>Saussurea amara</i> (L.) DC.	Соссюрея горькая, горькуша	Asteraceae	9 повсеместный		+	
156	<i>Scirpus lacustris</i> L.	Камыш озерный	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
157	<i>Scirpus</i> sp.	Камыш	Cyperaceae			+	
158	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Камыш лесной	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
159	<i>Scolochloa festucacea</i> (Willd.) Link.	Тростянка овсяницевидная	Poaceae	8 ограниченный		+	
160	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Шлемник обыкновенный	Lamiaceae	9 повсеместный		+	
161	<i>Sedum telephium</i> L.	Очиток пурпуровый	Crassulaceae	9 повсеместный		+	
162	<i>Serratula coronata</i> L.	Серпуха обыкновенная, венценосная	Asteraceae	9 повсеместный		+	
163	<i>Seseli ledebourii</i> G. Don fil.	Жабрица Ледебура	Apiaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
164	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch.	Жабрица порезниковая, гранатник	Apiaceae	9 повсеместный		+	
165	<i>Solanum kitagawae</i> Schonbeck-Temesy	Паслен Китагавы	Solanaceae	9 повсеместный		+	
166	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Осот полевой	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
167	<i>Stachys palustris</i> L.	Чистец болотный	Lamiaceae	9 повсеместный		+	
168	<i>Stellaria graminea</i> L.	Звездчатка злаковая	Caryophyllaceae	9 повсеместный		+	
169	<i>Stipa pennata</i> L.	Ковыль перистый	Poaceae	3 (R)		+	+
170	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Пижма обыкновенная	Asteraceae	9 повсеместный	+		
171	<i>Thalictrum simplex</i> L.	Василисник простой	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
172	<i>Thesium refractum</i> C.A. Mey.	Ленец сибирский	Santalaceae	6 редкий		+	
173	<i>Trifolium pratense</i> L.	Клевер луговой	Fabaceae	9 повсеместный	+	+	
174	<i>Trifolium repens</i> L.	Клевер ползучий	Fabaceae	9 повсеместный	+	+	
175	<i>Triglochin maritimum</i> L.	Триостренник приморский	Juncaginaceae	8 ограниченный		+	
176	<i>Trollius asiaticus</i> L.	Купальница, огонек, жарок	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
177	<i>Trommsdorffia maculata</i> (L.) Bernh.	Прозанник, Пазник крапчатый	Asteraceae	9 повсеместный		+	
178	<i>Typha angustifolia</i> L.	Рогоз узколистный	Typhaceae	9 повсеместный		+	
179	<i>Typha latifolia</i> L.	Рогоз широколистный	Typhaceae	9 повсеместный		+	
180	<i>Urtica dioica</i> L.	Крапива двудомная	Urticaceae	9 повсеместный	+	+	
181	<i>Veratrum lobelianum</i> Bernh.	Чемерица Лобеля	Melanthiaceae	8 ограниченный		+	
182	<i>Veronica krylovii</i>	Вероника Крылова	Scrophulariaceae	8 ограниченный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2013 год	Красная книга
183	<i>Veronica longifolia</i> L.	Вероника длиннолистная	Scrophulariaceae	9 повсеместный	+	+	
184	<i>Viburnum opulus</i> L.	Калина обыкновенная	Viburnaceae	8 ограниченный	+		
185	<i>Vicia cracca</i> L.	Горошек мышиный	Fabaceae	9 повсеместный	+	+	
186	<i>Vicia sepium</i> L.	Горошек заборный	Fabaceae	9 повсеместный		+	
187	<i>Viola arvensis</i> Murr.	Фиалка полевая	Violaceae	8 ограниченный		+	
188	<i>Viola canina</i> L.	Фиалка собачья	Violaceae	9 повсеместный		+	
189	<i>Viola hirta</i> L.	Фиалка волосистая	Violaceae	9 повсеместный		+	
				ИТОГО	44	179	4

Территория памятника представляет собой уникальный естественный природный комплекс лесостепных и болотных сообществ. Основные растительные сообщества представлены в таблице 3, рис. 5 - 10.

Таблица 3

Основные растительные сообщества памятника природы

№ п/п	Растительное сообщество
1.	Березняк злаково-разнотравный (рис. 5)
2.	Осинник злаково-разнотравный (рис. 6)
3.	Злаково-разнотравный луг (рис. 7)
4.	Заболоченные ивовые сообщества (ива пепельная) (рис. 9)
5.	Болотные сообщества с различным доминированием тростника южного, камыша озерного, тростянки овсяницевидной, осоки (рис. 10)
6.	Галофитные разнотравно-злаковые формации с различным доминированием бескильницы, полыни, кермека, триостренника и открытыми группировками солероса (рис. 8)



Рис. 5 Березняк злаково-разнотравный



Рис. 6 Осинник злаково-разнотравный



Рис. 7 Злаково-разнотравный луг



Рис. 8 Галофитные разнотравно-злаковые формации



Рис. 9 Заболоченное ивовое сообщество



Рис. 10 Тростяново-камышовое болото

Краткие сведения о животном мире (список основных видов)
(по результатам инвентаризации)

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Большой подорлик – Aquila clanga (Pallas, 1811). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU C2a(ii) (уязвимый вид). Большой подорлик распространён в степной, лесостепной и большей части лесной зоны от Восточной Европы до Приморья (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится в основном в северных и центральных районах, в большинстве других встречается во время миграций. Редкий вид, численность которого в центральной части области медленно восстанавливается (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,002 особи/га). Нами встречены 2 взрослых птицы. Возможно гнездование 2-3 пар. Природные условия памятника природы в целом благоприятны для обитания данного вида.

Луговой лунь – Circus pygargus (Linnaeus, 1758). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Красный список МСОП – LC (вызывающий наименьшие опасения). В Западной Сибири распространён от степей до южной тайги (Рябицев, 2008). В Новосибирской области встречен во всех административных районах, но по всей территории редок (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,003 особи/га). Нами встречены 4 взрослых самца. Возможно гнездование 4-5 пар. Природные условия памятника природы весьма благоприятны для обитания данного вида.

Обыкновенный осоед – Pernis apivorus (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири – немногочисленная птица лесной зоны (Рябицев, 2008). Указан в списке памятника природы, нами не отмечен. Возможны встречи во время миграции.

Чёрный коршун – Milvus migrans (Boddaert, 1783). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Вид широко распространён в Западной Сибири, один из наиболее многочисленных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной

Сибири встречается от степей до южной тундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Болотный лунь – *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Обычный вид хищных птиц, особенно в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Ястреб-перепелятник – *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Широко распространён в Западной Сибири, один из самых обычных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Ястреб-тетеревятник – *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Широко распространён в Западной Сибири, но повсюду сравнительно редок (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Обыкновенный канюк – *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Широко распространён в Западной Сибири, один из самых обычных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Зимняк (мохноногий канюк) – *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области не гнездится, встречается на кочёвках и зимовке (Рябицев, 2008). Нами не встречен. По сведениям, полученным от местных жителей, редкий зимующий вид.

Семейство Соколиные – *Falconidae*

Дербник – *Falco columbarius* (Linnaeus, 1758). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Дербник широко распространён в Северной Евразии и Северной Америке, где встречается от тундр до степей (Рябицев, 2008). В Новосибирской области является слабоизученным, малочисленным, спорадически распространённым видом (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,002 особи/га). Нами встречены 2 взрослых птицы. Возможно гнездование не менее 2-3 пар.

Кобчик – *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Красный список МСОП – NT (близок к угрожаемому состоянию). В Сибири кобчик спорадически распространён в лесной, лесостепной и степной зонах, более обычен в лесостепи (Рябицев, 2008). Для Новосибирской области является малочисленным, местами обычным видом, численность подвержена колебаниям (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность

мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,003 особи/га). Нами встречены 3 взрослых птицы. Возможно гнездование 2-3 пар.

Челнок – *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной лесотундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Обыкновенная пустельга – *Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степей до юга тундровой зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Овсянковые – Emberizidae

Дубровник – *Emberiza aureola* (Pallas, 1773). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – CE A2acd+3cd+4acd (вид, находящийся на грани полного исчезновения). В Западной Сибири дубровник распространён от северной тайги до северной части степной зоны (Рябицев, 2008). В Новосибирской области до конца 1980-х гг. был обычным и многочисленным видом, в 1990-2000-х гг. численность резко сократилась, как и в других районах Сибири (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,008 особи/га). Гнездится не менее 10 пар.

Обыкновенная овсянка – *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от участков леса в степной зоне до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белошапочная овсянка – *Emberiza leucosephala* (Gmelin, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от участков леса в степной зоне до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Садовая овсянка – *Emberiza hortulana* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от участков леса в степной зоне до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Курообразные – Galliiformes

Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Белая куропатка – *Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. В Западной Сибири встречается от лесостепи до тундры, в лесостепной зоне и южной тайге редка или отсутствует (Рябицев, 2008).

Нами не встречена. По сведениям, полученным от местных жителей, очень редкий вид.

Рябчик – *Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Населяет лесную зону Евразии, в Западной Сибири является самой обычной лесной куриной птицей (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Фазановые – Phasianidae

Перепел – *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается на север до южной части лесной зоны, где держится, преимущественно, на полях и пойменных лугах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Семейство Журавлиные – Gruidae

Серый журавль – *Grus grus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Барабинская низменность – один из ключевых районов гнездования серого журавля в России (Птицы СССР, 1987). Редкий гнездящийся вид, на пролёте может быть обычен.

Семейство Пастушковые – Rallidae

Коростель – *Crex crex* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири наиболее обычен в лесостепи и на юге лесной зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Чибис – *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён в лесной, лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Фифи – *Tringa glareola* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от тундр до степи, но в южных районах на гнездовании редка (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Травник – *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в степной, лесостепной и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Обыкновенный бекас – *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий

наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от тундр до степей (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Дупель – Gallinago media (Latham, 1787). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории NT (близкий к угрожаемому), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от тундры до лесостепной зоны (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758). (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Западной Сибири распространён на север, преимущественно, до средней тайги. Наиболее обычен в лесостепи и степи (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён по всей территории, но гнездится, преимущественно, в лесотундре и тундре (Рябицев, 2008). Нами не встречен. По сведениям, полученным от местных жителей, встречается в период миграции.

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области наиболее обычен в северных и центральных районах. Нами не встречен. По сведениям, полученным от местных жителей, встречается в период миграции.

Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Новосибирская область – один из основных очагов размножения вида в пределах Российского ареала (Кривенко и Виноградов, 2001). Нами не встречен. По сведениям, полученным от местных жителей, встречается в период миграции.

Кряква – Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена по всей территории. Немногочисленный гнездящийся вид.

Чирок-свистун – Anas crecca (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории, но на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Немногочисленный гнездящийся вид.

Шилохвость – Anas acuta (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных и

центральных районах. Нами не встречена. По сведениям, полученным от местных жителей, встречается в период миграции.

Связь – *Anas penelope* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Нами не встречена. По сведениям, полученным от местных жителей, встречается в период миграции.

Чирок-трескунок – *Anas querquedula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории, весьма обычный вид. Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

Семейство Голубиные – Columbidae

Вяхрь – *Columba palumbus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в лесной и лесостепной зонах, расселяется на восток (Рябицев, 2008). Нами не встречен. По сведениям, полученным от местных жителей, редкий гнездящийся вид.

Клинтух – *Columba oenas* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Большая горлица – *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространена в лесной и лесостепной зонах к востоку от Уральских гор (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes

Семейство Кукушковые – Cuculidae

Обыкновенная кукушка – *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Сибири распространена широко – от степи до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Глухая кукушка – *Cuculus saturatus* (Blyth, 1843). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространена от лесостепи до лесотундры (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд СOVOобразные – Strigiformes

Семейство Совиные – Strigidae

Ушастая сова – *Asio otus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Болотная сова – *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes

Семейство Настоящие козодой – Caprimulgidae

Обыкновенный козодой – *Caprimulgus europaeus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Сибири на север распространён до средней тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд Дятлообразные – Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae

Желна – *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Распространён по всему северу Евразии в лесной, лесотундровой, лесостепной и отчасти степной зонах (Рябицев, 2008). По сведениям, полученным от местных жителей, редкий гнездящийся вид.

Седой дятел – *Picus canus* (Gmelin, 1788). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от лесостепи до средней тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Большой пёстрый дятел – *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной тайги и, отчасти, лесотундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белоспинный дятел – *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1803). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от степной зоны до средней тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Малый пёстрый дятел – *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN,

2012). В Западной Сибири распространён до северной тайги и, отчасти, лесотундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Вертишейка – *Jynx torquilla* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена, в основном, в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Жаворонковые – Alaudidae

Полевой жаворонок – *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Трясогузковые – Motacillidae

Лесной конёк – *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён, в основном, в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белая трясогузка – *Motacilla alba* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Жёлтая трясогузка – *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Многочисленный гнездящийся вид.

Желтоголовая трясогузка – *Motacilla citreola* (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена крайне неравномерно в тундре, северной и южной тайге, лесостепи и степи (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Обыкновенный жулан – *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Иволговые – Oriolidae

Обыкновенная иволга – *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие

опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Западной Сибири встречается от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Скворцовые – Sturnidae

Обыкновенный скворец – *Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Сибири встречается до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Врановые – Corvidae

Ворон – *Corvus corax* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Серая ворона – *Corvus cornix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Галка – *Corvus monedula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до юга северной тайги, распределение неравномерное, более обычна вблизи населённых пунктов (Рябицев, 2008). По сведениям, полученным от местных жителей, встречается в период миграции.

Грач – *Corvus frugilegus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север до лесотундры, но избегает сплошных лесных массивов (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Сорока – *Pica pica* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Славковые – Sylviidae

Камышевка-барсучок – *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Садовая камышевка – *Acrocephalus dumetorum* (Blyth, 1849). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до южных границ северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Индийская камышевка – *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до юга лесной зоны (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Славка-завирушка – *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Серая славка – *Sylvia communis* (Latham, 1787). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Пеночка-теньковка – *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Многочисленный гнездящийся вид.

Пеночка-весничка – *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от северной степи до тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Певчий сверчок – *Locustella certhiola* (Pallas, 1811). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается в лесной, лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Зелёная пересмешка – *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на юге лесной зоны и в лесостепи (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Северная бормотушка – *Hippolais caligata* (Lichtenstein, 1823). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степей до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Мухоловка-пеструшка – *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN,

2012). В Западной Сибири обитает в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Серая мухоловка – *Muscicapa striata* (Pallas, 1764). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от северной степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Дроздовые – *Turdidae*

Черноголовый чекан – *Saxicola torquata* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от степей до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенная горихвостка – *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири гнездится в лесных насаждениях от степи до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный соловей – *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от северной степи до южной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Варакушка – *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Рябинник – *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, кроме тундр и открытых степей (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белобровик – *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, кроме арктических тундр и степей (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Певчий дрозд – *Turdus philomelos* (C. L. Brehm, 1831). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён преимущественно в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Синицевые – Paridae

Большая синица – *Parus major* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Белая лазоревка – *Parus cyanus* (Pallas, 1770). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена в степной, лесостепной и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Буроголовая гаичка – *Parus montanus* (Baldenstein, 1827). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Воробьиные – Passeridae

Полевой воробей – *Passer montanus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, в меньшей степени, чем домовый воробей, связан с человеческими поселениями (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Зяблик – *Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от лесных островов в степи до лесотундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Вьюрок – *Fringilla montifringilla* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от лесных островов в тундре до лесостепи (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Черноголовый щегол – *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от севера степи до средней тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенная чечётка – *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от южной части лесной зоны до тундры (Рябицев, 2008). Нами не отмечена. По сведениям, полученным от местных жителей, встречается в период миграции.

Обыкновенный дубонос – *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 17580). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири обитает в лесной и лесостепной зонах на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Обыкновенная чечевица – *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от степи до тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Хвостатые – Caudata

Семейство Углозубые – Hynobiidae

Сибирский углозуб – *Salamandrella keyserlingii* (Dybowsky, 1870). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории (Балацкий Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Семейство Саламандровые – Salamandridae

Обыкновенный тритон – *Lissotriton vulgaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории (Балацкий Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Отряд Бесхвостые – Anura

Семейство Жабы – Bufonidae

Серая жаба – *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области предпочитает лесные ландшафты, особенно сосняки, чередующиеся с полосами болот (Балацкий Амфибии и рептилии, 2012). Немногочисленный вид.

Семейство Настоящие лягушки – Ranidae

Остромордая лягушка – *Rana arvalis* (Nilsson, 1842). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Наиболее обычный вид амфибий, по всей территории распространён в Новосибирской области (Балацкий Амфибии и рептилии, 2012). Многочисленный вид.

Сибирская лягушка – *Rana amurensis* (Boulenger, 1886). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области встречается спорадически в отдельных районах, распространение изучено недостаточно (Балацкий Амфибии и рептилии, 2012). Нами не отмечена, встречена в ходе предыдущих исследований.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – Squamata

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Живородящая ящерица – *Zootoca vivipara* (Jacquin, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области населяет леса разных типов, где придерживается окраин болот, берегов лесных речек, зарастающих вырубок и гарей, опушек, полян, тропинок, просек (Балацкий Амфибии и рептилии, 2012). Обычный вид.

Прыткая ящерица – *Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Широко распространена в Новосибирской области, предпочитает сухие, хорошо прогреваемые солнцем биотопы (Балацкий Амфибии и рептилии, 2012). Немногочисленный вид.

Семейство Гадюковые – Viperidae

Обыкновенная гадюка – *Vipera berus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области населяет лесостепную и лесную зону к северу и востоку от оз. Чаны (Балацкий Амфибии и рептилии, 2012). Немногочисленный вид.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Землеройкообразные – Soricomorpha

Семейство Землеройковые – Soricidae

Обыкновенная бурозубка – *Sorex araneus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обитатель различных ландшафтов от тундр до степей (Юдин, 1989). Многочисленный вид.

Кутора обыкновенная – *Neomys fodiens* (Pennant, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Наиболее обычна в лесной зоне. Заселяет берега водоёмов, предпочитая небольшие речки и ручьи (Юдин, 1989). Редкий вид.

Отряд Хищные – Carnivora

Семейство Собачьи – Canidae

Волк – *Canis lupus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). По сведениям, полученным от местных жителей, периодически встречается на территории памятника природы.

Обыкновенная лисица – *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие

опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Семейство Куны – Mustelidae

Горностай – Mustela erminea (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Ласка – Mustela nivalis (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Колонок – Mustela sibirica (Pallas, 1773). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Степной хорь – Mustela eversmanii (Lesson, 1827). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Барсук – Meles meles (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Семейство Олени – Cervidae

Сибирская косуля – Capreolus pygargus (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Лось – Alces alces (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha

Семейство Заячьи – Leporidae

Заяц-беляк – Lepus timidus (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Заяц-русак – Lepus europaeus (Pallas, 1778). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Акклиматизирован в Новосибирской области в 1930-60-х гг., к настоящему времени встречается степной и лесостепной зонах (Бобров и др., 2008). Немногочисленный вид.

Отряд Грызуны – Glires

Семейство Мышиные – Muridae

Полевая мышь – Apodemus agrarius (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Мышь-малютка – *Micromys minutus* (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Семейство Хомяковые – Cricetidae

Красно-серая полёвка – *Myodes rufocanus* (Sundevall, 1846). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Красная полёвка – *Myodes rutilus* (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Рыжая полёвка – *Myodes glareolus* (Schreber, 1780). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Водяная полёвка – *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Обыкновенная полёвка – *Microtus arvalis* (Pallas, 1778). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Узкочерепная полёвка – *Microtus gregalis* (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Многочисленный вид.

Полёвка-экономка – *Microtus oeconomus* (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Многие виды беспозвоночных животных не имеют общепринятых русских названий, в связи с этим приведены лишь их научные латинские названия

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera

Семейство Пчелиные – Aphidae

Пчела-плотник – *Xylocopa valga* (Gerstaecker, 1872). (КК НСО, МСОП) Красная книга Новосибирской области – III категория. Красный список МСОП – LC. Редкий вид, встречаются единичные экземпляры.

Шмель необыкновенный – *Bombus confusus* (Schenck, 1859 (= *paradoxus* Dalla Torre, 1882)). (КК НСО, МСОП) Красная книга Новосибирской области – III

категория. Красный список МСОП – EN. Нами не отмечен, указан в списке памятника природы.

Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) – Шмель моховой.

Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) (= *agrorum* Fabricius 1787) – Шмель полевой.

Семейство Formicidae – Муравьи

Camponotus herculeanus (Linnaeus 1758) – Муравей древоточец-красногрудый.

Formica (Serviformica) fusca (Linnaeus, 1758) – Муравей лесной бурый.

Formica rufa (Linnaeus, 1761) – Муравей лесной рыжий.

Lasius niger (Linnaeus, 1758) – Муравей чёрный.

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) – Мирмика красная.

Семейство Diprionidae – Пилильщики гребнеусые

Diprion pini (Linnaeus, 1758) – Пилильщик сосновый.

Семейство Tenthredinidae – Пилильщики настоящие

Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758) – Пилильщик зеленый.

Tenthredo (Eurogaster) mesomelas (Linnaeus, 1758) – Пилильщик лесной.

Семейство Crabronidae – Роющие осы

Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761).

Crossocerus elongatulus (Vander Linden, 1829).

Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758).

Семейство Vespidae – Складчатокрылые осы

Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758).

Отряд Collembola – Ногохвостки

Семейство Hypogastruridae – Гипогаструриды

Ceratophysella succinea (Gisin, 1949).

Hypogastrura ripperi (Gisin, 1952).

Hypogastrura vernalis (Carl, 1901).

Семейство Isotomidae - Изотомиды

Desoria olivacea (Tullberg, 1871).

Isotoma viridis (Bourlet, 1839).

Proisotoma minima (Absolon, 1901).

Семейство Tomoceridae – Томоцерида

Tomocerus minutus (Tullberg, 1876).

Tomoceras vulgaris (Tullberg, 1871).

Семейство Entomobryidae – Чешуйчатые подуры

Lepidocyrtus lignorum (Fabricius, 1793).

Willowsia buskii (Lubbock, 1870).

Entomobrya lanuginosa (Nicolet, 1841).

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые (Бабочки)

Семейство Hesperidae – Толстоголовки

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Толстоголовка тире.

Семейство Pieridae – Белянки

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Боярышница.

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – Зорька.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – Капустница.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Репница.

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Брюквенница.

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – Луговая желтушка.

Colias chrysotheme (Esper 1781) – Золотистая желтушка.

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Горошковая беляночка.

Leptidea morsei (Fenton, 1882) – Восточная беляночка.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Лимонница.

Семейство Nymphalidae – Нимфалиды

Aglais io (Linnaeus, 1758) – Дневной павлиний глаз.

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница.

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Пестрокрыльница изменчивая.

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Большая лесная перламутровка.

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) – Перламутровка таволжанка.

Melithea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) – Шашечница Феба.

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница с-белое.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Репейница.

Семейство Satyridae – Бархатницы

Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – Малая крупноглазка.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Сенница обыкновенная.

Coenonympha tullia (Muller, 1764) – Сенница туллия.

Minois dryas (Scopoli, 1763) – Дриада.

Chazara briseis (Linnaeus, 1764) – Бархатница Бризеида.

Melanagria russiae (Esper, 1783) – Пестроглазка русская.

Семейство Lycaenidae – Голубянки

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – Голубянка икар.

Семейство Noctuidae – Совки

Plusia festucae (Linnaeus, 1758) – Метловидка злаковая.

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые

Семейство Carabidae – Жужелицы

Carabus (Megodontus) violaceus (Linnaeus, 1758) – Жужелица фиолетовая.

Carabus (Morphocarabus) regalis (Fischer von Waldheim, 1822).

Platynus assimile (Paykull, 1790) – Быстряк схожий.

Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783) – Птеростих чёрный.

Семейство Scarabaeidae – Хрущи

Cetonia (s.str.) aurata (Linnaeus, 1758) – Бронзовка золотая.

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) – Навозник обыкновенный.

Protaetia (Eupotosia) affinis (Andersch, 1797) – Бронзовка золотистая.

Семейство Coccinellidae – Божьи коровки

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – Коровка двуточечная.

Calvia (Anisocalvia) quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758).

Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758 – Коровка узорчатая.

Coccinella magnifica (Redtenbacher, 1843).

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) – Коровка семиточечная.

Hippodamia variegata (Goeze, 1777) – Коровка изменчивая.

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758).

Semiadalia notata (Laicharting, 1781).

Семейство Chrysomelidae – Листоеды

Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763).

Семейство Cerambycidae – Усачи

Leptura (Rutpela) maculata (Poda, 1761) – Лептура пятнистая.

Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) – Лептура зеленая.

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – Пахита четырехпятнистая.

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – Лептура бурая.

Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) – Лептура рыжая.

Семейство Elateridae – Щелкуны

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – Щелкун серый.

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) – Щелкун окаймленный.

Семейство Curculionidae – Долгоносики

Cleonis pigra (Scopoli, 1763).

Отряд Diptera – Двукрылые

Семейство Culicidae – Кровососущие комары

Aedes cinereus (Meigen, 1818).

Anopheles (Anopheles) messeae (Falleroni, 1926).

Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi, 1890).

Culex pipiens (Linnaeus, 1758).

Семейство Simuliidae – Мошки

Simulium vulgare (Dorogostaisky, Rubtsov & Vlasenko, 1935).

Simulium transiens (Rubtsov, 1940).

Семейство Tabanidae – Слепни

Chrysops pictus (Meigen, 1820) – Златоглазик украшенный.

Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758) – Дождевка обыкновенная.

Tabanus autumnalis (Linnaeus, 1761) – Слепень серый.

Tabanus bovinus (Linnaeus, 1758) – Слепень бычий.

Семейство Syrphidae – Журчалки (Цветочные мухи)

Cheilosia longula (Zetterstedt, 1838).

Cheilosia velutina (Loew, 1840).

Cheilosia vernalis (Fallen, 1817).

Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758).

Epistrophe diaphana (Zetterstedt, 1843).

Epistrophe grossulariae (Meigen, 1822).

Eristalis anthophorina (Fallen, 1817).

Helophilus affinis (Wahlberg, 1844).

Helophilus hybridus (Loew, 1846).

Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758).

Scaeva selenitica (Meigen, 1822).

Sericomyia lappona (Linnaeus, 1758).

Volucella bombylans (Linnaeus, 1758).

Семейство Asilidae – Ктыри

Laphria flava (Linnaeus, 1761).

Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758).

Machimus rusticus (Meigen, 1820).

Отряд Odonata – Стрекозы

Семейство Aeschnidae – Коромысла

Aeshna crenata (Hagen, 1856) – Коромысло сибирское.

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) – Коромысло камышовое.

Семейство Lestidae – Лютки

Lestes dryas (Kirby, 1890) – Лютка дриада.

Семейство Coenagrionidae – Стрелки

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) – Стрелка вооруженная.

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) – Стрелка копьевосная.

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) – Стрелка весенняя.

Отряд Homoptera – Равнокрылые

Семейство Aphrophoridae – Пенницы

Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758).

Семейство Membracidae – Горбатки

Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758).

Семейство Cicadellidae – Цикадки

Cicadella viridis (Linnaeus, 1758).

Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые

Семейство Miridae – Слепняки

Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767).

Closterotomus bicalvatus (Herrich-Schäffer, 1835).

Семейство Lygaeidae – Земляные клопы

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758).

Семейство Coreidae – Ромбовики

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758).

Семейство Pentatomidae – Щитники

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758).

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758).

Семейство Scutelleridae – Черепашки

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758).

Семейство Reduviidae – Хищницы

Reduvius personatus (Linnaeus, 1758).

Семейство Gerridae – Водомерки

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758).

Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые

Семейство Chrysopidae – Златогазки

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758).

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира**

№ n/n	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
	Растения				
1.	Венерин башмачок настоящий	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	3 (R)	3 (R)	LC
2.	Венерин башмачок крупноцветковый	<i>Cypripedium macranthon</i> Sw.	3 (R)	3 (R)	-
3.	Гнездовка настоящая	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	1 (E)	-	LC
4.	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> L.	3 (R)	3 (R)	-
	Животные				
5.	Пчела–плотник	<i>Xylocopa valga</i> (Gerstaecker, 1872)	3	-	LC
6.	Шмель необыкновенный	<i>Bombus confusus</i> (Schenck, 1859)	3	-	EN
7.	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	3	2	VU C2a(ii)
8.	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
9.	Дербник	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	-
10.	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	3	3	NT
11.	Дубровник	<i>Emberiza aureola</i> (Pallas, 1773)	2	2	CE A2acd+3c d+4acd
12.	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i> (Linnaeus, 1758)	2	2	-
13.	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-