



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кадастровое дело № 034

Памятник природы регионального значения
«Убинский озерно-болотный ландшафт»
Новосибирской области

Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)	Памятник природы регионального значения «Убинский озерно-болотный ландшафт» Новосибирской области (далее – памятник природы)
Категория ООПТ	Памятник природы
Значение ООПТ	Региональное
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ	034
Профиль ООПТ	Ландшафтный
Статус ООПТ	Действующий
Дата создания, реорганизации	10.07.2003
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)	Сохранение естественных природных комплексов; сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций приозерного комплекса; сохранение редких, исчезающих и интродуцированных видов фауны и флоры; сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов; сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий; экологическое воспитание населения.
Нормативная основа функционирования ООПТ	Охранное обязательство на государственный памятник природы областного значения от 03.10.2002. СПК «Колхоз Владимирский» берет на себя обязательства по охране государственного памятника природы (приложение № 1)
	Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 10.07.2003 «Об образовании памятника природы областного значения «Убинский озерно-болотный ландшафт» (третий созыв, 20 сессия) (приложение № 2)
	Постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 178-па «Об утверждении границ и положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Убинский озерно-болотный ландшафт» Новосибирской области». (приложение № 3). Общая площадь составляет 1613,6 га
Ведомственная подчиненность	Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Международный статус ООПТ	Не присвоен
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)	Не присвоена
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ	1
Месторасположение ООПТ	Новосибирской область, Убинский район, Орловский сельсовет; Владимирский сельсовет

Географическое положение ООПТ	Памятник природы находится в западной части Убинского района Новосибирской области в 3 километрах к югу от села Орловское и в 1 километре западнее озера Убинское. Северная граница территории памятника природы на протяжении 4 километров проходит по границе с землями СПК «Колхоз Бородинский», восточная – с севера на юг – на протяжении 2,3 километра по полевой дороге до пересечения с искусственным водоотводным каналом, южная граница территории памятника природы извилистая, следует по южному окончанию болота, четко отмечающемуся понижением рельефа, началом обводненности и смене болотной растительности на степную. Восточная граница территории памятника природы в своей юго-восточной части следует по границе болота (1,5 километра) и далее на северо-запад на протяжении 3,5 километра до пересечения с границей земель СПК «Колхоз Бородинский»
Общая площадь ООПТ (га)	1613,6
Площадь охранной зоны ООПТ (га)	0
Границы ООПТ	Постановление администрация Новосибирской области от 16.11.2007 № 178-па «Об утверждении границ и положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Убинский озерно-болотный ландшафт» Новосибирской области». План границ памятника природы (приложение № 4). Географические координаты границ памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 5)
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют
Природные особенности ООПТ	<u>Нарушенность территории</u> Памятник природы образован на территории СПК «Колхоз Владимировский» Убинского района Новосибирской области. Антропогенное воздействие на территорию можно считать незначительным. Рыбалка вследствие зарастания озер почти не представлена, как и охота. На растительные сообщества памятника природы эти воздействия оказывают незначительное влияние. Степень сохранности уникальной флоры и растительности на территории памятника природы следует признать хорошей и нуждающейся в дальнейшем в сохранении и защите. Проводятся работы по обустройству: установка аншлагов, уборка имеющегося мусора, проведение противопожарных мероприятий (прокладывание противопожарных минерализованных полос)
	<u>Краткая характеристика рельефа</u> Рельеф территории в целом равнинный. Памятник природы представляет собой своеобразный комплекс болотной растительности, расположенный среди лесостепного ландшафта. Восточная граница территории памятника природы с севера на юг проходит по полевой дороге до пересечения с искусственным водоотводным каналом, южная граница территории памятника природы извилистая, следует по южному окончанию болота, четко отмечающемуся понижением рельефа, началом обводненности и смене болотной растительности на степную. Восточная граница

	территории памятника природы в своей юго-восточной части следует по границе болота <u><i>Краткая характеристика климата</i></u> Климат резко континентальный. Климат Убинского района относится к континентальному типу с холодной зимой и сравнительно жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Наиболее холодным месяцем зимы является январь, средняя температура января от – 18 СО до – 20,4 СО. Средняя температура июля от +18,3 СО до +19 СО. Абсолютный минимум температуры – 48,7 СО, абсолютный максимум +36,5 СО. Продолжительность периода со снежным покровом – 175 дней. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя многолетняя из максимальных глубин промерзания составляет 144 см. Средняя максимальная высота снежного покрова – 40 см. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 73,70 %, максимальная в ноябре-декабре – 88,06 %, минимальная в мае – 50,58 %. Осадки в летний период представлены в виде кратковременных ливневых дождей. Среднегодовая норма осадков по колеблется в пределах от 350 мм <u><i>Краткая характеристика почвенного покрова</i></u> Почвы лугово-лесо-болотные. По характеру слагающих фитоценозов памятник природы представляет собой эталонный лугово-лесо-болотный массив. Наличие в составе озёр, сочетание лесоболотных и лесостепных комплексов <u><i>Краткое описание гидрологической сети</i></u> В состав памятника природы входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Памятник природы представляет собой своеобразный комплекс болотной растительности, расположенный среди лесостепного ландшафта. Это болото имеет важное средообразующее значение, так как поддерживает гидрологический режим окружающих территорий, прежде всего уровень воды в озере Убинское, стабилизирует климат. Наличие в составе памятника природы озёр: Большое Колбино, Могильное, Яганы, Никиткино, Табанчики, Домашнее. Наиболее крупное озеро Глубокое <u><i>Краткая характеристика флоры и растительности</i></u> (приложение № 6) <u><i>Краткие сведения о лесном фонде</i></u> Лесохозяйственный участок Убинский № 2, с-з «Владимировский», часть квартала 4 <u><i>Краткие сведения о животном мире</i></u> (приложение № 7) <u><i>Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира.</i></u> (приложение № 8) <u><i>Суммарные сведения о биологическом разнообразии</i></u> Всего объектов животного мира 364 вида, в том числе: – 163 вида наземных позвоночных животных, из них зарегистрировано пребывание на территории памятника природы 130 видов птиц, 25 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся;
--	---

	– 201 вид беспозвоночных животных. Наиболее разнообразной группой позвоночных животных являются птицы отмечено 13 отрядов. Класс млекопитающие из 6 отрядов. Флористическое разнообразие памятника природы представлено 344 видами высших сосудистых растений. В Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) включены 156 видов животных, 2 вида высших сосудистых растений. В Красную книгу Российской Федерации занесено: 9 видов животных (красношейная поганка, гуменник, пискулька, скопа, большой подорлик, орлан-белохвост, кобчик, черноголовый хохотун, дубровник), 0 видов высших сосудистых растений. В Красную книгу Новосибирской области занесено 28 видов растений и животных, в том числе: – 22 вида животных, – 6 видов высших сосудистых растений <u>Краткая характеристика основных экосистем ООПТ</u> Памятник природы представляет собой своеобразный комплекс болотной растительности, расположенный среди лесостепного ландшафта в Убинском районе Новосибирской области. Это болото имеет важное средообразующее значение, так как поддерживает гидрологический режим окружающих территорий, прежде всего уровень воды в озере Убинское, стабилизирует климат. По характеру слагающих фитоценозов он представляет собой эталонный лугово-лесо-болотный массив Средне-Омского северо-лесостепного ботанико-географического округа. Растительные сообщества памятника природы: ивово-березовые и осиновые сообщества, разнотравно-осоково-вейниковые луговые сообщества, тростниковые и разнотравно-тростниковые болотные сообщества Основной объект охраны в памятнике природы – своеобразный комплекс фрагментов болотных экосистем с примесью луговых элементов, включающий значительное число популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области <u>Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ</u> Памятник природы представляет собой своеобразный комплекс лесолуго-болотной растительности, расположенный среди лесостепного ландшафта, имеет важное средообразующее значение, так как поддерживает гидрологический режим окружающих территорий, стабилизирует микроклимат. Основной объект охраны в памятнике природы – своеобразный комплекс фрагментов болотных экосистем с примесью луговых элементов, а также популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения 28 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. На территории памятника природы выявлено 344 видов высших сосудистых растений, 130 видов птиц, 25 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 201 вид беспозвоночных
--	--

	<u>Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов</u> Отсутствуют			
	<u>Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ</u> Отсутствуют			
	<u>Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий</u> Территория памятника природы представляет собой уникальный естественный природный комплекс водно-болотных сообществ, имеющих большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Благодаря особым гидрологическим характеристикам здесь создаётся специфический микроклиматический режим, необходимый для животных и растений, характерных для таёжных и болотных мест обитания. Благодаря наличию озёр в период миграций здесь останавливаются различные виды водоплавающих, околоводных и лесных видов птиц. Наличие в составе памятника природы озёр, сочетание лесоболотных и лесостепных комплексов предоставляет хорошие возможности для гнездования поганок, нырковых и речных уток, лебедей и пастушковых птиц. Памятник природы поддерживает гидрологический режим окружающих территорий, стабилизирует микроклимат, сохраняет местообитание и местопроизрастания уникальные сообщества и популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. Территория памятника природы представляет собой место обитания, в том числе размножения, 45 видов животных, отнесённых к объектам охоты. Среди них отмечаются копытные, пушные звери и водоплавающие птицы. Степень сохранности уникальной флоры и растительности на территории памятника природы следует признать хорошей			
Экспликация земель ООПТ	<u>Экспликация по составу земель</u> Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда			
	<u>Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов</u>			
	<i>№ п/п</i>	<i>Категория земель</i>	<i>Площадь, га</i>	<i>% от общей площади</i>
	1.	Болото	941,8	58,4
	2.	Озеро	566,8	35,1
	3.	Сенокосы	83,5	5,2
	4.	Кустарник заболоченный	17,0	1,1
	5.	Пастбища	4,5	0,3
		ИТОГО	1613,6	100
	<u>Экспликация земель лесного фонда</u> Отсутствует			
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)	<u>Факторы негативного воздействия</u> Факторы антропогенного воздействия: - рыбалка и охота (особенно на водоплавающих птиц), вследствие зарастания озёр почти не представлены. (на растительные сообщества эти воздействия оказывают незначительное влияние);			

	- пожары (воздействие пожаров локальное, по динамике, регулярности и силе воздействия на животный мир данных нет); - выпас крупного рогатого скота (площадь территории выпаса незначительна и существенного урона экосистеме не наносит) <u>Угрозы негативного воздействия</u> Пожары. Возможно возникновение на территории памятника природы
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ	СПК «Колхоз Владимировский». Адрес: 632540, Новосибирская область, Убинского район, с. Владимировское, а, НСО. Дата государственной регистрации юридического лица: 20.12.2002. ОГРН: 1025406026458. Руководитель: председатель Алексеев Юрий Леонтьевич Охранное обязательство от 03.10.2002
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют
Общий режим охраны и использования ООПТ	Постановление администрация Новосибирской области от 16.11.2007 № 178-па «Об утверждении границ и положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Убинский озерно-болотный ландшафт» Новосибирской области». На территории памятника природы <i>запрещается</i> любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе: - предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; - деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; - распашка земель; - заготовка растительной земли; - строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; - проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; - взрывные работы; - движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения; - устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; - самовольное занятие земель; - разведение костров, выжигание луговой растительности; - загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; - пастьба и прогон сельскохозяйственных животных; - заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира; - сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. На территории памятника природы <i>разрешается</i> без нанесения

	ущерба охраняемым природным комплексам: - проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы; - сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов; - проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; - организация экскурсий в воспитательных целях; - проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований. <i>Разрешается в исключительных случаях</i> отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний
Зонирование территории ООПТ	Отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ	Охранная зона не установлена
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ	Кадастровый номер земельного участка: 54:25:021301:6. Адрес: данные отсутствуют. Категория земель: данные отсутствуют. Площадь: 14348448 кв. м. Сведения о пользователях, владельцах и собственниках земельного участка отсутствуют. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют. Разрешенное использование: отсутствует
	Кадастровый номер земельного участка: 54:25:021301:530. Адрес: Новосибирская область, Убинский район, Муниципальное образование Орловский сельский совет. Площадь: 505000 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Правообладатель (собственник): Носачевская Ирина Николаевна, Новосибирская область, Убинский район, с. Орловка. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
	Кадастровый номер земельного участка: 54:25:021301:532. Адрес: Новосибирская область, Убинский район, Муниципальное образование Орловский сельский совет. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Площадь: 1010000 кв. м/ Правообладатель (собственник): Носачевская Ирина Николаевна, Новосибирская область, Убинский район, с. Орловка. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
	Кадастровый номер земельного участка: 54:25:022901:60. Адрес: данные отсутствуют. Категория земель: данные отсутствуют. Площадь: 87131340 кв. м. Сведения о пользователях, владельцах и собственниках земельного участка отсутствуют.

	Сведения о зарегистрированных правах отсутствует. Разрешенное использование: данные отсутствуют
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ	<u>Музеи природы, информационные и визит-центры</u> Отсутствуют
	<u>Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы</u> Отсутствуют
	<u>Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения</u> Отсутствуют
	<u>Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха</u> Отсутствуют
Кадастровые сведения подготовлены	Гуляева Татьяна Владимировна. Главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Телефон: 8(383)296-52-25, e-mail: gutv@nso.ru

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СПК "Колхоз Владимирский"

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ)

В ЛИЦЕ _____ председателя Алексеева Юрия Леонтьевича
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ)

ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ Устава о СПК "Колхоз Владимирский"

И ИМЕНУЕМОГО В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ОХРАНЯЮЩИЙ», БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ-----

областного значения "Убинский болотно-озерный ландшафт"

(НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ)

РАСПОЛОЖЕННОГО в Убинском районе Новосибирской области

(РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, РАЙОН, ГОРОД)

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННОГО В ПАСПОРТЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПЕРЕЧНЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР:

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ:


НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ О НАРУШЕНИИ УКА
ЗАННОГО РЕЖИМА.

АДРЕС «ОХРАНЯЮЩЕГО» 632340 с.Владимировское, Убинского района
Новосибирской области
Алексеев Юрий Леонтьевич
председатель СПК "Колхоз Владимировский"

(АДРЕС,ФАМИЛИЯ,ИМЯ,ОТЧЕСТВО,ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ОХРАНЯЮЩЕГО»)

(ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ)

Алексеев Ю.Л.



03 октября 2002г

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
УБИНСКОГО РАЙОНА
Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2002 N 147

Об определении земельного участка для организации
памятника природы областного значения
"Убинский болотно-озерный ландшафт"

Рассмотрев ходатайство Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Новосибирской области и в соответствии с Земельным Кодексом РСФСР от 25 апреля 1991 года, ст. 89, Законом НСО "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области" от 21 мая 1995 года, ст. 20, постановлением администрации Новосибирской области N 170 от 09.04.1992 года "Об организации особо охраняемых природных объектов на территории Новосибирской области", в целях сохранности уникального объекта для научных, культурно-просветительных целей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить земельный участок на землях СПК "Колхоз Владимировский" для организации памятника природы "Убинский болотно-озерный ландшафт" площадью 1613,6 га, в том числе: болото - 941,8 га, озера - 566,8 га, сенокосы - 83,5 га, кустарник заболоченный - 17 га, пастбища - 4,5 га.

2. Определение земельного участка для организации памятника природы "Убинский болотно-озерный ландшафт" производится без изъятия земельных угодий землепользователя - СПК "Колхоз Владимировский".

3. Контроль за соблюдением земельного законодательства в части порядка и режима использования данного земельного участка, определенного под памятник природы "Убинский болотно-озерный ландшафт", возложить на Комитет по земельным ресурсам и землеустройству (В.В. Орлянский) и комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды территориальной администрации (Н.С. Плотников).



С.И. Селезнев

1080
03.10.2002

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
УБИНСКОГО РАЙОНА

Новосибирской области
632521

ул. Ленина 23, с. Убинское
факс. (266) 21-734

от 10.10.2002 N 01
на N _____ от _____

Новосибирский областной
Совет депутатов

Об образовании памятника
природы областного значе-
ния "Убинский болот-
но-озерный ландшафт" в
Убинском районе

Во исполнение решения VI сессии Новосибирского областного Совета народных депутатов от 04.07.91 г. "Об экологической обстановке в области и мерах по ее коренному улучшению", постановления главы администрации Новосибирской области от 09.04.92 г. N 170 "Об организации особо охраняемых природных объектов на территории Новосибирской области", решения 28 сессии Новосибирского областного Совета депутатов "О перспективной схеме развития и разнечения сети особо охраняемых природных территорий в Новосибирской области в целях сохранения уникальных видов флоры и фауны в их естественном состоянии для ученых, культурно-просветительных, хозяйственных и эстетических целей, имеющих исключительное средообразующее значение" территориальная администрация Убинского района, после комиссионного осмотра территории, входит с предложением:

Образовать на территории Убинского района Новосибирской области памятник природы областного значения "Убинский болотно-озерный ландшафт" площадью 1613,6 га в границах согласно выкопировки.

Земельный участок предоставляется в бессрочное пользование (акт отвода и выкопировка прилагаются).

Контроль за соблюдением режима использования земель памятника и его содержанием администрация района просит осуществлять в соответствии с Законом Новосибирской области от 31.05.95 г. "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области".

Глава администрации

Председатель комиссии

С.И. Селезнев.

В.И. Пахоненко



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Убинского района
С.И. Селезнев
"10" / 10 2002 г.

А К Т

выбора земельного участка по образованию
памятника природы областного значения
"Убинский болотно-озерный ландшафт"

Для образования на территории Убинского района памятника природы областного значения "Убинский болотно-озерный ландшафт" комиссия в составе:

Пахоненко В.И. – зам. главы территориальной администрации, председатель комиссии;

Плотников Н.С. – председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:

Орлянский В.В. – председатель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству;

Запрудин С.Н. – главный врач ГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Убинском районе";

Алексеев Ю.Л. – директор СПК "Колхоз Влади́нировский";

Матюхов И.П. – начальник отдела райохотнадзора;

Нафиков Х.Х. – председатель правления районного общества охотников и рыболовов;

Скрипалев В.Н. – главный специалист-госинспектор филиала "Облакоинспекция"

произвела выбор и отвод земельного участка для образования вышеуказанного памятника.

Земельный участок, отведенный под памятник природы "Убинский болотно-озерный ландшафт", находится на территории СПК "Колхоз Влади́нировский", занимает площадь 1613,6 га.


Комиссия считает необходимым создание памятника природы областного значения "Убинский болотно-озерный ландшафт".

Председатель комиссии

В.И. Пахоненко

Зам. председателя комиссии

Н.С. Плотников



Члены комиссии

Председатель комитета по земельным
ресурсам и землеустройству

В. В. Орлянский

Главный врач ГУ "Центр государст-
венного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора в Убинском районе"

С. Н. Запрудин

Директор СПК "колхоз Владимировский"

Ю. Л. Алексеев

Начальник отдела райохотнадзора

И. П. Матюхов

Председатель правления районного
общества охотников и рыболовов

Х. Х. Нафиков

Главный специалист-инспектор
филиала "Облакоинспекция"

В. Н. Скрипалев

Выкопировка из плана земель СПК "Колхоз Владимировский" к акту
выбора земельного участка под создание памятника природы област-
ного значения "Убинский болотно-озерный ландшафт"

С О Г Л А С О В А Н О:

Заместитель главы территориальной
администрации, председатель комиссии

Председатель комитета по природным
ресурсам и охране окружающей среды;
Зам. председателя комиссии

Члены комиссии:

Председатель комитета по земельным
ресурсам и землеустройству

В. В. Орлянский

Главный врач ГУ "Центр государст-
венного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора в Убинском районе"

С. Н. Запрудин

Директор СПК "Колхоз Владимировский"

Ю. Л. Алексеев

Начальник отдела райохотнадзора

И. П. Матюхов

Председатель правления районного
общества охотников и рыболовов

Х. Х. Нафиков

Главный специалист-госинспектор
филиала "Облакоинспекция"

В. Н. Скрипалев



**НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(двадцатая сессия)
от 10 июля 2003 года**

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «УБИНСКИЙ ОЗЕРНО-БОЛОТНЫЙ ЛАНДШАФТ»**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Новосибирского областного
Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

Рассмотрев представленные администрацией Новосибирской области материалы об образовании памятника природы областного значения «Убинский озерно-болотный ландшафт», Новосибирский областной Совет депутатов постановляет:

1. Образовать памятник природы областного значения «Убинский озерно-болотный ландшафт» в Убинском районе Новосибирской области.
(в ред. постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)
2. Утратил силу с 29 января 2009 года. – Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Советская Сибирь» и «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета
В.В.ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2007 г. № 178-па****ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ
ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «УБИНСКИЙ ОЗЕРНО-БОЛОТНЫЙ ЛАНДШАФТ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» постановляю:

Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Убинский озерно-болотный ландшафт» Новосибирской области.

Губернатор области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 16.11.2007 № 178-па

**ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«УБИНСКИЙ ОЗЕРНО-БОЛОТНЫЙ ЛАНДШАФТ» НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Памятник природы регионального значения «Убинский озерно-болотный ландшафт» Новосибирской области (далее – памятник природы) находится в западной части Убинского района Новосибирской области в 3 километрах к югу от села Орловское и в 1 километре западнее озера Убинское.

Северная граница территории памятника природы на протяжении 4 километров проходит по границе с землями СПК «Колхоз Бородинский», восточная – с севера на юг – на протяжении 2,3 километра по полевой дороге до пересечения с искусственным водоотводным каналом, южная граница территории памятника природы извилистая, следует по южному окончанию болота, четко отмечающемуся понижением рельефа, началом обводненности и смене болотной растительности на степную. Восточная граница территории памятника природы в своей юго-восточной части следует по границе болота (1,5 километра) и далее на северо-запад на протяжении 3,5 километра до пересечения с границей земель СПК «Колхоз Бородинский».

Карта-схема границ территории памятника природы регионального значения «Убинский озерно-болотный ландшафт» Новосибирской области прилагается (не приводится).

Экспликация земель
памятника природы регионального значения
«Убинский озерно-болотный ландшафт» Новосибирской области

Категории земель площади памятника природы:

1. Болото	– 941,8 га.
2. Озера	– 566,8 га.
3. Сенокосы	– 83,5 га.
4. Кустарник заболоченный	– 17,0 га.
5. Пастбища	– 4,5 га.
Итого:	– 1613,6 га.

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 16.11.2007 № 178-па

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УБИНСКИЙ ОЗЕРНО-БОЛОТНЫЙ ЛАНДШАФТ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».

2. В состав памятника природы регионального значения «Убинский озерно-болотный ландшафт» Новосибирской области (далее – памятник природы) входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Памятник природы представляет собой своеобразный комплекс болотной растительности, расположенный среди лесостепного ландшафта в Убинском районе Новосибирской области. Это болото имеет важное средообразующее значение, так как поддерживает гидрологический режим окружающих территорий, прежде всего уровень воды в озере Убинское, стабилизирует климат.

Основной объект охраны в памятнике природы – своеобразный комплекс фрагментов болотных экосистем с примесью луговых элементов.

На территории памятника природы выявлено 248 высших и низших сосудистых растений, 67 видов птиц, 13 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 96 видов беспозвоночных.

В настоящее время здесь зарегистрировано 5 видов растений, 6 видов птиц, 2 вида млекопитающих, 2 вида насекомых, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области.

II. Цели и задачи создания памятника природы

3. Цели:

- 1) сохранение естественных природных комплексов;
- 2) сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций приозерного природного комплекса;
- 3) сохранение редких, исчезающих и интродуцированных видов фауны и флоры;
- 4) сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;

- 5) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
 - 6) экологическое воспитание населения.
4. Задачи:
- 1) поддержание целостности экосистемы;
 - 2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;
 - 3) сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия, свойственного только этой части Западной Сибири;
 - 4) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;
 - 5) обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;
 - 6) обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
 - 7) проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

III. Порядок образования памятника природы

5. Памятник природы образован постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 10.07.2003 (третий созыв, 20 сессия) на территории Убинского района Новосибирской области общей площадью 1613,6 га.

6. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.

IV. Правовой статус

7. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.

8. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).

9. Территория памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.

10. Срок действия - бессрочно.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

11. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

- 1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) распашка земель;

4) заготовка растительной земли;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

7) взрывные работы;

8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения;

9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

10) самовольное занятие земель;

11) разведение костров, выжигание луговой растительности;

12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

12. На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

4) организация экскурсий в воспитательных целях;

5) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.


13. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

14. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

15. Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

16. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

План границ памятника природы



Координаты границ памятника природы
в системе координат - WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	55°28'18.27"	79°40'27.22"
2	55°28'26.99"	79°42'11.97"
3	55°28'44.65"	79°43'13.61"
4	55°28'57.57"	79°43'59.33"
5	55°28'52.25"	79°44'01.46"
6	55°28'50.23"	79°44'02.37"
7	55°28'45.86"	79°44'07.68"
8	55°28'42.19"	79°44'12.99"
9	55°28'39.74"	79°44'18.99"
10	55°28'37.88"	79°44'21.02"
11	55°28'36.65"	79°44'22.04"
12	55°28'33.83"	79°44'22.26"
13	55°28'32.28"	79°44'21.24"
14	55°28'29.87"	79°44'22.67"
15	55°28'28.76"	79°44'26.41"
16	55°28'29.77"	79°44'35.38"
17	55°28'29.89"	79°44'42.51"
18	55°28'31.30"	79°44'48.85"
19	55°28'32.91"	79°44'54.37"
20	55°28'34.29"	79°44'58.47"
21	55°28'34.69"	79°45'08.78"
22	55°28'33.94"	79°45'15.10"
23	55°28'32.40"	79°45'20.49"
24	55°28'28.84"	79°45'25.75"
25	55°28'26.64"	79°45'27.78"
26	55°28'24.10"	79°45'33.82"
27	55°28'21.34"	79°45'38.03"
28	55°28'19.59"	79°45'42.98"
29	55°28'17.13"	79°45'55.65"
30	55°28'13.78"	79°46'03.73"
31	55°28'10.37"	79°46'10.00"
32	55°28'05.67"	79°46'14.74"
33	55°28'00.46"	79°46'12.17"
34	55°27'53.96"	79°46'11.93"
35	55°27'48.88"	79°46'24.31"
36	55°27'47.11"	79°46'31.35"
37	55°27'43.85"	79°46'37.42"
38	55°27'39.51"	79°46'41.85"
39	55°27'37.35"	79°46'43.40"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
40	55°27'34.33"	79°46'44.43"
41	55°27'28.86"	79°46'46.29"
42	55°27'24.49"	79°46'47.77"
43	55°27'22.33"	79°46'53.17"
44	55°27'20.25"	79°46'58.36"
45	55°27'17.15"	79°46'59.17"
46	55°27'15.07"	79°47'02.51"
47	55°27'11.22"	79°47'03.74"
48	55°27'08.20"	79°47'02.99"
49	55°27'07.23"	79°46'58.58"
50	55°27'08.18"	79°46'51.53"
51	55°27'15.11"	79°46'39.24"
52	55°27'15.88"	79°46'34.23"
53	55°27'17.88"	79°46'31.09"
54	55°27'18.79"	79°46'25.36"
55	55°27'20.29"	79°46'23.10"
56	55°27'19.53"	79°46'19.35"
57	55°27'19.12"	79°46'17.31"
58	55°27'18.27"	79°46'13.12"
59	55°27'18.11"	79°46'11.03"
60	55°27'17.75"	79°46'06.12"
61	55°27'17.49"	79°46'02.72"
62	55°27'17.02"	79°45'58.88"
63	55°27'15.94"	79°45'57.73"
64	55°27'14.64"	79°45'56.65"
65	55°27'13.59"	79°45'55.10"
66	55°27'13.19"	79°45'53.56"
67	55°27'13.92"	79°45'51.91"
68	55°27'14.77"	79°45'49.96"
69	55°27'14.92"	79°45'47.98"
70	55°27'14.83"	79°45'46.56"
71	55°27'14.19"	79°45'46.24"
72	55°27'12.55"	79°45'47.07"
73	55°27'12.29"	79°45'46.40"
74	55°27'12.87"	79°45'44.39"
75	55°27'12.73"	79°45'42.03"
76	55°27'11.44"	79°45'40.69"
77	55°27'09.16"	79°45'42.94"
78	55°27'07.58"	79°45'45.00"
79	55°27'05.94"	79°45'44.89"
80	55°27'05.40"	79°45'41.00"
81	55°27'05.32"	79°45'36.27"
82	55°27'06.32"	79°45'32.31"
83	55°27'07.12"	79°45'29.97"
84	55°27'07.96"	79°45'24.99"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
85	55°27'08.21"	79°45'21.98"
86	55°27'09.24"	79°45'21.33"
87	55°27'11.99"	79°45'16.65"
88	55°27'13.40"	79°45'13.46"
89	55°27'12.87"	79°45'10.17"
90	55°27'11.06"	79°45'09.91"
91	55°27'09.01"	79°45'08.46"
92	55°27'08.67"	79°45'04.96"
93	55°27'09.61"	79°45'01.05"
94	55°27'12.53"	79°44'57.45"
95	55°27'12.71"	79°44'52.31"
96	55°27'12.48"	79°44'46.70"
97	55°27'13.60"	79°44'42.38"
98	55°27'14.97"	79°44'38.87"
99	55°27'17.52"	79°44'38.25"
100	55°27'18.77"	79°44'37.95"
101	55°27'19.68"	79°44'35.06"
102	55°27'20.40"	79°44'32.76"
103	55°27'21.76"	79°44'24.05"
104	55°27'23.24"	79°44'19.98"
105	55°27'25.07"	79°44'17.88"
106	55°27'27.83"	79°44'17.28"
107	55°27'31.36"	79°44'14.70"
108	55°27'32.23"	79°44'09.88"
109	55°27'32.30"	79°44'06.30"
110	55°27'31.30"	79°44'01.98"
111	55°27'28.86"	79°43'58.89"
112	55°27'23.51"	79°43'59.00"
113	55°27'15.44"	79°43'54.67"
114	55°27'10.54"	79°43'49.20"
115	55°27'05.62"	79°43'45.18"
116	55°27'00.24"	79°43'43.52"
117	55°26'53.81"	79°43'37.95"
118	55°26'51.10"	79°43'35.16"
119	55°26'48.20"	79°43'32.18"
120	55°26'45.89"	79°43'29.59"
121	55°26'43.05"	79°43'26.40"
122	55°26'42.35"	79°43'19.40"
123	55°26'40.02"	79°43'13.84"
124	55°26'37.21"	79°43'09.10"
125	55°26'37.05"	79°43'03.04"
126	55°26'36.26"	79°42'58.65"
127	55°26'32.66"	79°42'54.26"
128	55°26'31.00"	79°42'50.19"
129	55°26'32.13"	79°42'48.85"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
130	55°26'33.77"	79°42'49.77"
131	55°26'34.30"	79°42'48.73"
132	55°26'34.43"	79°42'45.51"
133	55°26'34.77"	79°42'42.42"
134	55°26'37.12"	79°42'39.87"
135	55°26'40.15"	79°42'41.73"
136	55°26'44.13"	79°42'42.97"
137	55°26'46.65"	79°42'41.87"
138	55°26'46.97"	79°42'38.37"
139	55°26'48.53"	79°42'33.50"
140	55°26'48.65"	79°42'31.70"
141	55°26'48.33"	79°42'28.42"
142	55°26'47.94"	79°42'24.91"
143	55°26'46.85"	79°42'21.40"
144	55°26'45.70"	79°42'15.18"
145	55°26'47.82"	79°42'12.13"
146	55°26'50.58"	79°42'09.64"
147	55°26'53.30"	79°42'07.52"
148	55°26'54.53"	79°42'04.49"
149	55°26'56.18"	79°42'00.43"
150	55°26'56.89"	79°41'55.06"
151	55°26'59.03"	79°41'51.54"
152	55°27'01.52"	79°41'53.13"
153	55°27'02.61"	79°41'56.08"
154	55°27'04.73"	79°41'57.67"
155	55°27'08.27"	79°41'57.22"
156	55°27'09.43"	79°41'58.47"
157	55°27'10.04"	79°42'01.26"
158	55°27'11.35"	79°42'04.47"
159	55°27'13.01"	79°42'06.28"
160	55°27'14.37"	79°42'05.37"
161	55°27'13.74"	79°42'01.26"
162	55°27'13.22"	79°41'58.47"
163	55°27'13.23"	79°41'52.01"
164	55°27'13.35"	79°41'46.71"
165	55°27'11.68"	79°41'41.50"
166	55°27'09.37"	79°41'36.07"
167	55°27'09.89"	79°41'29.96"
168	55°27'12.33"	79°41'22.04"
169	55°27'12.33"	79°41'15.48"
170	55°27'10.44"	79°41'07.35"
171	55°27'11.67"	79°41'07.79"
172	55°27'17.01"	79°41'10.15"
173	55°27'20.50"	79°41'08.65"
174	55°27'25.26"	79°41'05.71"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
175	55°27'29.76"	79°40'58.81"
176	55°27'34.12"	79°40'55.50"
177	55°27'46.80"	79°40'47.51"
178	55°27'51.40"	79°40'41.58"
179	55°27'57.86"	79°40'34.39"
180	55°28'02.36"	79°40'29.64"
181	55°28'07.83"	79°40'23.19"
182	55°28'11.52"	79°40'22.74"
183	55°28'14.51"	79°40'23.71"

Краткая характеристика флоры и растительности (список основных видов растений)

Флористическое разнообразие памятника природы представлено 344 видами высших сосудистых растений. По результатам инвентаризации 2013 года за весь период исследований в памятнике природы зарегистрирован 101 вид высших сосудистых растений. При образовании памятника природы в 2003 году было представлено 299 видов. Из них не было обнаружено 243 вида (табл. 1). Флористический список памятника пополнился 45 видами растений. Из всех видов, отмеченных для данной территории, 7 включены в Красную книгу Новосибирской области, из них 5 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие» в Определителе растений НСО. Полный флористический список приведен в таблице 2.

Таблица 1

Сравнение флористических списков по результатам инвентаризации

2003 год образования памятника природы	Число видов			
	по результатам инвентаризации 2013	обнаруженных и ранее указанных в списке	не встреченных	новых для списка памятника природы
299	101	56	243	45

Во флористическом списке паспорта памятника присутствует 7 видов растений, занесенных в Красную книгу Новосибирской области. Из них за полевой сезон 2013 года 5 видов обнаружено не было. Таким образом, на данной территории в 2013 году было зарегистрировано 2 краснокнижных вида:

- осот болотный (*Sonchus palustris* L.) из семейства сложноцветные (рис. 1). Статус редкости 3(R) – редкий вид.
- лютик укореняющийся (*Ranunculus radicans* С.А. Мей) из семейства лютиковые (рис. 2). Статус редкости 2 (V) – уязвимый вид, находящийся на западной границе ареала.



Рис. 1. Осот болотный



Рис. 2. Лютик укореняющийся

Таблица 2

Аннотированный список видов флоры памятника природы
(по результатам инвентаризации)

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
1.	<i>Achillea asiatica</i> Serg.	Тысячелистник азиатский	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
2.	<i>Achillea millefolium</i> L.	Тысячелистник обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
3.	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Сныть обыкновенная	Apiaceae	9 повсеместный	+		
4.	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	Репейничек волосистый	Rosaceae	9 повсеместный	+		
5.	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Полевица гигантская	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
6.	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Полевица побегообразующая	Poaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
7.	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	Полевица тонкая	Poaceae	9 повсеместный	+		
8.	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb. s.l.	Полевица виноградниковая	Poaceae	9 повсеместный		+	
9.	<i>Alisma gramineum</i> Lej.	Частуха злаковидная	Alismataceae	9 повсеместный	+		
10.	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Частуха подорожниковая	Alismataceae	9 повсеместный	+		
11.	<i>Allium angulosum</i> L.	Лук угловатый	Liliaceae	8 ограниченный	+		
12.	<i>Allium rubens</i> Schrad. ex Willd.	Лук красноватый	Liliaceae	4 (In)	+		+
13.	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Лисохвост равный	Poaceae	9 повсеместный	+		
14.	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Лисохвост тростниковый	Poaceae	8 ограниченный	+	+	
15.	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Лисохвост луговой	Poaceae	9 повсеместный	+		
16.	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Щирица запрокинутая	Amaranthaceae	9 повсеместный	+		
17.	<i>Andromeda polifolia</i> L.	Подбел многолистный	Ericaceae	8 ограниченный	+		
18.	<i>Angelica palustris</i> (Bess.) Hoffm.	Дудник болотный, маточник болотный	Apiaceae	9 повсеместный		+	
19.	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Дудник лесной	Apiaceae	9 повсеместный	+	+	
20.	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	Резуха стреловидная	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
21.	<i>Arctium lappa</i> L.	Лопух большой, репейник	Asteraceae	6 редкий	+		
22.	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Лопух войлочный	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
23.	<i>Artemisia abrotanum</i> L.	Полынь лечебная	Asteraceae	8 ограниченный	+		
24.	<i>Artemisia campestris</i> L.	Полынь полевая	Asteraceae	6 редкий	+		
25.	<i>Artemisia commutata</i> Bess.	Полынь замещающая	Asteraceae	9 повсеместный	+		
26.	<i>Artemisia glauca</i> Pall. ex Willd.	Полынь серая	Asteraceae	9 повсеместный	+		
27.	<i>Artemisia laciniata</i> Willd.	Полынь рассеченная	Asteraceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
28.	<i>Artemisia rupestris</i> L.	Полынь каменная, скальная	Asteraceae	8 ограниченный		+	
29.	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Полынь обыкновенная	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
30.	<i>Astragalus danicus</i> Retz.	Астрагал датский	Fabaceae	9 повсеместный	+		
31.	<i>Astragalus uliginosus</i> L.	Астрагал болотный	Fabaceae	8 ограниченный	+		
32.	<i>Atriplex crassifolia</i> C.A. Mey.	Лебеда толстолистная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
33.	<i>Atriplex littoralis</i> L.	Лебеда прибрежная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
34.	<i>Atriplex micrantha</i> C.A. Mey.	Лебеда мелкоцветковая	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
35.	<i>Atriplex pedunculata</i> L.	Лебеда стебельчатая	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
36.	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Лебеда простертая	Chenopodiaceae	9 повсеместный	+		
37.	<i>Atriplex sagittata</i> Borkh.	Лебеда стреловидная	Chenopodiaceae	9 повсеместный	+		
38.	<i>Atriplex tatarica</i> L.	Лебеда татарская	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
39.	<i>Axiris amaranthoides</i> L.	Безвкусица щирцевидная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
40.	<i>Bassia sedoides</i> (Pall.) Aschers.	Бассия очитковидная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
41.	<i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.	Шелковник водяной	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
42.	<i>Batrachium rionii</i> (Lager) Nym.	Шелковник Риона	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
43.	<i>Batrachium trichophyllum</i> (Chaix) Bosch	Шелковник волосистый	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
44.	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Икотник серый	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
45.	<i>Betula alba</i> L.	Береза пушистая, белая	Betulaceae	9 повсеместный	+	+	
46.	<i>Betula nana</i> L.	Береза карликовая	Betulaceae	9 повсеместный	+		
47.	<i>Betula pendula</i> Roth.	Берёза бородавчатая	Betulaceae	9 повсеместный	+		
48.	<i>Bidens tripartita</i> L.	Черёда трехраздельная	Asteraceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
49.	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Клубнекамыш приморский	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
50.	<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (Fr. Schmidt) Egor.	Клубнекамыш плоскостебельный	Cyperaceae	8 ограниченный	+	+	
51.	<i>Brassica campestris</i> L.	Капуста полевая	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
52.	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Капуста сарептская, горчица сарептская	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
53.	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub	Кострец безостый	Poaceae	9 повсеместный	+		
54.	<i>Bromus secalinus</i> L.	Костер ржаной	Poaceae	6 редкий	+		
55.	<i>Butomus umbellatus</i> L.	Сусак зонтичный	Butomaceae	9 повсеместный	+		
56.	<i>Calamagrostis canescens</i> (Web.) Roth	Вейник седеющий	Poaceae	9 повсеместный	+		
57.	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	Вейник наземный	Poaceae	9 повсеместный	+		
58.	<i>Calamagrostis macrolepis</i> Litv.	Вейник крупночешуйный	Poaceae	8 ограниченный		+	
59.	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Hall. fil.) Koel.	Вейник ложнотростниковый	Poaceae	8 ограниченный		+	
60.	<i>Calla palustris</i> L.	Белокрыльник болотный	Araceae	6 редкий	+		
61.	<i>Caltha palustris</i> L.	Калужница болотная	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
62.	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Повой заборный	Convolvulaceae	8 ограниченный		+	
63.	<i>Camelina microcarpa</i> Andr.	Рыжик мелкоплодный	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
64.	<i>Campanula sibirica</i> L.	Колокольчик сибирский	Campanulaceae	9 повсеместный	+		
65.	<i>Campanula wolgensis</i> P. Smirn.	Колокольчик волжский	Campanulaceae	8 ограниченный	+		
66.	<i>Camphorosma songorica</i> Bunge	Камфоросма джунгарская	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
67.	<i>Cannabis sativa</i> L.	Конопля посевная	Cannabaceae	9 повсеместный	+		
68.	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Пастушья сумка обыкновенная	Brassicaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
69.	<i>Carex acuta</i> L.	Осока острая, стройная	Cyperaceae	9 повсеместный	+		
70.	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Осока островидная	Cyperaceae	9 повсеместный	+	+	
71.	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Осока Буксбаума	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
72.	<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	Осока гвоздичная	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
73.	<i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	Осока ржаная	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
74.	<i>Carex tomentosa</i> L.	Осока войлочная	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
75.	<i>Carex vesicaria</i> L.	Осока пузырчатая	Cyperaceae	9 повсеместный	+		
76.	<i>Carum carvi</i> L.	Тмин обыкновенный	Apiaceae	9 повсеместный	+		
77.	<i>Cenolophium denudatum</i> (Hornem.) Tutin	Пустореберник Фишера	Apiaceae	9 повсеместный		+	
78.	<i>Cerastium arvense</i> L.	Ясколка луговая	Caryophyllaceae	8 ограниченный	+		
79.	<i>Cerastium holsteoides</i> Fres.	Ясколка дернистая, костенцевидная	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
80.	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Роголистник погруженный	Ceratophyllaceae	9 повсеместный	+		
81.	<i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub	Хамерион узколистный	Onagraceae	9 повсеместный	+	+	
82.	<i>Chamomilla suaveolens</i> (Pursh) Rydb.	Ромашка пахучая	Asteraceae	9 повсеместный	+		
83.	<i>Chenopodium album</i> L.	Марь белая	Chenopodiaceae	9 повсеместный	+		
84.	<i>Chenopodium botryodes</i> Smith	Марь кистевидная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
85.	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Марь сизая	Chenopodiaceae	9 повсеместный	+		
86.	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Марь гибридная	Chenopodiaceae	8 ограниченный		+	
87.	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Марь многосемянная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
88.	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	Марь торчащая	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
89.	<i>Cicuta virosa</i> L.	Вех ядовитый	Apiaceae	9 повсеместный	+		
90.	<i>Cirsium esculentum</i> (Siev.) C.A. Mey.	Бодяк съедобный	Asteraceae	9 повсеместный		+	
91.	<i>Cirsium serratuloides</i> (L.) Hill	Бодяк серпуховидный	Asteraceae	6 редкий		+	
92.	<i>Cirsium setosum</i> (Willd.) Bess.	Бодяк щетинистый	Asteraceae	9 повсеместный		+	
93.	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Бодяк обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный		+	
94.	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) C. Hartm.	Поллопестник зеленый	Orchidaceae	6 редкий	+		
95.	<i>Comarum palustre</i> L.	Сабельник болотный	Rosaceae	9 повсеместный	+		
96.	<i>Conioselinum tatricum</i> Hoffm.	Гирчовник татарский, влагалищный	Apiaceae	9 повсеместный	+		
97.	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Вьюнок полевой	Convolvulaceae	9 повсеместный	+		
98.	<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch	Скерда тупокорневищная	Asteraceae	9 повсеместный	+		
99.	<i>Crepis sibirica</i> L.	Скерда сибирская	Asteraceae	9 повсеместный	+		
100.	<i>Cuscuta europaea</i> L.	Повилика европейская	Cuscutaceae	8 ограниченный	+		
101.	<i>Cuscuta lupuliformis</i> Kroker	Повилика хмелевидная	Cuscutaceae	8 ограниченный	+		
102.	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Ежа сборная	Poaceae	8 ограниченный	+		
103.	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo	Пальцекоренник мясо-красный	Orchidaceae	9 повсеместный	+		
104.	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Дескурения Софии	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
105.	<i>Dianthus ramosissimus</i> Pall. ex Poir.	Гвоздика широковетвистая	Caryophyllaceae	3 (R)	+		+
106.	<i>Dianthus superbus</i> L.	Гвоздика пышная	Caryophyllaceae	8 ограниченный	+		
107.	<i>Draba nemorosa</i> L.	Крупка перелесковая	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
108.	<i>Dracocephalum nutans</i> L.	Змееголовник поникший	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
109.	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	Змееголовник Руйша	Lamiaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
110.	<i>Dracocephalum thymiflorum</i> L.	Змееголовник тимьяноцветный	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
111.	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	РосЯнка круглолистная	Droseraceae	6 редкий	+		
112.	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	Щитовник шартрский, остистый	Aspidiaceae	6 редкий		+	
113.	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	Щитовник гребенчатый	Aspidiaceae	6 редкий	+		
114.	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.	Болотница игольчатая	Cyperaceae	6 редкий	+		
115.	<i>Elymus mutabilis</i> (Drob.) Tzvel.	Пырейник изменчивый	Poaceae	9 повсеместный	+		
116.	<i>Elymus sibiricus</i> L.	Пырейник сибирский	Poaceae	9 повсеместный	+		
117.	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	Пырей ползучий	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
118.	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Кипрей мохнатый	Onagraceae	8 ограниченный	+	+	
119.	<i>Epilobium palustre</i> L.	Кипрей болотный	Onagraceae	9 повсеместный	+	+	
120.	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Кипрей четырехсторонний	Onagraceae	9 повсеместный	+		
121.	<i>Equisetum arvense</i> L.	Хвощ полевой	Equisetaceae	9 повсеместный	+		
122.	<i>Equisetum palustre</i> L.	Хвощ болотный	Equisetaceae	9 повсеместный	+		
123.	<i>Erigeron acris</i> L.	Мелколепестник острый	Asteraceae	9 повсеместный		+	
124.	<i>Eriophorum gracile</i> Koch	Пушица стройная	Cyperaceae	6 редкий	+		
125.	<i>Eryngium planum</i> L.	Синеголовник плосколистный	Apiaceae	9 повсеместный	+		
126.	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Желтушник левкойный	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
127.	<i>Erysimum hieracifolium</i> L.	Желтушник ястребиноковый	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
128.	<i>Euphorbia virgata</i> Waldst. et Kit.	Молочай лозный, или прутьевидный	Euphorbiaceae	9 повсеместный	+		
129.	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	Очанка гребенчатая, татарская	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+		
130.	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	Гречиха татарская	Polygonaceae	8 ограниченный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
131.	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Гречишка кустарниковая	Polygonaceae	8 ограниченный	+		
132.	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Овсяница луговая	Poaceae	9 повсеместный	+		
133.	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Лабазник вязолистный	Rosaceae	9 повсеместный	+	+	
134.	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Лабазник обыкновенный	Rosaceae	9 повсеместный	+		
135.	<i>Fragaria viridis</i> Duch.	Клубника, земляника зеленая	Rosaceae	9 повсеместный	+		
136.	<i>Galatella biflora</i> (L.) Nees	Солонечник двцветковый	Asteraceae	9 повсеместный		+	
137.	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Пикульник двунадрезный	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
138.	<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Пикульник ладанниковый	Lamiaceae	8 ограниченный	+		
139.	<i>Galium boreale</i> L. s.l.	Подмаренник северный	Rubiaceae	9 повсеместный	+	+	
140.	<i>Galium palustre</i> L.	Подмаренник болотный	Rubiaceae	9 повсеместный		+	
141.	<i>Galium ruprechtii</i> Pobed.	Подмаренник Рупрехта	Rubiaceae	встреч.		+	
142.	<i>Galium spurium</i> L.	Подмаренник ложный	Rubiaceae	6 редкий	+		
143.	<i>Galium trifidum</i> L.	Подмаренник трехнадрезный	Rubiaceae	нет	+		
144.	<i>Galium uliginosum</i> L.	Подмаренник топяной	Rubiaceae	9 повсеместный	+		
145.	<i>Galium verum</i> L.	Подмаренник настоящий	Rubiaceae	9 повсеместный	+	+	
146.	<i>Gentiana amarella</i> L.	Горечавка горькая	Gentianaceae	8 ограниченный	+		
147.	<i>Gentiana ciliata</i> L.	Горечавка реснитчатая	Gentianaceae	6 редкий	+		
148.	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Горечавка легочная, синий зверобой	Gentianaceae	9 повсеместный	+	+	
149.	<i>Geranium bifolium</i> Patr.	Герань двулистная	Geraniaceae	8 ограниченный	+		
150.	<i>Geranium pratense</i> L.	Герань луговая	Geraniaceae	9 повсеместный	+		
151.	<i>Geranium pseudosibiricum</i> J. Mayer	Герань ложносибирская	Geraniaceae	8 ограниченный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
152.	<i>Geranium sibiricum</i> L.	Герань сибирская	Geraniaceae	9 повсеместный	+		
153.	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	Гравилат алепский	Rosaceae	9 повсеместный	+		
154.	<i>Geum rivale</i> L.	Гравилат речной	Rosaceae	9 повсеместный	+		
155.	<i>Glaux maritima</i> L.	Млечник приморский	Primulaceae	8 ограниченный	+	+	
156.	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Будра плющевидная	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
157.	<i>Glycyrhiza uralensis</i> Fisch.	Солодка уральская	Fabaceae	9 повсеместный	+		
158.	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Кокушник длиннорогий	Orchidaceae	6 редкий	+		
159.	<i>Heracleum dissectum</i> Ledeb.	Борщевик рассеченный, пучка	Apiaceae	9 повсеместный	+		
160.	<i>Heracleum sibiricum</i> L.	Борщевик сибирский	Apiaceae	8 ограниченный	+		
161.	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Бровник одноклубневый	Orchidaceae	6 редкий	+		
162.	<i>Hesperis sibirica</i> L.	Вечерница сибирская	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
163.	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Ястребинка зонтичная	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
164.	<i>hordeum brevisubulatum</i> (Trin.) Link	Ячмень короткоостистый	Poaceae	9 повсеместный		+	
165.	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Водокрас обыкновенный	Hydrocharitaceae	9 повсеместный	+	+	
166.	<i>Inula aspera</i> Poir.	Девясил шероховатый	Asteraceae	8 ограниченный	+		
167.	<i>Iris ruthenica</i> Ker-Gawl.	Касатик, ирис русский	Iridaceae	8 ограниченный	+		
168.	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Ситник сплюснутый	Juncaceae	9 повсеместный		+	
169.	<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	Ситник Жерара	Juncaceae	9 повсеместный		+	
170.	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Короставник полевой	Dipsacaceae	9 повсеместный	+		
171.	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey.	Латук татарский	Asteraceae	9 повсеместный		+	
172.	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dum.	Липучка щетинистая, ежевидная	Boraginaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
173.	<i>Lathyrus palustris</i> L.	Чина болотная	Fabaceae	6 редкий	+	+	
174.	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	Чина гороховидная	Fabaceae	9 повсеместный	+		
175.	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Чина луговая	Fabaceae	9 повсеместный	+	+	
176.	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Чина клубневая	Fabaceae	9 повсеместный	+		
177.	<i>Ledum palustre</i> L.	Багульник болотный	Ericaceae	8 ограниченный	+		
178.	<i>Lemna minor</i> L.	Ряска маленькая	Lemnaceae	9 повсеместный		+	
179.	<i>Lepidium cordatum</i> Willd. ex Stev.	Клоповник сердцелистный	Brassicaceae	6 редкий	+		
180.	<i>Lepidium crassifolium</i> Waldst. et Kit.	Клоповник толстолистный	Brassicaceae	6 редкий	+		
181.	<i>Lepidium latifolium</i> L.	Клоповник широколистный	Brassicaceae	8 ограниченный	+		
182.	<i>Lepidium ruderae</i> L.	Клоповник мусорный	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
183.	<i>Ligularia glauca</i> (L.) O. Hoffm.	Бузульник сизый	Asteraceae	9 повсеместный	+		
184.	<i>Lilium pilosiusculum</i> (Freyn) Misch.	Лилия саранка	Liliaceae	9 повсеместный	+		
185.	<i>Limonium gmelinii</i> (Willd.) O. Kuntze	Кермек Гмелина	Plumbaginaceae	9 повсеместный		+	
186.	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льнянка обыкновенная	Scrophulariaceae	9 повсеместный	+	+	
187.	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Воробейник лекарственный	Boraginaceae	8 ограниченный	+		
188.	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Зюзник европейский	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
189.	<i>Lycopus exaltatus</i> L. fil.	Зюзник высокий	Lamiaceae	6 редкий	+		
190.	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербейник обыкновенный	Primulaceae	9 повсеместный	+	+	
191.	<i>Lythrum virgatum</i> L.	Дербенник прутовидный, плакун	Lythraceae	8 ограниченный	+	+	
192.	<i>Medicago falcata</i> L.	Люцерна серповидная	Fabaceae	9 повсеместный	+		
193.	<i>Medicago lupulina</i> L.	Люцерна хмелевидная	Fabaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
194.	<i>Medicago sativa</i> L.	Люцерна посевная	Fabaceae	9 повсеместный	+		
195.	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Марьянник гребенчатый	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+		
196.	<i>Melilotus albus</i> Medik.	Донник белый	Fabaceae	9 повсеместный	+		
197.	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Донник лекарственный	Fabaceae	9 повсеместный		+	
198.	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl	Мерингия бокоцветная	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+	+	
199.	<i>Myosotis caespitosa</i> K.F. Schultz	Незабудка дернистая	Boraginaceae	9 повсеместный	+		
200.	<i>Myosotis imitata</i> Serg.	Незабудка подражающая, душистая	Boraginaceae	8 ограниченный	+		
201.	<i>Myosotis palustris</i> (L.) L.	Незабудка болотная	Boraginaceae	9 повсеместный	+		
202.	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Уруть мутовчатая	Haloragaceae	9 повсеместный	+		
203.	<i>Naumburgia thyrsoflora</i> (L.) Reichenb.	Наумбургия кистецветная	Primulaceae	9 повсеместный	+		
204.	<i>Nonea pulla</i> (L.) DC.	Ноня темно-бурая	Boraginaceae	9 повсеместный	+		
205.	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	Кубышка желтая	Nymphaeaceae	8 ограниченный	+		
206.	<i>Nymphaea candida</i> J. Presl.	Кувшинка чисто-белая, белая водяная лилия	Nymphaeaceae	8 ограниченный	+		
207.	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	Кувшинка малая	Nymphaeaceae	6 редкий	+		
208.	<i>Odontites vulgaris</i> Moench	Зубчатка обыкновенная, поздняя	Scrophulariaceae	9 повсеместный		+	
209.	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Омежник водяной	Apiaceae	6 редкий	+		
210.	<i>Origanum vulgare</i> L.	Душица обыкновенная	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
211.	<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl.	Заразиха эльзасская	Orobanchaceae	6 редкий	+		
212.	<i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	Клюква мелкоплодная	Vacciniaceae	8 ограниченный	+		
213.	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	Остролодочник волосистый	Fabaceae	8 ограниченный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
214.	<i>Padus avium</i> Mill.	Черемуха обыкновенная	Rosaceae	9 повсеместный	+		
215.	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Вороний глаз четырёхлиственный	Trilliaceae	9 повсеместный	+		
216.	<i>Parnassia palustris</i> L.	Белозор болотный	Parnassiaceae	9 повсеместный	+	+	
217.	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray	Горец земноводный	Polygonaceae	нет	+		
218.	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F. Gray	Горец развесистый	Polygonaceae	8 ограниченный	+		
219.	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Горичник болотный	Apiaceae	8 ограниченный	+	+	
220.	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	Тимофеевка степная	Poaceae	9 повсеместный	+		
221.	<i>Phleum pratense</i> L.	Тимофеевка луговая	Poaceae	9 повсеместный	+		
222.	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	Зопник клубненосный	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
223.	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Тростник южный	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
224.	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Бедренец обыкновенный	Apiaceae	9 повсеместный	+		
225.	<i>Plantago cornuti</i> Gouan	Подорожник Корнута	Plantaginaceae	8 ограниченный	+	+	
226.	<i>Plantago major</i> L.	Подорожник большой (обыкновенный)	Plantaginaceae	9 повсеместный	+		
227.	<i>Plantago maritima</i> L.	Подорожник приморский, солончаковый	Plantaginaceae	8 ограниченный	+		
228.	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Любка двулистная	Orchidaceae	6 редкий	+		
229.	<i>Pleurospermum uralense</i> Hoffm.	Реброплодник уральский	Apiaceae	9 повсеместный	+		
230.	<i>Poa angustifolia</i> L.	Мятлик узколистный	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
231.	<i>Poa palustris</i> L.	Мятлик болотный	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
232.	<i>Poa remota</i> Forsell.	Мятлик расставленный	Poaceae	8 ограниченный		+	
233.	<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	Спорыш обыкновенный	Polygonaceae	9 повсеместный	+		
234.	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Спорыш птичий	Polygonaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
235.	<i>Populus tremula</i> L.	Тополь дрожащий, осина	Salicaceae	9 повсеместный	+	+	
236.	<i>Potamogeton compressus</i> L.	Рдест сплюснутый	Potamogetonaceae	6 редкий	+		
237.	<i>Potamogeton lucens</i> L.	Рдест блестящий	Potamogetonaceae	6 редкий	+		
238.	<i>Potamogeton macrocarpus</i> Dobroch.	Рдест крупноплодный	Potamogetonaceae	6 редкий	+		
239.	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Рдест гребенчатый	Potamogetonaceae	9 повсеместный	+		
240.	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Рдест пронзеннолистный	Potamogetonaceae	8 ограниченный	+		
241.	<i>Potentilla anserina</i> L.	Лапчатка гусиная	Rosaceae	9 повсеместный	+	+	
242.	<i>Potentilla argentea</i> L.	Лапчатка серебристая	Rosaceae	9 повсеместный	+	+	
243.	<i>Potentilla multifida</i> L.	Лапчатка многонадрезная	Rosaceae	9 повсеместный	+		
244.	<i>Potentilla tanacetifolia</i> Willd. ex Schlecht.	Лапчатка рябинколистная	Rosaceae	6 редкий	+		
245.	<i>Primula cortusoides</i> L.	Первоцвет кортузовидный	Primulaceae	6 редкий	+		
246.	<i>Primula Longiscapa</i> Ledeb.	Первоцвет длинностебельный	Primulaceae	9 повсеместный	+	+	
247.	<i>Ptarmica salicifolia</i> (Bess.) Serg.	Чихотная трава иволистная	Asteraceae	9 повсеместный		+	
248.	<i>Pulmonaria dacica</i> Simonk.	Медуница (медунка, легочница) мягчайшая	Boraginaceae	9 повсеместный	+		
249.	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	Прострел раскрытый	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
250.	<i>Pyrola media</i> Sw.	Грушанка средняя	Pyrolaceae	8 ограниченный	+		
251.	<i>Ranunculus acris</i> L.	Лютик едкий	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
252.	<i>Ranunculus monophyllus</i> Ovcz.	Лютик однолистный	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
253.	<i>Ranunculus polyanthemos</i> L.	Лютик многоцветковый	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
254.	<i>Ranunculus polyrhizos</i> Steph.	Лютик многокорневой	Ranunculaceae	8 ограниченный		+	
255.	<i>Ranunculus repens</i> L.	Лютик ползучий	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
256.	<i>Ranunculus reptans</i> L.	Лютик распростертый	Ranunculaceae	3 (R)	+		+
257.	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Лютик ядовитый	Ranunculaceae	9 повсеместный	+	+	
258.	<i>Ranunculus radicans</i> C.A. Mey	Лютик укореняющийся	Ranunculaceae	2 (V)	+	+	+
259.	<i>Rhinanthus aestivalis</i> (N. Zing.) Schischkin et Serg.	Погремок летний	Scrophulariaceae	8 ограниченный		+	
260.	<i>Ribes nigrum</i> L.	Смородина черная	Grossulariaceae	9 повсеместный	+	+	
261.	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Bess.	Жерушник земноводный	Brassicaceae	6 редкий	+		
262.	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.	Жерушник болотный	Brassicaceae	9 повсеместный	+	+	
263.	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	Роза иглистая	Rosaceae	9 повсеместный	+		
264.	<i>Rosa majalis</i> Herm.	Шиповник майский	Rosaceae	9 повсеместный	+		
265.	<i>Rubus arcticus</i> L.	Княженика, поляника	Rosaceae	6 редкий	+		
266.	<i>Rubus chamaemorus</i> L.	Морошка, малина приземистая,	Rosaceae	6 редкий	+		
267.	<i>Rubus idaeus</i> L.	Малина обыкновенная	Rosaceae	9 повсеместный	+		
268.	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяника каменистая	Rosaceae	9 повсеместный	+	+	
269.	<i>Rumex aquaticus</i> L.	Щавель водяной	Polygonaceae	8 ограниченный	+		
270.	<i>Rumex acetosella</i> L.	Щавель воробьиный	Polygonaceae	8 ограниченный		+	
271.	<i>Rumex maritimus</i> L.	Щавель приморский	Polygonaceae	9 повсеместный		+	
272.	<i>Rumex pseudonatronatus</i> (Borb.) Borb. ex Murb.	Щавель ложносолончаковый	Polygonaceae	8 ограниченный		+	
273.	<i>Salicornia europaea</i> L.	Солерос европейский	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
274.	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	Ива Бейба	Salicaceae	9 повсеместный	+		
275.	<i>Salix caprea</i> L.	Ива козья	Salicaceae	9 повсеместный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
276.	<i>Salix cinerea</i> L.	Ива пепельная	Salicaceae	9 повсеместный	+	+	
277.	<i>Salix dasyclados</i> Wimm.	Ива шерстистопобеговая	Salicaceae	9 повсеместный		+	
278.	<i>Salix lapponium</i> L.	Ива лапландская	Salicaceae	8 ограниченный		+	
279.	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.	Ива мирзинолистная	Salicaceae	6 редкий		+	
280.	<i>Salix pentandra</i> L.	Ива пятитычинковая	Salicaceae	9 повсеместный		+	
281.	<i>Salix rosmarinifolia</i> L.	Ива розмаринолистная, сибирская	Salicaceae	9 повсеместный	+		
282.	<i>Salix viminalis</i> L.	Ива корзиночная	Salicaceae	9 повсеместный	+		
283.	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Кровохлебка лекарственная	Rosaceae	9 повсеместный	+		
284.	<i>Saussurea amara</i>	Горькуша горькая	Asteraceae	9 повсеместный		+	
285.	<i>Scirpus hippolyti</i> V. Krecz.	Камыш Ипполита	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
286.	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	Камыш укореняющийся	Cyperaceae	5 критический	+		
287.	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C. Gmelin	Камыш Табернемонтана	Cyperaceae	9 повсеместный	+		
288.	<i>Scolochloa festuacea</i> (Willd.) Link	Тростянка овсяницеvidная	Poaceae	8 ограниченный		+	
289.	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Шлемник обыкновенный	Lamiaceae	9 повсеместный		+	
290.	<i>Sedum telephium</i> Czerep.	Очиток пурпуровый	Crassulaceae	9 повсеместный	+	+	
291.	<i>Senecio congestus</i> (R.Br.) DC.	Крестовник скученный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
292.	<i>Senecio erucifolius</i> L.	Крестовник эруколистный	Asteraceae	9 повсеместный		+	
293.	<i>Senecio integrifolius</i> (L.) Clairv.	Крестовник цельнолистный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
294.	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Жабрица порезниковая, гранатник	Apiaceae	9 повсеместный	+		
295.	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh.	Смолевка зеленоцветковая	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
296.	<i>Silene multiflora</i> (Waldst. et Kit.) Pers.	Смолевка многоцветковая	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
297.	<i>Solanum kitagawae</i> Schonbeck-Temesy	Паслен Китагавы	Solanaceae	9 повсеместный	+	+	
298.	<i>Solanum nigrum</i> L.	Паслен черный	Solanaceae	9 повсеместный	+		
299.	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Осот полевой	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
300.	<i>Sonchus palustris</i> L.	Осот болотный	Asteraceae	3 (R)	+	+	+
301.	<i>Spergularia marina</i> (L.) Grieseb.	Торичник приморский, солончаковый	Caryophyllaceae	6 редкий	+		
302.	<i>Spiranthes amoena</i> (Bieb.) Spreng.	Скрученник приятный	Orchidaceae	6 редкий	+		
303.	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Многокоренник обыкновенный	Lemnaceae	6 редкий		+	
304.	<i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh.	Звездчатка толстолистная	Caryophyllaceae	8 ограниченный	+		
305.	<i>Stellaria graminea</i> L.	Звездчатка злаковая	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+	+	
306.	<i>Stellaria holostea</i> L.	Звездчатка ланцетовидная	Caryophyllaceae	3 (R)	+		+
307.	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Звездчатка средняя, мокрица	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
308.	<i>Stellaria palustris</i> Retz.	Звездчатка болотная	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
309.	<i>Stratiotes aloides</i> L.	Телорез обыкновенный	Hydrocharitaceae	6 редкий	+		
310.	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Пижма обыкновенная	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
311.	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg. s.l.	Одуванчик обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
312.	<i>Thalictrum simplex</i> L.	Василисник простой	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
313.	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Телиптерис болотный	Thelypteridaceae	9 повсеместный	+		
314.	<i>Thesium refractum</i> C.A. Mey.	Ленец сибирский	Santalaceae	6 редкий	+		
315.	<i>Thesium repens</i> Ledeb.	Ленец ползучий	Santalaceae	6 редкий	+		
316.	<i>Thlaspi arvense</i> L.	Ярутка полевая	Brassicaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
317.	<i>Tragopogon orientalis</i> L.	Козлобородник восточный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
318.	<i>Trifolium lupinaster</i> L.	Клевер люпиновый	Fabaceae	9 повсеместный	+		
319.	<i>Trifolium pratense</i> L.	Клевер луговой	Fabaceae	9 повсеместный	+	+	
320.	<i>Trifolium repens</i> L.	Клевер ползучий	Fabaceae	9 повсеместный	+		
321.	<i>Triglochin maritimum</i> L.	Триостренник приморский	Juncaginaceae	8 ограниченный	+	+	
322.	<i>Triglochin palustre</i> L.	Триостренник болотный	Juncaginaceae	9 повсеместный	+		
323.	<i>Tripolium vulgare</i> Nees	Триполиум обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
324.	<i>Trommsdorffia maculata</i> (L.) Bernh.	Прозанник, Пазник крапчатый	Asteraceae	9 повсеместный	+		
325.	<i>Turritis glabra</i> L.	Башенница голая	Brassicaceae	6 редкий	+		
326.	<i>Typha angustifolia</i> L.	Рогоз узколистный	Typhaceae	9 повсеместный		+	
327.	<i>Urtica cannabina</i> L.	Крапива коноплевая	Urticaceae	9 повсеместный	+		
328.	<i>Urtica dioica</i> L.	Крапива двудомная	Urticaceae	9 повсеместный	+	+	
329.	<i>Urtica urens</i> L.	Крапива жгучая	Urticaceae	9 повсеместный	+		
330.	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Брусника	Vacciniaceae	8 ограниченный	+		
331.	<i>Valeriana officinalis</i> L. s.l. (<i>Valeriana dubia</i> Bunge)	Валериана лекарственная (Валериана сомнительная)	Valerianaceae	8 ограниченный	+		
332.	<i>Valeriana officinalis</i> L. s.l. (<i>Valeriana rossica</i> P. Smirn.)	Валериана лекарственная (Валериана русская)	Valerianaceae	6 редкий	+		
333.	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Вероника ключевая	Scrophulariaceae	9 повсеместный	+		
334.	<i>Veronica longifolia</i>	Вероника длиннолистная	Scrophulariaceae	9 повсеместный		+	
335.	<i>Veronica spicata</i> L.	Вероника колосистая	Scrophulariaceae	9 повсеместный	+		
336.	<i>Veronica spuria</i> L.	Вероника ненастоящая	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
337.	<i>Vicia amoena</i> Fisch.	Горошек приятный	Fabaceae	9 повсеместный	+		
338.	<i>Vicia cracca</i> L.	Горошек мышиный	Fabaceae	9 повсеместный	+	+	
339.	<i>Vicia megalotropis</i> Ledeb.	Горошек крупнолодочковый	Fabaceae	8 ограниченный	+		
340.	<i>Vicia sepium</i> L.	Горошек заборный	Fabaceae	9 повсеместный	+		
341.	<i>Vicia sylvatica</i> L.	Горошек лесной	Fabaceae	8 ограниченный	+		
342.	<i>Viola canina</i> L.	Фиалка собачья	Violaceae	9 повсеместный	+		
343.	<i>Viola hirta</i> L.	Фиалка волосистая	Violaceae	9 повсеместный	+		
344.	<i>Viola stagnina</i> Kit.	Фиалка персколистная	Violaceae	6 редкий	+		
				ИТОГО	299	101	6

Территория памятника природы представляет собой природный комплекс растительных сообществ: ивово-березовые и осиновые сообщества, разнотравно-осоково-вейниковые луговые сообщества, тростниковые и разнотравно-тростниковые болотные сообщества

Таблица 3

Основные растительные сообщества памятника природы

Растительное сообщество	Процент от общей площади, %
Ивово-березовые и осиновые сообщества	17,7
Разнотравно-осоково-вейниковые луговые сообщества	28,5
Тростниковые и разнотравно-тростниковые болотные сообщества	53,8



Рис. 3. Ивово-березовое сообщество



Рис. 4. Разнотравно-злаковый луг



Рис. 5. Тростниковое болото




Рис. 6. Карта-схема растительности памятника природы

Краткие сведения о животном мире (список основных видов)
(по результатам инвентаризации 2013 года)

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Хвостатые – Caudata

Семейство Углозубые – Hynobiidae

Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii (Dybowsky, 1870). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Семейство Саламандровые – Salamandridae

Обыкновенный тритон – Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Отряд Бесхвостые – Anura

Семейство Жабы – Bufonidae

Серая жаба – Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области предпочитает лесные ландшафты, особенно сосняки, чередующиеся с полосами болот (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Семейство Настоящие лягушки – Ranidae

Остромордая лягушка – Rana arvalis (Nilsson, 1842). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Наиболее обычный вид амфибий, по всей территории распространён в Новосибирской области (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Многочисленный вид.

Озёрная лягушка – Rana ridibunda (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области встречается с 1990-х гг. в пределах Ордынского и Сузунского районов (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Указана в Паспорте ООПТ, нами не отмечена. Встреча на территории ООПТ крайне маловероятна.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – Squamata

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Живородящая ящерица – *Zootoca vivipara* (Jacquin, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области населяет леса разных типов, где придерживается окраин болот, берегов лесных речек, зарастающих вырубок и гарей, опушек, полян, тропинок, просек (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Немногочисленный вид.

Семейство Ужеобразные – Colubridae

Обыкновенный уж – *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В пределах Новосибирской области распространён, главным образом, в районах, прилегающих к реке Оби и её притокам (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Семейство Гадюковые – Viperidae

Обыкновенная гадюка – *Vipera berus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области населяет лесостепную и лесную зону к северу и востоку от оз. Чаны (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Обычный вид.

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes

Семейство Гагаровые – Gaviidae

Чернозобая гагара – *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Западной Сибири распространён практически по всей территории, на север – до южных тундр (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится в основном в северных районах, спорадически распространена в степной и лесостепной зонах (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий гнездящийся вид (0,02 особи/га водоёмов, 6 пар).

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes

Семейство Поганковые – Podicipedidae

Красношейная поганка – *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU A2abce+3bce+4abce (уязвимый вид). В Западной Сибири распространена от лесотундры до степи (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится, преимущественно, в лесной и лесостепной зонах, в восточных районах не отмечена (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий гнездящийся вид (0,04 особи/га открытой водной поверхности, 10 пар).

Чомга – *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена по всей территории, но более обычна в степных и лесостепных районах. Обычный гнездящийся вид.

Серощёкая поганка – *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена преимущественно в степных и лесостепных районах. Обычный гнездящийся вид.

Черношейная поганка – *Podiceps nigricollis* (Brehm, 1831). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена преимущественно в степных и лесостепных районах. Обычный гнездящийся вид.

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Семейство Цаплевые – Ardeidae

Выпь большая – *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Обычный гнездящийся вид.

Серая цапля – *Ardea cinerea* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области наиболее обычна в лесостепных и степных районах. Обычный гнездящийся вид.

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Гуменник – *Anser fabalis* (Latham, 1787). (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Широко распространён в тундровой и таёжной зонах Западной Сибири (Рябицев, 2008). В Новосибирской области в настоящее время не гнездится, а встречается во время миграции, наиболее часто – в Барабинском, Купинском, Здвинском, Купинском, Доволенском, Каргатском, Кочковском и Колыванском районах (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Убинское озеро и его окрестности представляют собой одно из важнейших мест скопления гуменника на пролёте в Новосибирской области – здесь в 2001-04 гг. во время пролёта отмечали до 5000 птиц (Ключевые, 2006). Указан в паспорте ООПТ. Нами не встречен. Очевидно, обычный пролётный вид.

Пискулька – *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU A2bcd+3bcd+4bcd (уязвимый вид). В Сибири гнездится в лесотундре и тундре, на пролёте отмечается в Новосибирской области, в том числе на оз. Убинское и окрестных водоёмах (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность

мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Нами не отмечен. Очевидно, редкий пролётный вид.

Лебедь-шипун – *Cygnus olor* (J.F. Gmelin, 1789). (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Новосибирской области проходит северо-восточная граница распространения вида в Западной Сибири, отмечается в степной и лесостепной зонах (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,06 особи/га водоёмов), возможно гнездование 2-3 пар.

Красноносый нырок – *Netta rufina* (Pallas, 1773). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Новосибирской области проходит северо-восточная граница распространения вида в Западной Сибири, отмечается в степной и лесостепной зонах (Красная книга, 2008). Редкий вид (0,02 особи/га водоёмов), возможно гнездование единичных пар.

Лебедь-кликун – *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области наиболее обычен в северных и центральных районах. Редкий гнездящийся и обычный пролётный вид.

Серый гусь – *Anser anser* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Новосибирская область – один из основных очагов размножения вида в пределах Российского ареала (Кривенко и Виноградов, 2001). Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Кряква – *Anas platyrhynchos* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена по всей территории, одна из самых обычных уток. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Серая утка – *Anas strepera* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в южных районах. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Широконоска – *Anas clypeata* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Чирок-свистунок – *Anas crecca* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории, но на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Шилохвость – *Anas acuta* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных и центральных районах. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Связь – *Anas penelope* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Чирок-трескунок – *Anas querquedula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории, весьма обычный вид. Немногочисленный гнездящийся вид.

Красноголовый нырок – *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании наиболее обычен в южных районах. Обычный гнездящийся вид.

Хохлатая чернеть – *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена по всей территории. Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный гоголь – *Vulpes clangula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Обычный пролётный и летующий вид, возможно гнездование.

Луток – *Mergellus albellus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Обитает на водоёмах лесной, лесотундровой и лесостепной зон, где в целом редок или немногочислен (Рябицев, 2008). Редкий пролётный вид.

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Скопиные – Pandionidae

Скопа – *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. В Новосибирской области летнее пребывание зафиксировано вблизи оз. Чаны, оз. Убинское, в долине Оби и северных районах области (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Очень редкий вид – нами отмечено 2 особи в июне 2013 г. (0,001 особи/га).

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Большой подорлик – *Aquila clanga* (Pallas, 1811). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU C2a(ii) (уязвимый вид). Большой подорлик распространён в степной, лесостепной и большей части лесной зоны от Восточной Европы до Приморья (Рябицев, 2008). В

Новосибирской области гнездится в основном в северных и центральных районах, в большинстве других встречается во время миграций. Редкий вид, численность которого в центральных районах медленно восстанавливается (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,004 особи/га). Нами встречены 7 взрослых птицы. Предполагается гнездование 3-4 пар. Природные условия ООПТ в целом благоприятны для обитания данного вида.

Орлан-белохвост – *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – V категория. Красный список МСОП-96 – LR/nt (проблемный вид, близкий к уязвимым). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, на север – до южных тундр (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится в основном в северных районах и в окрестности оз. Чаны. В большинстве других встречается во время миграций. Численность, вероятно, стабильна (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Редкий вид – отмечено 3 особи (0,002 особи/га). Предполагается гнездование 1-2 пар на территории ООПТ или в ближайших окрестностях.

Луговой лунь – *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Красный список МСОП – LC (вызывающий наименьшие опасения). В Западной Сибири распространён от степей до южной тайги (Рябицев, 2008). В Новосибирской области встречен во всех административных районах, но по всей территории редок (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,005 особи/га).

Чёрный коршун – *Milvus migrans* (Boddaert, 1783). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Вид широко распространён в Западной Сибири, один из наиболее многочисленных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Ястреб-перепелятник – *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Широко распространён в Западной Сибири, один из самых обычных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Обыкновенный канюк – *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Широко распространён в Западной Сибири, один из самых обычных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Болотный лунь – *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Обычный вид хищных птиц, особенно в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Полевой лунь – *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от степей до южной тундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Соколиные – Falconidae

Дербник – *Falco columbarius* (Linnaeus, 1758). (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Дербник широко распространён в Северной Евразии и Северной Америке, где встречается от тундр до степей (Рябицев, 2008). В Новосибирской области является слабоизученным, малочисленным, спорадически распространённым видом (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,007 особи/га). Нами учтено 11 взрослых птиц, предполагается гнездование 5-6 пар.

Кобчик – *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Красный список МСОП – NT (близок к угрожаемому состоянию), В Сибири кобчик спорадически распространён в лесной, лесостепной и степной зонах, более обычен в лесостепи (Рябицев, 2008). Для Новосибирской области является малочисленным, местами обычным видом, численность подвержена колебаниям (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Очень редкий вид (0,005 особи/га). Предполагается гнездование 3-4 пар.

Чеглок – *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной лесотундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Обыкновенная пустельга – *Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степей до юга тундровой зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Курообразные – Galliiformes

Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Тетерев – *Lyrurus tetrix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Вид широко распространён в лесостепной и лесной зоне Западной Сибири (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Рябчик – *Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Населяет лесную зону Евразии, в Западной Сибири является самой обычной лесной куриной птицей (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Фазановые – Phasianidae

Перепел – *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается на север до южной части лесной зоны, где держится преимущественно, на полях и пойменных лугах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Семейство Журавлиные – Gruidae

Серый журавль – *Grus grus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Барабинская низменность – один из ключевых районов гнездования серого журавля в России (Птицы СССР, 1987). Немногочисленный гнездящийся и обычный пролётный вид.

Семейство Пастушковые – Rallidae

Коростель – *Crex crex* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири наиболее обычен в лесостепи и на юге лесной зоны (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Погоньш – *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север до средней тайги, но наиболее обычен в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Лысуха – *Fulica atra* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги, но наиболее обычна в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Пастушок водяной – *Rallus aquaticus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён, преимущественно, в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Большой кроншнеп – *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красный список МСОП – NT (находящийся в состоянии, близком к угрожаемому) МСОП-12. В Сибири распространён от степей до северной тайги (Рябицев, 2008). Особи степной популяции сибирского большого кроншнепа гнездятся в юго-западной части Новосибирской области: на юге лесостепной зоны и в степной зоне (Красная книга, 2008). Редкий гнездящийся вид (0,02 особи/га).

Чибис – *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён в лесной, лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Черныш – *Tringa ochropus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Западной Сибири распространён в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся или летующий вид.

Фи́фи – *Tringa glareola* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от тундр до степи, но в южных районах на гнездовании редка (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Травник – *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в степной, лесостепной и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Щёголь – *Tringa erythropus* (Pallas, 1764). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в тундре, лесотундре и северной тайге, на остальной территории встречается во время миграций (Рябицев, 2008). Немногочисленный пролётный вид.

Поручейник – *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в степной, лесостепной и южной части лесной зоны, местами обычная птица (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Обыкновенный бекас – *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от тундр до степей (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Дупель – *Gallinago media* (Latham, 1787). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории NT (близкий к угрожаемому), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от тундры до лесостепной зоны (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Большой веретенник – *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Согласно Красному списку МСОП численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север, преимущественно, до средней тайги. Наиболее обычен в лесостепи и степи (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Турухтан – *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён по всей территории, но гнездится, преимущественно, в лесотундре и тундре (Рябицев, 2008). Редкий летующий и обычный пролётный вид. Возможно гнездование нескольких пар.

Кулик-воробей – *Calidris minuta* (Leisler, 1812). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Гнездится в тундровой зоне, на пролёте встречается на водоёмах других зон (Рябицев, 2008). Немногочисленный пролётный вид.

Белохвостый песочник – *Calidris temminckii* (Leisler, 1812). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Гнездится в тундровой и лесотундровой зонах, на пролёте встречается на водоёмах других зон (Рябицев, 2008). Немногочисленный пролётный вид.

Чернозобик – *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Гнездится в тундровой зоне, на пролёте встречается на водоёмах других зон (Рябицев, 2008). Обычный пролётный вид.

Круглоносый плавунчик – *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири гнездится в лесотундре и тундре, в остальных районах обычен на кочёвках и в период миграций (Рябицев, 2008). Немногочисленный летующий вид, на пролёте обычен.

Семейство Чайковые – Laridae

Черноголовый хохотун – *Larus ichthyaetus* (Pallas, 1773). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – V категория. Красный список МСОП-96 – LC (вызывающий наименьшие опасения); В Новосибирской области гнездование отмечено на островах оз. Чаны и Новосибирского водохранилища, неполовозрелые и холостые птицы отмечаются в летнее время на богатых рыбой водоёмах лесостепной и степной зон (Красная книга, 2008). Красная книга Российской Федерации – 5 категория. Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид – 0,02 особи/га водоёмов.

Озёрная чайка – *Larus ridibundus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степной зоны до средней тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Сизая чайка – *Larus canus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The

IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степной зоны до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Малая чайка – *Larus minutus* (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена, преимущественно, в лесостепи и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Крачковые – Sternidae

Речная крачка – *Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири гнездится от северной тайги до степей (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белокрылая крачка – *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Чёрная крачка – *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

Семейство Голубиные – Columbidae

Большая горлица – *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространена в лесной и лесостепной зонах к востоку от Уральских гор (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Сизый голубь – *Columba livia* (Gmelin, 1789). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири является типичным синантропом – встречается только в населённых пунктах или ближайших окрестностях (Рябицев, 2008). Указан в Паспорте ООПТ, нами не отмечен. Обитание на территории ООПТ крайне маловероятно.

Клентух – *Columba oenas* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes

Семейство Кукушковые – Cuculidae

Обыкновенная кукушка – *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий

наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Сибири распространена широко – от степи до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Глухая кукушка – Cuculus saturatus (Blyth, 1843). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространена от лесостепи до лесотундры (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд СOVOобразные – Strigiformes

Семейство Совиные – Strigidae

Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis (Pallas, 1771). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Длиннохвостая неясыть распространена в хвойных и смешанных лесах Евразии от Скандинавии до Чукотки (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится, преимущественно, в северных и восточных районах. Численность изучена слабо, возможно её увеличение (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Указана в Паспорте ООПТ, нами не отмечена. На территории памятника природы возможны встречи во время кочёвок и зимовка.

Бородатая неясыть – Strix nebulosa (Forster, 1772). (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Бородатая неясыть встречается в лесной зоне северных и умеренных широт Евразии и Северной Америки (Рябицев, 2008). В Новосибирской области отмечается в северной и юго-восточной частях, малочисленный вид (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Указана в паспорте ООПТ, нами не отмечена. На территории памятника природы возможны встречи во время кочёвок и зимовка.

Ушастая сова – Asio otus (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Болотная сова – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Дятлообразные – Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae

Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной тайги и, отчасти, лесотундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Малый пёстрый дятел – *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной тайги и, отчасти, лесотундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Седой дятел – *Picus canus* (Gmelin, 1788). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от лесостепи до средней тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Жаворонковые – Alaudidae

Полевой жаворонок – *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север до южной тундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Трясогузковые – Motacillidae

Лесной конёк – *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён, в основном, в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белая трясогузка – *Motacilla alba* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Желтоголовая трясогузка – *Motacilla citreola* (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена крайне неравномерно в тундре, северной и южной тайге, лесостепи и степи (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Жёлтая трясогузка – *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Серый сорокопут – *Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Красный список МСОП – LC (вызывающий наименьшие опасения). В Западной Сибири серый сорокопут распространён от лесотундры до степной зоны, всюду редок или очень редок (Рябицев, 2008). Распространён по всей территории Новосибирской области,

однако, численность везде низка, в последние десятилетия, по-видимому, сократилась (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Очень редкий вид (0,004 особи/га), предполагается гнездование. В целом местные условия благоприятны для обитания сорокопуга.

Обыкновенный жулан – *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Иволговые – Oriolidae

Обыкновенная иволга – *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Западной Сибири встречается от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Скворцовые – Sturnidae

Обыкновенный скворец – *Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Сибири встречается до северной тайги (Рябицев, 2008). Встречен во время послегнездовых миграций, обычный вид. Гнездование маловероятно.

Семейство Врановые – Corvidae

Ворон – *Corvus corax* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории (Рябицев, 2008). Немногочисленный вид.

Серая ворона – *Corvus cornix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Грач – *Corvus frugilegus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север до лесотундры, но избегает сплошных лесных массивов (Рябицев, 2008). Немногочисленный вид, отмечается во время послегнездовых кочёвок.

Галка – *Corvus monedula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до юга северной тайги, распределение неравномерное, более обычна вблизи населённых пунктов (Рябицев, 2008). Немногочисленный вид, отмечается во время послегнездовых кочёвок.

Сорока – *Pica pica* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Сойка – *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от островных лесов северной степи до юга северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Свиристелевые – Bombycillidae

Обыкновенный свиристель – *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири на гнездовании наиболее многочислен в лесотундровой зоне и северной тайге, в период кочёвок встречается по всей территории (Рябицев, 2008). Нами не встречен. На территории памятника природы встречается, видимо, на кочёвках, существует вероятность гнездования.

Семейство Славковые – Sylviidae

Камышевка-барсучок – *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Садовая камышевка – *Acrocephalus dumetorum* (Blyth, 1849). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до южных границ северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Индийская камышевка – *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до юга лесной зоны (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Славка-завирушка – *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до южной тундры (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Серая славка – *Sylvia communis* (Latham, 1787). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Пеночка-теньковка – *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Многочисленный гнездящийся вид.

Пеночка-весничка – *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от северной степи до тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Певчий сверчок – *Locustella certhiola* (Pallas, 1811). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается в лесной, лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Пятнистый сверчок – *Locustella lanceolata* (Temminck, 1840). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Серая мухоловка – *Muscicapa striata* (Pallas, 1764). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от северной степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Дроздовые – Turdidae

Обыкновенный соловей – *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от северной степи до южной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Варакушка – *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Рябинник – *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, кроме тундр и открытых степей (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Белобровик – *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной

Сибири распространён практически по всей территории, кроме арктических тундр и степей (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Черноголовый чекан – *Saxicola torquata* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от степей до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Луговой чекан – *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от степей до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Суторовые – Paradoxornithidae

Длиннохвостая синица – *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от северной степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Синицевые – Paridae

Большая синица – *Parus major* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Буроголовая гаичка – *Parus montanus* (Baldenstein, 1827). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Белая лазоревка – *Parus cyaneus* (Pallas, 1770). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена в степной, лесостепной и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Лазоревка – *Parus caeruleus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на восток до Тюмени (Рябицев, 2008). Указана в Паспорте ООПТ, нами не отмечена. Встреча на территории ООПТ крайне маловероятна.

Семейство Воробьиные – Passeridae

Полевой воробей – *Passer montanus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, в меньшей

степени, чем домовый воробей, связан с человеческими поселениями (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Домовый воробей – *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён по всей территории в населённых пунктах, обитает только рядом с человеческим жильём (Рябицев, 2008). Указан в паспорте ООПТ, нами не отмечен. Пребывание на территории ООПТ маловероятно.

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Зяблик – *Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от лесных островов в степи до лесотундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Вьюрок – *Fringilla montifringilla* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от лесных островов в тундре до лесостепи (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Черноголовый щегол – *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от севера степи до средней тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенная чечётка – *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от южной части лесной зоны до тундры (Рябицев, 2008). Встречается только на кочёвках, обычна.

Обыкновенная чечевица – *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от степи до тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Урагус – *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён в степной, лесостепной и лесной зонах на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный снегирь – *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от южной части лесной зоны до южной тундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный кочующий вид, гнездование не отмечено.

Семейство Овсянковые – *Emberizidae*

Дубровник – *Emberiza aureola* (Pallas, 1773). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – CE A2acd+3cd+4acd (вид, находящийся на грани полного исчезновения). В Западной Сибири дубровник распространён от северной тайги до северной части степной зоны (Рябицев, 2008). В Новосибирской области до конца 1980-х гг. был обычным и многочисленным видом, в 1990-2000-х гг. численность резко сократилась, как и в других районах Сибири (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). На территории памятника природы гнездятся единичные пары (0,006 пары/га), может отмечаться в период пролёта.

Полярная овсянка – *Schoeniclus pallasii* (Cabanis, 1851). Красный список МСОП – LC (вызывающий наименьшие опасения); В Западной Сибири распространена от тундры до северной тайги. Изолированный очаг гнездования расположен в северной части лесостепи (Рябицев, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). На территории памятника природы гнездятся единичные пары – отмечено 2 поющих самца (0,002 особи/га).

Обыкновенная овсянка – *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степей до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белошапочная овсянка – *Emberiza leucosephala* (Gmelin, 1771). Согласно Красному списку МСОП вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от участков леса в степной зоне до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Камышовая овсянка – *Schoeniclus schoeniclus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Землеройкообразные – *Soricomorpha*

Семейство Землеройковые – *Soricidae*

Сибирская белозубка – *Crocidura sibirica* (Dukelsky, 1930). Красный список МСОП – LC (вызывающий наименьшие опасения). В Новосибирской области распространена на правобережье Оби (Красная книга, 2008). Нами не обнаружена. Обитание на территории памятника природы крайне маловероятно.

Обыкновенная бурозубка – *Sorex araneus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN,

2012). Обитатель различных ландшафтов от тундр до степей (Юдин, 1989). Многочисленный вид.

Средняя бурозубка – *Sorex caecutiens* (Linnaeus, 1788). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Предпочитает леса таёжного типа с хорошо развитым моховым покровом (Юдин, 1989). Указана в паспорте ООПТ, нами не отмечена.

Малая бурозубка – *Sorex minutus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Кутора обыкновенная – *Neomys fodiens* (Pennant, 1771). Согласно Красному списку МСОП вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Наиболее обычна в лесной зоне. Заселяет берега водоёмов, предпочитая небольшие речки и ручьи (Юдин, 1989). Редкий вид.

Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Семейство Гладконосые Летучие мыши – Vespertilionidae

Северный кожанок – *Eptesicus nilssonii* (Keyserling et Blasius, 1839). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Указан в Паспорте ООПТ, нами не отмечен.

Отряд Хищные – Carnivora

Семейство Собачьи – Canidae

Обыкновенная лисица – *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Семейство Куньи – Mustelidae

Горностай – *Mustela erminea* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Ласка – *Mustela nivalis* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Колонок – *Mustela sibirica* (Pallas, 1773). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Степной хорь – *Mustela eversmanii* (Lesson, 1827). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Американская норка – *Neovison vison* (Schreber, 1777). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012).

Акклиматизирована в СССР в 1920-50-х гг., к настоящему времени широко распространилась, в том числе в лесной и лесостепной зонах (Бобров и др., 2008). Немногочисленный вид.

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Семейство Олени – Cervidae

Сибирская косуля – Capreolus pygargus (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Лось – Alces alces (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). По сведениям, полученным от местных жителей, редкий вид.

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha

Семейство Заячьи – Leporidae

Заяц-беляк – Lepus timidus (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Отряд Грызуны – Glires

Семейство Беличьи – Sciuridae

Бурундук – Tamias sibiricus (Laxmann, 1769). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Указан в паспорте ООПТ, нами не отмечен, пребывание на территории ООПТ маловероятно.

Семейство Мышовковые – Sicistidae

Лесная мышовка – Sicista betulina (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Семейство Мышиные – Muridae

Полевая мышь – Apodemus agrarius (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Семейство Хомяковые – Cricetidae

Красно-серая полёвка – Myodes rufocanus (Sundevall, 1846). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Указана в паспорте ООПТ, нами не отмечена.

Красная полёвка – Myodes rutilus (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Водяная полёвка – Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Обыкновенная полёвка – *Microtus arvalis* (Pallas, 1778). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Указана в паспорте ООПТ, нами не отмечена.

Узкочерепная полёвка – *Microtus gregalis* (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Полёвка-экономка – *Microtus oeconomus* (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Многочисленный вид.

Ондатра – *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Акклиматизирована в России в 1920-60-х гг., широко распространена от степей до лесотундры (Бобров и др., 2008). Обычный вид.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Многие виды беспозвоночных животных не имеют общепринятых русских названий, в связи с этим приведены лишь их научные латинские названия

КЛАСС INSECTA – НАСЕКОМЫЕ

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые (Бабочки)

Семейство Hesperiidae – Толстоголовки

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Толстоголовка тире.

Семейство Papilionidae – Парусники

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – Махаон.

Семейство Pieridae – Белянки

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – Зорька.

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Боярышница.

Colias chrysotheme (Esper, 1781) – Золотистая желтушка.

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – Луговая желтушка.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – Капустница.

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Брюквенница.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Репница.

Семейство Nymphalidae – Нимфалиды

Aglais io (Linnaeus, 1758) – Дневной павлиний глаз.

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница.

Argynnis (Mesoacidalia) aglaja (Linnaeus, 1758) – Перламутровка Аглая.

Argynnis raphia (Linnaeus, 1758) – Большая лесная перламутровка.

Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus, 1767) – Перламутровка Дия.

Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus, 1758) – Перламутровка Эфрозина.

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) – Перламутровка таволжанка.

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – Шашечница Матурна.

Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – Ленточник тополевый.
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) – Шашечница Аталия.
Melitaea britomartis Assmann, 1847 – Шашечница верониковая.
Neptis Sappho (Pallas, 1771) – Пеструшка Сапфо.
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – Траурница.
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) – Многоцветница.
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница с-белое.
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Репейница.

Семейство Satyridae – Бархатницы

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – Глазок цветочный.
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – Сенница луговая.
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) – Сенница Геро.
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Сенница обыкновенная.
Coenonympha tullia (Muller, 1764) – Сенница туллия.
Erebia aethiops (Esper, 1777) – Чернушка-эфиопка.
Erebia ligea (Linnaeus, 1758) – Чернушка обыкновенная.
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – Малая крупноглазка.
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) – Краеглазка печальная.
Melanagria russiae (Esper, 1783) – Пестроглазка русская.
Minois dryas (Scopoli, 1763) – Дриада.

Семейство Lycaenidae – Голубянки

Lycaena dispar (Haworth, 1802) – Червонец непарный.
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) – Голубянка черноватая.

Семейство Geometridae – Пяденицы

Carsia sororiata sororiata (Hübner, 1813) – Пяденица болотная. Только в ряхах.

Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) – Большая зеленая пяденица.

Семейство Arctiidae – Медведицы

Arctia caja (Linnaeus, 1758) – Медведица кайя.
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) – Медведица сетчатая.
Eilema griseola (Hübner, 1803) – Лишайница сероватая.

Семейство Noctuidae – Совки

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – Совка восклицательная.
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) – Сока озимая.
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) – Совка василистниковая.
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) – Голубая орденская лента.
Xanthia (Cirrhia) icteritia (Hufnagel, 1766) – Совка золотистая малинная.

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые (Жуки)

Семейство Carabidae – Жужелицы

Agonum (Agonothorax) sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – Быстрьяк шеститочечный.
Amara aenea (De Geer, 1774) – Тускляк бронзовый.
Calathus (Neocalathus) melanocephalus (Linnaeus, 1758) – Моховик черноголовый.
Carabus (Megodontus) violaceus (Linnaeus, 1758) – Жужелица фиолетовая.
Carabus (Morphocarabus) regalis (Fischer von Waldheim, 1822) – Жужелица королевская.

Cylindera (Cylindera) germanica (Linnaeus, 1758) – Скакунчик германский.
Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783) – Птеростих черный.

Семейство Tenebrionidae – Чернотелки

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) – Грибояд темный.
Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761) – Медляк песчаный.
Pedinus femoralis (Linnaeus, 1767) – Медляк кукурузный.
Tenebrio obscurus Fabricius, 1792 – Хрущак темный.
Upis ceramboides (Linnaeus, 1758) – Чернотелка лесная.

Семейство Scarabaeidae – Хрущи

Cetonia (s.str.) aurata (Linnaeus, 1758) – Бронзовка золотистая.
Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) – Навозник обыкновенный.
Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) – Западный майский хрущ.
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – Жук-носорог.
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) – Восковик перевязанный.

Семейство Coccinellidae – Божьи коровки

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – Коровка двуточечная.
Calvia (Anisocalvia) quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – Коровка четырнадцатипятнистая.
Coccinella hieroglyphica (Linnaeus, 1758) – Коровка узорчатая.
Coccinella magnifica (Redtenbacher, 1843) – Коровка великолепная.
Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) – Коровка семиточечная.
Hippodamia variegata (Goeze, 1777) – Коровка изменчивая.
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Четырнадцатиточечная коровка.

Semiadalia notata (Laicharting, 1781) – Коровка приметная.

Семейство Chrysomelidae – Листоеды

Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763) – Листоед ясноточный.
Chrysomela (Chrysomela) populi (Linnaeus, 1758) – Краснокрылый тополёвый листоед.

Семейство Cerambycidae – Усачи

Lamia textor (Linnaeus, 1758) – Толстяк ивовый
Leptura (Rutpela) maculata (Poda, 1761) – Лептура пятнистая
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) – Лептура зеленая
Monochamus rosenmuelleri (Cederjelm, 1798) – Усач черный еловый
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – Пахита четырехпятнистая
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – Лептура бурая
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) – Скрипун осиновый
Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) – Лептура рыжая

Семейство Elateridae – Щелкуны

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – Щелкун серый.
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) – Щелкун окаймленный.

Семейство Curculionidae – Долгоносики

Cleonis pigra (Scopoli, 1763) – Долгоносик чертополоховый.

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые

Семейство Aphidae – Пчелиные

Пчела–плотник – *Xylocopa valga* (Gerstaecker, 1872). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красный список МСОП – LC Редкий вид, встречаются единичные экземпляры.

Шмель необыкновенный – *Bombus confusus* (Schenck, 1859) (= *paradoxus* Dalla Torre, 1882). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Красном списке МСОП – EN. Редкий вид, встречаются единичные экземпляры.

Bombus modestus (Eversmann, 1852) – Шмель скромный (модестус). (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория.

Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) – Шмель моховой.

Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) (= *agrorum* Fabricius 1787) – Шмель полевой.

Bombus serratatus (Morawitz, 1888) – Шмель пластинчатозубый.

Bombus hortorum (Linnaeus 1761) – Шмель садовый.

Bombus terrestris (Linnaeus 1758) – Шмель земляной.

Семейство Formicidae – Муравьи

Camponotus (Camponotus) herculeanus (Linnaeus 1758) – Муравей древоточец-красногрудый.

Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) – Муравей блестящий.

Formica (Raptiformica) sanguinea (Latreille, 1798) – Муравей кровавый.

Formica (Serviformica) fusca (Linnaeus, 1758) – Муравей лесной бурый.

Formica rufa (Linnaeus, 1761) – Муравей лесной рыжий,

Lasius (Cautolasius) flavus (Fabricius, 1782) – Муравей земляной желтый.

Lasius niger (Linnaeus, 1758) – Муравей черный.

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) – Мирмика красная.

Семейство Diprionidae – Пилильщики гребнеусые

Diprion pini (Linnaeus, 1758) – Пилильщик сосновый.

Семейство Tenthredinidae – Пилильщики настоящие

Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758) – Пилильщик зеленый.

Tenthredo (Eurogaster) mesomelas Linnaeus, 1758 – Пилильщик лесной.

Семейство Sphecidae – Роющие осы

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) – Ройщица песчаная.

Семейство Crabronidae – Песочные (роющие) осы

Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761).

Crossocerus elongatulus (Vander Linden, 1829).

Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758) – Краброниды мрачные.

Семейство Pompilidae – Дорожные осы

Anoplius (Arachnophroctonus) viaticus (Linnaeus, 1758) – Аноплий бурый, или помпил дорожный, или обыкновенная дорожная оса.

Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771) – Батозонелл ящеричный.

Семейство Chrysididae – Осы-блестянки

Holopyga atoenula (Dahlbom, 1845).

Chrysis ignita (Linnaeus, 1758) – Блестянка пламенно-красная.

Семейство Vespidae – Складчатокрылые осы

Vespa crabro Linnaeus 1758 – Шершень.

Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) – Оса обыкновенная.

Polistes nimpha (Christ, 1791) – Полист нимфа.

Отряд Diptera – Двукрылые (Мухи)

Семейство Culicidae – Кровососущие комары

Aedes cinereus (Meigen, 1818).

Anopheles (Anopheles) messeae (Falleroni, 1926) – вид кровососущих комаров из подсемейства малярийных (Anophelinae).

Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi, 1890).

Culex pipiens (Linnaeus, 1758) – Комар-пискун или комар обыкновенный.

Семейство Simuliidae – (Мошки)

Simulium vulgare (Dorogostaisky, Rubtsov & Vlasenko, 1935) – Темноногая мошка.

Simulium transiens (Rubtsov, 1940).

Семейство Tabanidae – Слепни

Chrysops nigripes (Zetterstedt, 1838) – Златоглазик черноногий.

Chrysops pictus (Meigen, 1820) – Златоглазик украшенный.

Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758) – Дождевка обыкновенная.

Tabanus autumnalis (Linnaeus, 1761) – Слепень серый.

Tabanus bovinus (Linnaeus, 1758) – Слепень бычий.

Семейство Syrphidae – Журчалки (Цветочные мухи)

Cheilosia longula (Zetterstedt, 1838) – Цейлозия лонгула.

Cheilosia velutina (Loew, 1840).

Cheilosia vernalis (Fallen, 1817).

Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758) – Журчалка двуполосая.

Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758) – Журчалка красивая.

Epistrophe diaphana (Zetterstedt, 1843).

Epistrophe grossulariae (Meigen, 1822).

Eristalis anthophorina (Fallen, 1817).

Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) – Лесная пчеловидка.

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) – Журчалка обыкновенная.

Volucella bombylans (Linnaeus, 1758) – Журчалка шмелевидная.

Семейство Asilidae – Ктыри

Dioctria atricapilla (Meigen, 1804) – Ктырь-ястребница.

Laphria flava (Linnaeus, 1761) – Ктырь жёлтый.

Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758) – Ктырь горбатый.

Machimus rusticus (Meigen, 1820).

Asilus crabroniformis (Linnaeus, 1758) – Ктырь шершневидный.

Семейство ceratopogonidae – Мокрецы

Culicoides (Culicoides) pulicaris (Linnaeus, 1758) – Мокрецы настоящие.

Culicoides (Culicoides) punctatus (Meigen, 1804).

Семейство Tipulidae – Комары долгоножки

Tipula (Tipula) paludosa (Meigen, 1830) – Вредная долгоножка.

Отряд Odonata – Стрекозы

Семейство Gomphidae – Дедки

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) – Дедка рогатый.

Семейство Corduliidae – Бабки

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) – Бабка блестящая.

Epithea bimaculata (Charpentier, 1825) – Эпитека двупятнистая.

Macromia amphigena (Selys, 1871) (= *M. sibirica* Djakonov, 1926) – Длинка сибирская.

Somatochlora alpestris (Selys, 1840) – Зеленотелка альпийская.

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) – Зеленотелка арктическая.

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) – Зеленотелка блестящая.

Семейство Aeschnidae – Коромысла

Aeshna crenata (Hagen, 1856) – Коромысло сибирское.

Aeshna mixta (Latreille, 1805) – Коромысло маленькое.

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) – Коромысло большое.

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) – Коромысло камышовое.

Aeshna serrata Hagen, 1856 – Коромысло пильчатое.

Aeshna subarctica Walker, 1908 – Коромысло северное.

Aeshna viridis Eversmann, 1836 – Коромысло зеленое.

Семейство Lestidae – Лютки

Lestes dryas Kirby, 1890 – Лютка дриада.

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) – Лютка свирепая.

Lestes virens (Charpentier, 1825) – Лютка осенняя.

Sympetma paedisca (Brauer, 1882) – Серолютка обыкновенная.

Семейство Calopterygidae – Красотки

Calopteryx splendens (Harris, 1782) – Красотка блестящая.

Семейство Libellulidae – Настоящие стрекозы

Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) – Стрекоза красная.

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – Плоскобрюх четырёхпятнистый.

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) – Стрекоза жёлтая.

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) – Стрекоза обыкновенная.

Семейство Coenagrionidae – Стрелки

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) – Стрелка вооруженная.

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) – Стрелка копьевая.

Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894) – Стрелка Иогансона.

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) – Стрелка весенняя.

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) – Стрелка девушка.

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) – Стрелка изящная.

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) – Меняшка кубконосная.

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) – Тонкохвост изящный.

Отряд Orthoptera – Прямокрылые

Семейство Tettigoniidae – Кузнечики

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) – Зелёный кузнечик.

Tettigonia cantans (Fuessli, 1775) – Кузнечик певчий.

Семейство Acrididae – Саранчовые

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893) – Прыгунчик тонкоусый.

Arcyptera (Pararcyptera) microptera (Fischer de Waldheim, 1833) – Крестовая кобылка.

Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) – Саранча перелётная.

Отряд Dermaptera – Уховертки

Семейство Forficulidae – Уховертки

Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) – Уховертка обыкновенная.

Отряд Homoptera – Равнокрылые

Семейство Aphrophoridae – Пенницы

Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) – Пенница слюнявая.

Семейство Membracidae – Горбатки

Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758) – Горбатка обыкновенная.

Семейство Cicadellidae – Цикадки

Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) – Зелёная цикадка.

Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые

Семейство Gerridae – Гребляки

Corixa dentipes (Thomson, 1869) – Гребляк зубчатоногий.

Семейство Naucoridae – Плавты

Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) – Плавт обыкновенный.

Семейство Notonectidae – Гладыши

Notonecta (Notonecta) glauca (Linnaeus, 1758) – Гладыш обыкновенный.

Семейство Miridae – Слепняки

Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767).

Closterotomus biclavatus (Herrich-Schäffer, 1835).

Семейство Lygaeidae – Земляные клопы

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) – Лигей пятнистый.

Семейство Coreidae – Ромбовики

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) – Краевик окаймлённый.

Семейство Pentatomidae – Щитники

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) – Щитник линейчатый.

Aelia klugii (Hahn, 1833) – Остроголовый клоп.

Aelia sibirica (Reuter, 1884) – Элия сибирская/

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) – Щитник ягодный/

Eurydema (Eurydema) oleracea (Linnaeus, 1758) – Клоп рапсовый.

Palomena prasina (Linnaeus, 1761) – Щитник зелёный древесный.

Семейство Scutelleridae – Черепашки

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) – Маврская черепашка.

Семейство Reduviidae – Хищнецы

Reduvius personatus (Linnaeus, 1758) – Грязный хищнец, или ряженный хищнец, или редувий ряженный.

Семейство Gerridae – Водомерки

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) – Водомерка прудовая.

Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые**Семейство Chrysopidae – Златоглазки**

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) – Златоглазка перламутровая.

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира**

№ п/п	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
	Растения				
1.	Гвоздика широковетвистая	<i>Dianthus ramosissimus</i> Pall. Ex Poir.	3 (R)	-	-
2.	Осот болотный	<i>Sonchus palustris</i> L.	3 (R)	-	LC
3.	Звездчатка ланцетовидная	<i>Stellaria holostea</i> L.	3 (R)	-	-
4.	Лютик распростертый	<i>Ranunculus reptans</i> L.	3 (R)	-	LC
5.	Лютик укореняющийся	<i>Ranunculus radicans</i> C.A. Mey.	2 (V)	-	-
6.	Лук красноватый	<i>Allium rubens</i> Schrad. ex Willd.	4 (I)	-	-
	Животные				
7.	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-
8.	Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	3	2	VU A2abce+3 bce+4abce
9.	Гуменник	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	3	2	-
10.	Пискулька	<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	2	2	VU A2bcd+3b cd+4bcd
11.	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789)	3	-	-
12.	Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	3	-	-
13.	Скопа	<i>Pandion haliaëtus</i> (Linnaeus, 1758)	3	3	-
14.	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	3	2	VU C2a(ii)
15.	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	2	5	LR/nt

№ п/п	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
16.	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
17.	Дербник	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	-
18.	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	3	3	NT
19.	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	2	-	NT
20.	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-
21.	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i> (Pallas, 1773)	2	5	LC
22.	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i> (Pallas, 1771)	4	-	-
23.	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i> (J.R. Forster, 1772)	3	-	-
24.	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
25.	Дубровник	<i>Emberiza aureola</i> (Pallas, 1773)	2	2	CE A2acd+3c d+4acd
26.	Пчела-плотник	<i>Xylocopa valga</i> (Gerstaecker, 1872)	3	-	LC
27.	Шмель необыкновенный	<i>Bombus confusus</i> (Schenck, 1859)	3	-	EN
28.	Шмель скромный	<i>Bombus modestus</i> (Eversmann, 1852)	3	-	-