



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кадастровое дело № 035

Памятник природы регионального значения
«Убинский приозёрный комплекс»
Новосибирской области

Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)	Памятник природы регионального значения «Убинский приозёрный комплекс» Новосибирской области (далее – памятник природы)
Категория ООПТ	Памятник природы
Значение ООПТ	Региональное
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ	035
Профиль ООПТ	Ландшафтный
Статус ООПТ	Действующий
Дата создания, реорганизации	10.07.2003
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)	Сохранение естественных природных комплексов; сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций приозерного природного комплекса; сохранение редких, исчезающих и интродуцированных видов фауны и флоры; сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов; сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий; экологическое воспитание населения
Нормативная основа функционирования ООПТ	Охранный обязательство на государственный памятник природы областного значения от 08.11.2002. Михайловский лесхоз берет на себя обязательства по охране государственного памятника природы (приложение № 1)
	Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 10.07.2003 «Об образовании памятника природы областного значения «Убинский приозерный комплекс» (третий созыв, 20 сессия) (приложение № 2)
	Постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 175-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Убинский приозерный комплекс» Новосибирской области» (приложение № 3). Общая площадь составляет 4918 га
Ведомственная подчиненность	Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Международный статус ООПТ	Не присвоен
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)	Не присвоена
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ	1

Месторасположение ООПТ	Новосибирская область, Убинский район, Черномысинский сельсовет; Крещенский сельсовет
Географическое положение ООПТ	Находится в западной части Убинского района Новосибирской области, в 2 километрах восточнее села Черный Мыс, примыкая к восточной оконечности озера Убинское. Северная граница территории памятника природы следует по проселочной дороге от места соприкосновения дороги с северной окраиной озера Убинское (в 2 километрах восточнее села Черный Мыс) и далее в северо-восточном направлении на протяжении 9,5 километра до пересечения с просекой, определяющей восточную границу квартала 239, и далее поворачивает по этой просеке на юго-запад до соединения через 2,3 километра с просекой, определяющей восточную границу квартала 243, и далее по этой просеке в юго-западном направлении (4,2 километра) до границы с Каргатским районом Новосибирской области. Южная и западная границы территории памятника природы определяются северной и восточной береговой линией озера Убинское и только крайняя юго-западная часть границы территории памятника природы на протяжении 650 метров идет по границе с Каргатским районом
Общая площадь ООПТ (га)	4918
Площадь охранной зоны ООПТ (га)	0
Границы ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 175-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Убинский приозерный комплекс» Новосибирской области». План границ памятника природы (приложение № 4). Географические координаты границ памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 5)
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют
Природные особенности ООПТ	<u>Нарушенность территории</u> Памятник природы находится в западной части Убинского района Новосибирской области, в 2 километрах восточнее села Черный Мыс, примыкая к восточной оконечности озера Убинское, образован на территории Михайловского лесхоза. Основными факторами воздействия на памятник природы являются колебания гидрологического режима и антропогенное воздействие. Из антропогенных воздействий можно выделить выпас крупного рогатого скота, осуществляющийся на границе с памятником природы. На растительные сообщества эти воздействия оказывают незначительное влияние. Существенным видом воздействия может быть охота на водоплавающих птиц. В целом памятник природы находится в благополучном состоянии. Проводятся работы по обустройству: установка аншлагов, уборка имеющегося мусора, проведение противопожарных мероприятий (прокладывание противопожарных минерализованных полос) <u>Краткая характеристика рельефа</u> Рельеф территории в целом равнинный, абсолютные высоты

	колеблются в пределах 130-133 м над уровнем моря. Территория памятника природы представляет собой уникальный естественный природный комплекс лесных, луговых и водно-болотных сообществ. Северная граница территории памятника природы следует по проселочной дороге от места соприкосновения дороги с северной окраиной озера Убинское, в северо-восточном направлении до пересечения с просекой, определяющей восточную границу. Южная и западная границы территории памятника природы определяются северной и восточной береговой линией озера Убинское
	<u>Краткая характеристика климата</u> Климат резко континентальный. Климат Убинского района относится к континентальному типу с холодной зимой и сравнительно жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Наиболее холодным месяцем зимы является январь, средняя температура января от – 18 С⁰ до – 20,4 С⁰. Средняя температура июля от +18,3 С⁰ до +19 С⁰. Абсолютный минимум температуры – 48,7 С⁰, абсолютный максимум +36,5 С⁰. Продолжительность периода со снежным покровом – 175 дней. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя многолетняя из максимальных глубин промерзания составляет 144 см. Средняя максимальная высота снежного покрова – 40 см. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 73,70 %, максимальная в ноябре-декабре – 88,06 %, минимальная в мае – 50,58 %. Осадки в летний период представлены в виде кратковременных ливневых дождей. Среднегодовая норма осадков по колеблется в пределах от 350 мм
	<u>Краткая характеристика почвенного покрова</u> Почвы лугово-лесо-болотные. По характеру слагающих фитоценозов памятник природы представляет собой эталонный болотный массив с заросшими растительностью водоёмами. Наличие в составе памятника природы озёр, сочетание лесоболотных и лесостепных комплексов
	<u>Краткое описание гидрологической сети</u> В состав памятника природы входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Памятник природы представляет собой комплексный участок луго-болотной растительности, расположенный среди северного варианта лесостепного ландшафта в Убинском районе. Он имеет важное средообразующее значение, поддерживает гидрологический режим территории, стабилизирует микроклимат. По характеру слагающих фитоценозов он представляет собой эталонный болотный массив, своеобразный комплекс фрагментов луговых, озерных и болотных экосистем. Наличие в составе памятника природы озёр: Ягалы, Куртай, Майначка
	<u>Краткая характеристика флоры и растительности</u> (приложение № 6)
	<u>Краткие сведения о лесном фонде</u> Лесохозяйственный участок Лячинский, кварталы 238, 239
	<u>Краткие сведения о животном мире</u> (приложение № 7)

	<u>Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира.</u> (приложение № 8)
	<u>Суммарные сведения о биологическом разнообразии</u> Животный мир памятника природы весьма разнообразен, что определяется составом и распределением местообитаний. Всего объектов животного мира 443 вида, в том числе: – 175 видов наземных позвоночных животных, из них зарегистрировано 143 вида птиц, 24 вида млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся; – 268 видов беспозвоночных животных. Наиболее разнообразной группой позвоночных животных являются птицы – отмечено 143 вида из 13 отрядов. Класс млекопитающие представлен 24 видами из 5 отрядов. Всего объектов растительного мира 476 видов высших сосудистых растений. В Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) включены 166 видов животных, 2 вида высших сосудистых растений. В Красную книгу Российской Федерации занесено: 12 видов животных (красношейная поганка, гуменник, пискулька, скопа, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, кобчик, белая куропатка, черноголовый хохотун, дубровник, шмель армянский), 3 вида высших сосудистых растений (венерин башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый, ятрышник шлемоносный). В Красную книгу Новосибирской области занесено всего 33 вида объектов животного и растительного мира, в том числе: – 23 вида животных; – 10 видов высших сосудистых растений, которые отмечаются как «редкие» и «крайне редкие».
	<u>Краткая характеристика основных экосистем ООПТ</u> Памятник природы представляет собой комплексный участок луго-болотной растительности, расположенный среди северного варианта лесостепного ландшафта в Убинском районе Новосибирской области. Он имеет важное средообразующее значение, поддерживает гидрологический режим территории, стабилизирует микроклимат. По характеру слагающих фитоценозов он представляет собой эталонный болотный массив Средне-Омского северо-лесостепного ботанико-географического округа. Территория памятника природы представляет собой уникальный естественный природный комплекс лесных, луговых и водно-болотных сообществ, которые создают благоприятные условия для существования здесь богатого и разнообразного животного мира. Растительный покров памятника природы преимущественно сочетание болотных фитоценозов с заросшими растительностью водоёмами. Основной объект охраны в памятнике природы – своеобразный комплекс фрагментов луговых, озерных и болотных экосистем, включающий значительное число популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области

	<u>Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ</u>			
	Памятника природы представляет собой уникальный естественный природный комплекс лесных, луговых и водно-болотных сообществ, имеет важное средообразующее значение, поддерживает гидрологический режим территории, стабилизирует микроклимат. Основным объект охраны в памятнике природы – своеобразный комплекс фрагментов луговых, озерных и болотных экосистем, а также популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения 33 вида растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. На территории памятника природы выявлено 477 видов высших сосудистых растений, 143 вида птиц, 24 вида млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 268 видов беспозвоночных			
	<u>Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов</u>			
	Отсутствуют			
	<u>Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ</u>			
	Отсутствуют			
Экспликация земель ООПТ	<u>Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий</u>			
	Территория памятника природы представляет собой уникальный естественный природный комплекс лесных, луговых и водно-болотных сообществ, имеющих большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Благодаря особым гидрологическим характеристикам здесь создаётся специфический микроклиматический режим необходимый для животных и растений, характерных для таёжных и болотных мест обитания. В период миграций здесь останавливаются различные виды водоплавающих, околоводных и лесных видов птиц, предоставляет хорошие возможности для гнездования поганок, нырковых и речных уток, лебедей и пастушковых птиц. Территория памятника природы представляет собой место обитания и размножения видов животных, отнесённых к объектам охоты. Среди них отмечают копытные, пушные звери и водоплавающие птицы. Памятник природы сохраняет местообитание и местопроизрастания уникальные сообщества и популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области			
	<u>Экспликация по составу земель</u>			
	Категория земель: земли лесного фонда, земли водного фонда			
	<u>Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов</u>			
	<u>№ п/п</u>	<u>Категория земель</u>	<u>Площадь, га</u>	<u>% от общей площади</u>
	1.	Болото	4795	97,5
	2.	Озера	123	2,5
		ИТОГО	4918	100
	<u>Экспликация земель лесного фонда</u>			
	Лесохозяйственный участок Лячинский, кварталы 238, 239			

Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)	<u>Факторы негативного воздействия</u> Памятник природы находится в западной части Убинского района Новосибирской области, в 2 километрах восточнее села Чёрный Мыс, примыкая к восточной оконечности озера Убинское. Факторы антропогенного воздействия: - охота (особенно на водоплавающих птиц) (на растительные сообщества эти воздействия оказывают незначительное влияние); - выпас крупного рогатого скота на границе с памятником природы (площадь территории выпаса незначительна, существенного урона экосистеме памятника природы не наносит); - пожары (воздействие пожаров локальное, по динамике, регулярности и силе воздействия на животный мир данных нет, экосистемы памятника природы в целом успешно восстанавливаются) <u>Угрозы негативного воздействия</u> Пожары. Возможно возникновение на территории памятника природы
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ	Акционерное общество «Михайловский лесхоз». Адрес: 632520, Новосибирская область, район Убинский, с. Убинское, ул. Линейная, 28а. Телефоны: 8 (383) 662-14-08, 8 (383) 662-16-56. Факс: 8 (383) 662-26-85. E-mail: leshoz08@mail.ru. Дата государственной регистрации юридического лица: 28.03.2012, ОГРН: 1125485000300. и.о. генерального директора: Кошелев Андрей Валериевич. Охранное обязательство от 08.11.2002
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют
Общий режим охраны и использования ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 175-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Убинский приозерный комплекс» Новосибирской области». На территории памятника природы <i>запрещается</i> любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе: - предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; - деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; - распашка земель; - заготовка растительной земли; - строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; - проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; - взрывные работы; - движение и стоянка автотранспорта, за исключением разрешенных случаев; - устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; - самовольное занятие земель;

	- разведение костров, выжигание луговой растительности; - загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; - пастьба и прогон сельскохозяйственных животных; - заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира; - сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. На территории памятника природы <i>разрешается</i> без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: - проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы; - сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов; - проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; - организация экскурсий в воспитательных целях; - проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований. <i>Разрешается в исключительных случаях</i> отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний
Зонирование территории ООПТ	Отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ	Охранная зона не установлена
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ	Кадастровый номер земельного участка: 54:25:30101:1. Адрес: Новосибирская область, Убинский район, муниципальное образование Крещенский сельсовет. Площадь: 7584592882 кв. м. Категория земель: земли лесного фонда. Разрешенное использование: для прочих объектов лесного хозяйства. Пользователь (арендатор): ООО «Омь», Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Олимпийская, 37/1
	Кадастровый номер земельного участка: 54:25:21701:201. Адрес: данные отсутствуют. Площадь: 243689321 кв. м. Категория земель: земли лесного фонда. Разрешенное использование: данные отсутствуют. Сведения о пользователях, владельцах и собственниках земельного участка отсутствуют. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют
	Кадастровый номер земельного участка: 54:25:21701:236 (в границах памятника природы частично расположен один контур земельного участка). Адрес: Новосибирская область, Убинский район, Черномысинский сельсовет, Убинское лесничество, Черномысинский лесохозяйственный участок, свх. «Рекорд». Площадь: 173413966 кв. м.

	Разрешенное использование: для размещения объектов лесного фонда. Сведения о пользователях, владельцах и собственниках земельного участка отсутствуют. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ	<u>Музеи природы, информационные и визит-центры</u> Отсутствуют
	<u>Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы</u> Отсутствуют
	<u>Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения</u> Отсутствуют
	<u>Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха</u> Отсутствуют
Кадастровые сведения подготовлены	Гуляева Татьяна Владимировна. Главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Телефон: 8(383)296-52-25, e-mail: gutv@nso.ru

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Михайловский ЛЕСХОЗ

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ)

ДИРЕКТОРА КЛИМЕНТЬЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

В ЛИЦЕ

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ)

ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ

ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ

И ИМЕНУЕМОГО В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ОХРАНЯЮЩИЙ», БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
--ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УБИНСКИЙ ПРИОЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС»

(НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ)

РАСПОЛОЖЕННОГО В УБИНСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, РАЙОН, ГОРОД)

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННОГО В ПАСПОРТЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПЕРЕЧНЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР:

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ:

НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ О НАРУШЕНИИ УКАЗАННОГО РЕЖИМА.

АДРЕС «ОХРАНЯЮЩЕГО» 632521 с. Убинское ул. Строителей – 1

Климентьев Сергей Александрович

ДИРЕКТОР Михайловского ЛЕСХОЗА

(АДРЕС, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ОХРАНЯЮЩЕГО»)

Климентьев С.А.

(ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ)

8 НОЯБРЯ 2002 ГОДА

ГЛАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
УБИНСКОГО РАЙОНА
Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2002 N 148

Об определении земельного участка для организации
памятника природы областного значения
"Убинский приозерный комплекс"

Рассмотрев ходатайство Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Новосибирской области и в соответствии с Земельным Кодексом РСФСР от 25 апреля 1991 года, ст.89, Законом НСО "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области" от 21 мая 1995 года, ст.20, постановлением администрации Новосибирской области N 170 от 09.04.1992 года "Об организации особо охраняемых природных объектов на территории Новосибирской области", в целях сохранности уникального объекта для научных, культурно-просветительных целей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить земельный участок общей площадью 4918 га на землях Михайловского лесхоза - квартал N 238, квартал N 239, квартал N 243, для создания памятника природы "Убинский приозерный комплекс", в том числе: болото - 4795 га, озера - 123 га.

2. Определение земельного участка для организации памятника природы "Убинский приозерный комплекс" производится без изъятия земельных угодий землепользователя - Михайловского лесхоза.

3. Контроль за соблюдением земельного законодательства в части порядка и режима использования данного земельного участка, определенного под памятник природы "Убинский приозерный комплекс", возложить на Комитет по земельным ресурсам и землеустройству (В.В.Орлянский) и комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды территориальной администрации (Н.С.Плотников).



Исх. N 1049
18.10.2002 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
УБИНСКОГО РАЙОНА
Новосибирской области
632521

Новосибирский областной
Совет депутатов

ул. Ленина 23, с. Убинское
факс. (266) 21-734

от 10.12.2002 N 02.
на N _____ от _____

Об образовании памятника
природы областного значе-
ния "Убинский прио-
зерный комплекс" в Убинс-
ком районе

Во исполнение решения VI сессии Новосибирского областного Совета народных депутатов от 04.07.91 г. "Об экологической обстановке в области и мерах по ее коренному улучшению", постановления главы администрации Новосибирской области от 09.04.92 г. N 170 "Об организации особо охраняемых природных объектов на территории Новосибирской области", решения 28 сессии Новосибирского областного Совета депутатов "О перспективной схеме развития и размещения сети особо охраняемых природных территорий в Новосибирской области в целях сохранения уникальных видов флоры и фауны в их естественном состоянии для ученых, культурно-просветительных, хозяйственных и эстетических целей, имеющих исключительное средообразующее значение" территориальная администрация Убинского района, после комиссионного осмотра территории, входит с предложением:

образовать на территории Убинского района Новосибирской области памятник природы областного значения "Убинский приозерный комплекс" площадью 4918 га в границах согласно выкопировки.

Земельный участок предоставляется в бессрочное пользование (акт отвода и выкопировка прилагаются).

Контроль за соблюдением режима использования земель памятника и его содержанием администрация района просит решить в соответствии с Законом Новосибирской области от 31.05.95 г. "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области".

Глава администрации


С.И. Селезнев

Председатель комиссии


В.И. Пахоменко



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Убинского района
С.И. Селезнев
10/04/2002 г.

А К Т

выбора земельного участка по образованию
памятника природы областного значения
"Убинский приозерный комплекс"

Для образования на территории Убинского района памятника
природы областного значения "Убинский приозерный комплекс"
комиссия в составе:

Пахоменко В.И. – зам. главы территориальной администрации,
председатель комиссии;

Плотников Н.С. – председатель комитета природных ресурсов и
охраны окружающей среды, зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:

Орлянский В.В. – председатель Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству;

Запрудин С.Н. – главный врач ГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Убинском районе";

Климентьев С.А. – и.о. директора Михайловского лесхоза

Матюхов И.П. – начальник отдела райохотнадзора;

Скрипалев В.Н. – главный специалист-госинспектор филиала "Об-
лэкоинспекция"

произвела выбор и отвод земельного участка для образования
вышеназванного памятника.

Земельный участок, отведенный под памятник природы "Убинский
приозерный комплекс", находится на территории Михайловского лес-
хоза – квартал N 238, квартал N 239, квартал N 243, занимает пло-
щадь 4918 га.

Комиссия считает необходимым создание памятника природы об-
ластного значения "Убинский приозерный комплекс".

Председатель комиссии

В.И. Пахоменко

Зам. председателя комиссии

Н.С. Плотников

Члены комиссии

Председатель комитета по земельным
ресурсам и землеустройству

В.В.Орлянский

Главный врач ГУ "Центр государст-
венного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора в Убинском районе"

С.Н.Запрудин

И.о.директора Михайловского лесхоза

С.А.Климентьев

Начальник отдела райохотнадзора

И.П.Матюхов

Главный специалист-инспектор
филиала "Облакоинспекция"

В.Н.Скрипалев

Выкопировка из плана земель "Михайловского лесхоза" к акту
выбора земельного участка под создание памятника природы област-
ного значения "Убинский приозерный комплекс"

С О Г Л А С О В А Н О:

Заместитель главы территориальной
администрации, председатель комиссии

В.И.Павлов

Председатель комитета по природным
ресурсам и охране окружающей среды,
Зам.председателя комиссии

В.И.Павлов

Члены комиссии:

Председатель комитета по земельным
ресурсам и землеустройству

В.В.Орлянский

Главный врач ГУ "Центр государст-
венного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора в Убинском районе"

С.Н.Запрудин

И.о.директора Михайловского лесхоза


С.А.Климентьев

Начальник отдела райохотнадзора

И.П.Матюхов

Главный специалист-инспектор
филиала "Облакоинспекция"

В.Н.Скрипалев



**НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(двадцатая сессия)
от 10 июля 2003 года**

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «УБИНСКИЙ ПРИОЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС»**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Новосибирского областного
Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

Рассмотрев представленные администрацией Новосибирской области материалы об образовании памятника природы областного значения «Убинский приозерный комплекс», Новосибирский областной Совет депутатов постановляет:

1. Образовать памятник природы областного значения «Убинский приозерный комплекс» в Убинском районе Новосибирской области.

(в ред. постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

2. Утратил силу с 29 января 2009 года. – Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Советская Сибирь» и «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета
В.В.ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2007 г. № 175-па****ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ
ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «УБИНСКИЙ ПРИОЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» постановляю:

Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Убинский приозерный комплекс» Новосибирской области.

Губернатор области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 16.11.2007 № 175-па

**ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«УБИНСКИЙ ПРИОЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС» НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Памятник природы регионального значения «Убинский приозерный комплекс» Новосибирской области (далее – памятник природы) находится в западной части Убинского района Новосибирской области, в 2 километрах восточнее села Черный Мыс, примыкая к восточной оконечности озера Убинское.

Северная граница территории памятника природы следует по проселочной дороге от места соприкосновения дороги с северной окраиной озера Убинское (в 2 километрах восточнее села Черный Мыс) и далее в северо-восточном направлении на протяжении 9,5 километра до пересечения с просекой, определяющей восточную границу квартала 239, и далее поворачивает по этой просеке на юго-запад до соединения через 2,3 километра с просекой, определяющей восточную границу квартала 243, и далее по этой просеке в юго-западном направлении (4,2 километра) до границы с Каргатским районом Новосибирской области. Южная и западная границы территории памятника природы определяются северной и восточной береговой линией озера Убинское и только крайняя юго-западная часть границы территории памятника природы на протяжении 650 метров идет по границе с Каргатским районом.

Карта-схема границ территории памятника природы регионального значения «Убинский приозерный комплекс» Новосибирской области прилагается (не приводится).

Экспликация земель
памятника природы регионального значения
«Убинский приозерный комплекс» Новосибирской области

Категории земель площади памятника природы:

- 1. Болото – 4795 га.
- 2. Озера – 123 га.
- Итого: 4918 га.

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 16.11.2007 № 175-па

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УБИНСКИЙ ПРИОЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».

2. В состав памятника природы регионального значения «Убинский приозерный комплекс» Новосибирской области (далее - памятник природы) входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Памятник природы представляет собой комплексный участок луго-болотной растительности, расположенный среди северного варианта лесостепного ландшафта в Убинском районе Новосибирской области. Основной объект охраны в памятнике природы - своеобразный комплекс фрагментов луговых, озерных и болотных экосистем.

На территории памятника природы выявлено 462 высших и низших сосудистых растения, 72 вида птиц, 19 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 105 видов беспозвоночных.

В настоящее время здесь зарегистрировано 7 видов растений, 11 видов птиц, 5 видов насекомых, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области.

II. Цели и задачи создания памятника природы

3. Цели:

- 1) сохранение естественных природных комплексов;
- 2) сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций приозерного природного комплекса;
- 3) сохранение редких, исчезающих и интродуцированных видов фауны и флоры;
- 4) сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;
- 5) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
- 6) экологическое воспитание населения.

4. Задачи:

- 1) поддержание целостности экосистемы;
- 2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;
- 3) сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия, свойственного только этой части Западной Сибири;
- 4) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;
- 5) обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;
- 6) обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
- 7) проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

III. Порядок образования памятника природы

5. Памятник природы образован постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 10.07.2003 (третий созыв, 20 сессия) на территории Убинского района Новосибирской области общей площадью 4918 га.

6. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.

IV. Правовой статус

7. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.

8. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).

9. Территория памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.

10. Срок действия - бессрочно.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

11. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

- 1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
- 2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
- 3) распашка земель;

- 4) заготовка растительной земли;
- 5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
- 6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- 7) взрывные работы;
- 8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения;
- 9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
- 10) самовольное занятие земель;
- 11) разведение костров, выжигание луговой растительности;
- 12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;
- 13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;
- 14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;
- 15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

12. На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

- 1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;
- 2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;
- 3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;
- 4) организация экскурсий в воспитательных целях;
- 5) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.


13. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

14. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

15. Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

16. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

План границ памятника природы



Координаты границ памятника природы
в системе координат - WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	55°35'10.98"	80°15'48.10"
2	55°35'41.57"	80°16'56.27"
3	55°36'52.47"	80°20'31.71"
4	55°37'19.99"	80°24'01.82"
5	55°32'04.11"	80°21'48.68"
6	55°31'38.00"	80°21'37.33"
7	55°31'32.07"	80°21'34.04"
8	55°31'30.46"	80°21'30.06"
9	55°31'29.50"	80°21'26.86"
10	55°31'28.41"	80°21'23.13"
11	55°31'27.05"	80°21'18.45"
12	55°31'25.60"	80°21'14.47"
13	55°31'21.55"	80°21'04.27"
14	55°31'18.63"	80°20'56.52"
15	55°31'14.25"	80°20'44.36"
16	55°31'11.48"	80°20'36.75"
17	55°31'09.40"	80°20'31.02"
18	55°31'07.27"	80°20'24.66"
19	55°31'03.38"	80°20'13.55"
20	55°31'03.27"	80°20'12.50"
21	55°31'03.15"	80°20'10.44"
22	55°31'03.49"	80°20'08.68"
23	55°31'04.36"	80°20'06.81"
24	55°31'05.41"	80°20'06.08"
25	55°31'08.05"	80°20'06.26"
26	55°31'10.69"	80°20'07.88"
27	55°31'12.80"	80°20'10.23"
28	55°31'14.75"	80°20'14.13"
29	55°31'16.51"	80°20'18.24"
30	55°31'17.98"	80°20'19.67"
31	55°31'47.63"	80°20'24.91"
32	55°32'09.67"	80°20'17.77"
33	55°32'33.12"	80°20'02.42"
34	55°33'15.26"	80°19'24.63"
35	55°33'37.83"	80°18'55.66"
36	55°34'01.68"	80°17'50.54"
37	55°34'24.19"	80°16'53.81"
38	55°34'21.96"	80°15'42.83"
39	55°34'10.10"	80°14'25.08"
40	55°33'55.28"	80°13'41.00"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
41	55°33'46.46"	80°12'57.81"
42	55°33'47.54"	80°12'50.53"
43	55°34'31.03"	80°14'20.26"

Краткая характеристика флоры и растительности (список основных видов растений)

Флористическое разнообразие памятника природы представлено 477 видами высших сосудистых растений. По результатам инвентаризации 2013 года за весь период исследований на территории памятника природы зарегистрировано 94 вида высших сосудистых растений. При образовании памятника природы в 2003 году было представлено 462 вида. В 2013 году из них не было обнаружено 383 вида (табл. 1). Флористический список памятника природы пополнился 15 видами растений. Из всех видов, отмеченных для данной территории, 10 включены в Красную книгу Новосибирской области, отмечаются как «редкие» и «крайне редкие» в Определителе растений Новосибирской области. Полный флористический список приведен в таблице 2.

Таблица 1

Сравнение флористических списков по результатам инвентаризации

2003 год образования памятника природы	по результатам инвентаризации 2013	Число видов		
		обнаруженных и ранее указанных в списке	не встреченных	новых для списка памятника природы
462	94	79	383	15

Во флористическом списке памятника природы присутствует 10 видов растений, занесенных в Красную книгу Новосибирской области. Из них за полевой сезон 2013 года обнаружен 1 вид, представленный крупными популяциями: осот болотный (*Sonchus palustris* L.) из семейства сложноцветные (рис. 1, 2). Статус редкости 3(R) – редкий вид.



Рис. 1. Осот болотный (соцветие)

**Аннотированный список видов флоры памятника природы
(по результатам инвентаризации)**

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
1	<i>Achillea asiatica</i> Serg.	Тысячелистник азиатский	Asteraceae	9 повсеместный	+		
2	<i>Achillea millefolium</i> L.	Тысячелистник обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
3	<i>Aconitum volubile</i> Pall. ex Koelle	Борец вьющийся	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
4	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Сныть обыкновенная	Apiaceae	9 повсеместный	+		
5	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	Репейничек волосистый	Rosaceae	9 повсеместный	+		
6	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Полевица гигантская	Poaceae	9 повсеместный	+		
7	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Полевица побегообразующая	Poaceae	9 повсеместный	+		
8	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	Полевица тонкая	Poaceae	9 повсеместный	+		
9	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb. s.l.	Полевица виноградниковая	Poaceae	9 повсеместный		+	
10	<i>Alisma gramineum</i> Lej.	Частуха злаковидная	Alismataceae	9 повсеместный	+		
11	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Частуха подорожниковая	Alismataceae	9 повсеместный	+	+	
12	<i>Allium angulosum</i> L.	Лук угловатый	Liliaceae	8 ограниченный	+		
13	<i>Allium rubens</i> Schrad. ex Willd.	Лук красноватый	Liliaceae	4 (In)	+		+
14	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Лисохвост равный	Poaceae	9 повсеместный	+		
15	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Лисохвост тростниковый	Poaceae	8 ограниченный	+	+	
16	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Лисохвост луговой	Poaceae	9 повсеместный	+		
17	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Щирица запрокинутая	Amaranthaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
18	<i>Andromeda polifolia</i> L.	Подбел многолистный	Ericaceae	8 ограниченный	+		
19	<i>Anemone sylvestris</i> L.	Ветреница лесная	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
20	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Дудник лесной	Apiaceae	9 повсеместный	+		
21	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	Резуха стреловидная	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
22	<i>Arctium lappa</i> L.	Лопух большой, репейник	Asteraceae	6 редкий	+		
23	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Лопух войлочный	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
24	<i>Artemisia abrotanum</i> L.	Полынь лечебная	Asteraceae	8 ограниченный	+		
25	<i>Artemisia campestris</i> L.	Полынь полевая	Asteraceae	6 редкий	+		
26	<i>Artemisia commutata</i> Bess.	Полынь замещающая	Asteraceae	9 повсеместный	+		
27	<i>Artemisia glauca</i> Pall. ex Willd.	Полынь серая	Asteraceae	9 повсеместный	+		
28	<i>Artemisia laciniata</i> Willd.	Полынь рассеченная	Asteraceae	9 повсеместный	+		
29	<i>Artemisia latifolia</i> Ledeb.	Полынь широколистная	Asteraceae	9 повсеместный	+		
30	<i>Artemisia macrantha</i> Ledeb.	Полынь крупноцветная	Asteraceae	9 повсеместный	+		
31	<i>Artemisia nitrosa</i> Web. ex Stechm.	Полынь селитряная	Asteraceae	8 ограниченный	+		
32	<i>Artemisia pontica</i> L.	Полынь понтийская	Asteraceae	8 ограниченный	+		
33	<i>Artemisia rupestris</i> L.	Полынь каменная, скальная	Asteraceae	8 ограниченный	+		
34	<i>Artemisia schrenkiana</i> Ledeb.	Полынь Шренка	Asteraceae	8 ограниченный	+		
35	<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.	Полынь Сиверса	Asteraceae	9 повсеместный	+		
36	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Полынь обыкновенная	Asteraceae	9 повсеместный	+		
37	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Спаржа лекарственная	Asparagaceae	8 ограниченный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
38	<i>Asparagus pallasii</i> Misch.	Спаржа Палласа	Asparagaceae	6 редкий	+		
39	<i>Astragalus danicus</i> Retz.	Астрагал датский	Fabaceae	9 повсеместный	+		
40	<i>Astragalus uliginosus</i> L.	Астрагал болотный	Fabaceae	8 ограниченный	+		
41	<i>Atriplex crassifolia</i> C.A. Mey.	Лебеда толстолистная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
42	<i>Atriplex hortensis</i> L.	Лебеда садовая	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
43	<i>Atriplex laevis</i> C.A. Mey.	Лебеда гладкая	Chenopodiaceae	6 редкий	+	+	
44	<i>Atriplex littoralis</i> L.	Лебеда прибрежная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
45	<i>Atriplex micrantha</i> C.A. Mey.	Лебеда мелкоцветковая	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
46	<i>Atriplex pedunculata</i> L.	Лебеда стебельчатая	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
47	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Лебеда простертая	Chenopodiaceae	9 повсеместный	+		
48	<i>Atriplex sagittata</i> Borkh.	Лебеда стреловидная	Chenopodiaceae	9 повсеместный	+		
49	<i>Atriplex tatarica</i> L.	Лебеда татарская	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
50	<i>Axiris amaranthoides</i> L.	Безвкусица щирицевидная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
51	<i>Barbarea arcuata</i> (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb.	Сурепка дуговидная	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
52	<i>Bassia sedoides</i> (Pall.) Aschers.	Бассия очитковидная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
53	<i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.	Шелковник водяной	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
54	<i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nym.	Шелковник Риона	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
55	<i>Batrachium trichophyllum</i> (Chaix) Bosch	Шелковник волосистый	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
56	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	Бекмания обыкновенная	Poaceae	8 ограниченный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
57	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fern.	Бекмания восточная	Poaceae	9 повсеместный	+		
58	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Икотник серый	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
59	<i>Betula alba</i> L.	Береза пушистая, белая	Betulaceae	9 повсеместный	+	+	
60	<i>Betula nana</i> L.	Береза карликовая	Betulaceae	9 повсеместный	+		
61	<i>Betula pendula</i> Roth.	Берёза бородавчатая	Betulaceae	9 повсеместный	+		
62	<i>Bidens tripartita</i> L.	Черёда трехраздельная	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
63	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Клубнекамыш приморский	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
64	<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (Fr. Schmidt) Egor.	Клубнекамыш плоскостебельный	Cyperaceae	8 ограниченный	+	+	
65	<i>Brachyactis ciliata</i> (Ledeb.) Ledeb.	Брахиактис реснитчатый	Asteraceae	6 редкий	+		
66	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	Коротконожка перистая	Poaceae	9 повсеместный	+		
67	<i>Brassica campestris</i> L.	Капуста полевая	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
68	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Капуста сарептская, горчица сарептская	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
69	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub	Кострец безостый	Poaceae	9 повсеместный	+		
70	<i>Bromus secalinus</i> L.	Костер ржаной	Poaceae	6 редкий	+		
71	<i>Butomus umbellatus</i> L.	Сусак зонтичный	Butomaceae	9 повсеместный	+	+	
72	<i>Cacalia hastata</i> L.	Недоспелка, Какалия копьевидная	Asteraceae	8 ограниченный	+		
73	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	Вейник тростниковый	Poaceae	9 повсеместный	+		
74	<i>Calamagrostis canescens</i> (Web.) Roth	Вейник седеющий	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
75	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	Вейник наземный	Poaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
76	<i>Calamagrostis macrolepis</i> Litv.	Вейник крупночешуйный	Poaceae	8 ограниченный	+	+	
77	<i>Calamagrostis neglecta</i> (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.	Вейник незамечаемый	Poaceae	9 повсеместный	+		
78	<i>Calamagrostis obtusata</i> Trin.	Вейник притупленный	Poaceae	9 повсеместный	+		
79	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Hall. fil.) Koel.	Вейник ложнотростниковый	Poaceae	8 ограниченный		+	
80	<i>Calamagrostis purpurea</i> (Trin.) Trin. s.l. subsp. <i>langsдорфii</i>	Вейник пурпуровый (подвид Лангсдорфа)	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
81	<i>Calla palustris</i> L.	Белокрыльник болотный	Araceae	6 редкий	+		
82	<i>Caltha palustris</i> L.	Калужница болотная	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
83	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Повой заборный	Convolvulaceae	8 ограниченный		+	
84	<i>Camelina microcarpa</i> Andr.	Рыжик мелкоплодный	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
85	<i>Campanula sibirica</i> L.	Колокольчик сибирский	Campanulaceae	9 повсеместный	+		
86	<i>Campanula wolgensis</i> P. Smirn.	Колокольчик волжский	Campanulaceae	8 ограниченный	+		
87	<i>Camphorosma songorica</i> Bunge	Камфоросма джунгарская	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
88	<i>Cannabis sativa</i> L.	Конопля посевная	Cannabaceae	9 повсеместный	+		
89	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Пастушья сумка обыкновенная	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
90	<i>Carduus crispus</i> L.	Чертополох курчавый	Asteraceae	8 ограниченный	+		
91	<i>Carex acuta</i> L.	Осока острая, стройная	Cyperaceae	9 повсеместный	+		
92	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Осока островидная	Cyperaceae	9 повсеместный	+		
93	<i>Carex aspratilis</i> V. Krecz.	Осока шероховатая	Cyperaceae	9 повсеместный	+		
94	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Осока Буксбаума	Cyperaceae	8 ограниченный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
95	<i>Carex canescens</i> L.	Осока седеющая	Сyperaceae	8 ограниченный	+		
96	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	Осока гвоздичная	Сyperaceae	8 ограниченный	+		
97	<i>Carex cespitosa</i> L.	Осока дернистая	Сyperaceae	9 повсеместный	+		
98	<i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh.	Осока струннокоренная	Сyperaceae	8 ограниченный	+		
99	<i>Carex diandra</i> Schrank	Осока двухтычинковая	Сyperaceae	8 ограниченный	+		
100	<i>Carex diluta</i> Bieb.	Осока светлая	Сyperaceae	9 повсеместный	+		
101	<i>Carex disticha</i> Huds.	Осока двурядная	Сyperaceae	9 повсеместный	+		
102	<i>Carex globularis</i> L.	Осока шаровидная	Сyperaceae	8 ограниченный		+	
103	<i>Carex juncella</i> (Fries) Th. Fries	Осока ситничковая	Сyperaceae	8 ограниченный		+	
104	<i>Carex limosa</i> L.	Осока топяная	Сyperaceae	9 повсеместный	+		
105	<i>Carex macroura</i> Meinsh.	Осока большехвостная	Сyperaceae	9 повсеместный	+		
106	<i>Carex magellanica</i> Lam.	Осока магелланская	Сyperaceae	8 ограниченный	+		
107	<i>Carex melanostachya</i> Bieb. ex Willd.	Осока черноколосая	Сyperaceae	6 редкий	+		
108	<i>Carex omskiana</i> Meinsh.	Осока омская	Сyperaceae	9 повсеместный	+		
109	<i>Carex praecox</i> Schreb.	Осока ранняя	Сyperaceae	9 повсеместный	+		
110	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Осока ложносытевая	Сyperaceae	8 ограниченный	+		
111	<i>Carex rhynchophysa</i> C.A. Mey.	Осока вздутоносая	Сyperaceae	6 редкий		+	
112	<i>Carex riparia</i> Curtis	Осока береговая	Сyperaceae	9 повсеместный	+		
113	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Осока длинноносиковая	Сyperaceae	9 повсеместный	+		
114	<i>Carex rugulosa</i> Kuk.	Осока морщинистая	Сyperaceae	6 редкий	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
115	<i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	Осока ржаная	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
116	<i>Carex tomentosa</i> L.	Осока войлочная	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
117	<i>Carex vesicaria</i> L.	Осока пузырчатая	Cyperaceae	9 повсеместный	+	+	
118	<i>Carlina biebersteinii</i> Bernh. ex Hornem.	Колючник Биберштейна	Asteraceae	8 ограниченный	+		
119	<i>Carum carvi</i> L.	Тмин обыкновенный	Apiaceae	9 повсеместный	+		
120	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Василек шероховатый	Asteraceae	9 повсеместный	+		
121	<i>Cerastium arvense</i> L.	Ясколка луговая	Caryophyllaceae	8 ограниченный	+		
122	<i>Cerastium holosteoides</i> Fres.	Ясколка дернистая, костенцевидная	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
123	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Роголистник погруженный	Ceratophyllacea e	9 повсеместный	+		
124	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Роголистник полупогруженный	Ceratophyllacea e	6 редкий	+		
125	<i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub	Хамерион узколистный	Onagraceae	9 повсеместный	+	+	
126	<i>Chamomilla suaveolens</i> (Pursh) Rydb.	Ромашка пахучая	Asteraceae	9 повсеместный	+		
127	<i>Chenopodium album</i> L.	Марь белая	Chenopodiaceae	9 повсеместный	+		
128	<i>Chenopodium botryodes</i> Smith	Марь кистевидная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
129	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Марь сизая	Chenopodiaceae	9 повсеместный	+		
130	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Марь гибридная	Chenopodiaceae	8 ограниченный		+	
131	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Марь многосемянная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
132	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	Марь торчащая	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
133	<i>Cicuta virosa</i> L.	Вех ядовитый	Apiaceae	9 повсеместный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
134	<i>Cirsium esculentum</i> (Siev.) C.A. Mey.	Бодяк съедобный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
135	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill	Бодяк разнолистный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
136	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Бодяк овощной	Asteraceae	6 редкий	+		
137	<i>Cirsium setosum</i> (Willd.) Bess.	Бодяк щетинистый	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
138	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Бодяк обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
139	<i>Cnidium dubium</i> (Schkuhr) Thell.	Жгун-корень сомнительный	Apiaceae	9 повсеместный	+		
140	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) C. Hartm.	Поллопестник зеленый	Orchidaceae	6 редкий	+		
141	<i>Comarum palustre</i> L.	Сабельник болотный	Rosaceae	9 повсеместный	+	+	
142	<i>Conioselinum tatricum</i> Hoffm.	Гирчовник татарский, влагалищный	Apiaceae	9 повсеместный	+		
143	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Вьюнок полевой	Convolvulaceae	9 повсеместный	+		
144	<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch	Скерда тупокорневищная	Asteraceae	9 повсеместный	+		
145	<i>Crepis sibirica</i> L.	Скерда сибирская	Asteraceae	9 повсеместный	+		
146	<i>Crepis tectorum</i> L.	Скерда кровельная	Asteraceae	9 повсеместный	+		
147	<i>Cuscuta europaea</i> L.	Повилика европейская	Cuscutaceae	8 ограниченный	+		
148	<i>Cuscuta lupuliformis</i> Kroker	Повилика хмелевидная	Cuscutaceae	8 ограниченный	+		
149	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Венерин башмачок настоящий	Orchidaceae	3 (R)	+		+
150	<i>Cypripedium macranthon</i> Sw.	Венерин башмачок крупноцветковый	Orchidaceae	3 (R)	+		+
151	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Ежа сборная	Poaceae	8 ограниченный	+		
152	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo	Пальцекоренник мясо-красный	Orchidaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
153	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) Hunt & Summerh.	Пальцекорник майский	Orchidaceae	нет	+		
154	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Дескурения Софии	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
155	<i>Dianthus ramosissimus</i> Pall. ex Poir.	Гвоздика широковетвистая	Caryophyllaceae	3 (R)	+		+
156	<i>Dianthus superbus</i> L.	Гвоздика пышная	Caryophyllaceae	8 ограниченный	+		
157	<i>Draba nemorosa</i> L.	Крупка перелесковая	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
158	<i>Dracocephalum nutans</i> L.	Змееголовник поникший	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
159	<i>Dracocephalum ruschiana</i> L.	Змееголовник Руйша	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
160	<i>Dracocephalum thymiflorum</i> L.	Змееголовник тимьяноцветный	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
161	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Росянка круглолистная	Droseraceae	6 редкий	+		
162	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	Щитовник шартрский, остистый	Aspidiaceae	6 редкий	+	+	
163	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.	Болотница игольчатая	Cyperaceae	6 редкий	+		
164	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. et Schult.	Болотница болотная	Cyperaceae	9 повсеместный	+		
165	<i>Elisanthe viscosa</i> (L.) Rupr.	Скрытолепестник липкий	Caryophyllaceae	8 ограниченный	+		
166	<i>Elymus mutabilis</i> (Drob.) Tzvel.	Пырейник изменчивый	Poaceae	9 повсеместный	+		
167	<i>Elymus sibiricus</i> L.	Пырейник сибирский	Poaceae	9 повсеместный	+		
168	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	Пырей ползучий	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
169	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Кипрей мохнатый	Onagraceae	8 ограниченный	+	+	
170	<i>Epilobium palustre</i> L.	Кипрей болотный	Onagraceae	9 повсеместный	+	+	
171	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Кипрей четырехсторонний	Onagraceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
172	<i>Equisetum arvense</i> L.	Хвощ полевой	Equisetaceae	9 повсеместный	+		
173	<i>Equisetum palustre</i> L.	Хвощ болотный	Equisetaceae	9 повсеместный	+		
174	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	Хвощ луговой	Equisetaceae	9 повсеместный	+		
175	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Хвощ лесной	Equisetaceae	9 повсеместный	+		
176	<i>Eremogone saxatilis</i> (L.) Ikonn.	Еремогона скальная	Caryophyllaceae	8 ограниченный	+		
177	<i>Erigeron acris</i> L.	Мелколепестник острый	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
178	<i>Eriophorum gracile</i> Koch	Пушица стройная	Cyperaceae	6 редкий	+		
179	<i>Eryngium planum</i> L.	Синеголовник плосколистный	Apiaceae	9 повсеместный	+		
180	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Желтушник левкойный	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
181	<i>Erysimum hieracifolium</i> L.	Желтушник ястребиноковый	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
182	<i>Euphorbia virgata</i> Waldst. et Kit.	Молочай лозный, или прутьевидный	Euphorbiaceae	9 повсеместный	+		
183	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	Очанка гребенчатая, татарская	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+		
184	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	Гречиха татарская	Polygonaceae	8 ограниченный	+		
185	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Гречишка кустарниковая	Polygonaceae	8 ограниченный	+		
186	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Овсяница луговая	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
187	<i>Festuca pseudovina</i> Hack. ex Wiesb.	Овсяница ложноовечья	Poaceae	9 повсеместный	+		
188	<i>Festuca rubra</i> L.	Овсяница красная	Poaceae	9 повсеместный	+		
189	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Лабазник вязолистный	Rosaceae	9 повсеместный	+		
190	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Лабазник обыкновенный	Rosaceae	9 повсеместный	+		
191	<i>Fragaria viridis</i> Duch.	Клубника, земляника зеленая	Rosaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
192	<i>Galatella biflora</i> (L.) Nees	Солонечник двухцветковый	Asteraceae	9 повсеместный	+		
193	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Пикульник двунадрезный	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
194	<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Пикульник ладанниковый	Lamiaceae	8 ограниченный	+		
195	<i>Galium boreale</i> L. s.l.	Подмаренник северный	Rubiaceae	9 повсеместный	+		
196	<i>Galium spurium</i> L.	Подмаренник ложный	Rubiaceae	6 редкий	+		
197	<i>Galium trifidum</i> L.	Подмаренник трехнадрезный	Rubiaceae	нет	+		
198	<i>Galium uliginosum</i> L.	Подмаренник топяной	Rubiaceae	9 повсеместный	+	+	
199	<i>Galium verum</i> L.	Подмаренник настоящий	Rubiaceae	9 повсеместный	+		
200	<i>Gentiana amarella</i> L.	Горечавка горькая	Gentianaceae	8 ограниченный	+		
201	<i>Gentiana ciliata</i> L.	Горечавка реснитчатая	Gentianaceae	6 редкий	+		
202	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Горечавка легочная, синий зверобой	Gentianaceae	9 повсеместный	+		
203	<i>Geranium bifolium</i> Patrin	Герань двулистная	Geraniaceae	8 ограниченный	+		
204	<i>Geranium pratense</i> L.	Герань луговая	Geraniaceae	9 повсеместный	+		
205	<i>Geranium pseudosibiricum</i> J. Mayer	Герань ложносибирская	Geraniaceae	8 ограниченный	+		
206	<i>Geranium sibiricum</i> L.	Герань сибирская	Geraniaceae	9 повсеместный	+		
207	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	Гравилат алеппский	Rosaceae	9 повсеместный	+		
208	<i>Geum rivale</i> L.	Гравилат речной	Rosaceae	9 повсеместный	+		
209	<i>Glaux maritima</i> L.	Млечник приморский	Primulaceae	8 ограниченный	+	+	
210	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Будра плющевидная	Lamiaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
211	<i>Glyceria plicata</i> (Fries) Fries	Манник складчатый	Poaceae	0 (Ex)	+		+
212	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	Солодка уральская	Fabaceae	9 повсеместный	+		
213	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Сушеница болотная	Asteraceae	8 ограниченный	+		
214	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Кокушник длиннорогий	Orchidaceae	6 редкий	+		
215	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	Голокучник трехраздельный	Aspidiaceae	9 повсеместный	+		
216	<i>Gypsophila altissima</i> L.	Качим высокий	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
217	<i>Halerpestes sarmentosa</i> (Adam.) Kom.	Ползунок отпрысковый	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
218	<i>Heracleum dissectum</i> Ledeb.	Борщевик рассеченный, пучка	Apiaceae	9 повсеместный	+		
219	<i>Heracleum sibiricum</i> L.	Борщевик сибирский	Apiaceae	8 ограниченный	+		
220	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Бровник одноклубневый	Orchidaceae	6 редкий	+		
221	<i>Hesperis sibirica</i> L.	Вечерница сибирская	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
222	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Ястребинка зонтичная	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
223	<i>Hierochloë odorata</i> (L.) Beauv.	Зубровка душистая	Poaceae	9 повсеместный	+		
224	<i>Hordeum brevisubulatum</i> (Trin.) Link	Ячмень короткоостистый	Poaceae	9 повсеместный	+		
225	<i>Hordeum jubatum</i> L.	Ячмень гривастый	Poaceae	8 ограниченный	+	+	
226	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Водокрас обыкновенный	Hydrocharitaceae	9 повсеместный	+	+	
227	<i>Inula aspera</i> Poir.	Девясил шероховатый	Asteraceae	8 ограниченный	+		
228	<i>Inula britannica</i> L.	Девясил британский	Asteraceae	9 повсеместный	+		
229	<i>Inula salicina</i> L.	Девясил иволистный	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
230	<i>Iris ruthenica</i> Ker-Gawl.	Касатик, ирис русский	Iridaceae	8 ограниченный	+		
231	<i>Juncus articulatus</i> L.	Ситник членистый	Juncaceae	6 редкий	+		
232	<i>Juncus bufonius</i> L.	Ситник жабий	Juncaceae	6 редкий	+		
233	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Ситник сплюснутый	Juncaceae	9 повсеместный	+	+	
234	<i>Juncus filiformis</i> L.	Ситник нитевидный	Juncaceae	6 редкий	+		
235	<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	Ситник Жерара	Juncaceae	9 повсеместный	+		
236	<i>Juncus ranarius</i> Song. et Perrier ex Billot	Ситник лягушачий	Juncaceae	6 редкий	+		
237	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Короставник полевой	Dipsacaceae	9 повсеместный	+		
238	<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	Тонконог гребенчатый	Poaceae	9 повсеместный	+		
239	<i>Koeleria delavignei</i> Czern. ex Domin	Тонконог Делявиня	Poaceae	8 ограниченный	+		
240	<i>Lactuca serriola</i> L.	Латук компасный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
241	<i>Lactuca sibirica</i> (L.) Maxim.	Латук сибирский	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
242	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey.	Латук татарский	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
243	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dum.	Липучка щетинистая, ежевидная	Boraginaceae	9 повсеместный	+		
244	<i>Lathyrus palustris</i> L.	Чина болотная	Fabaceae	6 редкий	+	+	
245	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	Чина гороховидная	Fabaceae	9 повсеместный	+		
246	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Чина луговая	Fabaceae	9 повсеместный	+		
247	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Чина клубневая	Fabaceae	9 повсеместный	+		
248	<i>Ledum palustre</i> L.	Багульник болотный	Ericaceae	8 ограниченный	+		
249	<i>Lemna minor</i> L.	Ряска маленькая	Lemnaceae	9 повсеместный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
250	<i>Lemna trisulca</i> L.	Ряска тройчатая	Lemnaceae	9 повсеместный	+	+	
251	<i>Lepidium cordatum</i> Willd. ex Stev.	Клоповник сердцелистный	Brassicaceae	6 редкий	+		
252	<i>Lepidium crassifolium</i> Waldst. et Kit.	Клоповник толстолистный	Brassicaceae	6 редкий	+		
253	<i>Lepidium latifolium</i> L.	Клоповник широколистный	Brassicaceae	8 ограниченный	+		
254	<i>Lepidium ruderales</i> L.	Клоповник мусорный	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
255	<i>Leymus paboanus</i> (Claus) Pilg.	Колосняк Пабо	Poaceae	9 повсеместный	+		
256	<i>Ligularia glauca</i> (L.) O. Hoffm.	Бузульник сизый	Asteraceae	9 повсеместный	+		
257	<i>Lilium pilosiusculum</i> (Freyen) Misch.	Лилия саранка	Liliaceae	9 повсеместный	+		
258	<i>Limonium gmelinii</i> (Willd.) O. Kuntze	Кермек Гмелина	Plumbaginaceae	9 повсеместный	+		
259	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льнянка обыкновенная	Scrophulariaceae	9 повсеместный	+		
260	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Воробейник лекарственный	Boraginaceae	8 ограниченный	+		
261	<i>Luzula pallescens</i> Sw.	Ожика бледноватая	Juncaceae	6 редкий	+		
262	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Зюзник европейский	Lamiaceae	9 повсеместный	+	+	
263	<i>Lycopus exaltatus</i> L. fil.	Зюзник высокий	Lamiaceae	6 редкий	+		
264	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербейник обыкновенный	Primulaceae	9 повсеместный	+	+	
265	<i>Lythrum virgatum</i> L.	Дербенник прутьевидный, плакун	Lythraceae	8 ограниченный	+	+	
266	<i>Matricaria perforata</i> Merat	Трехреберник непахучий, просверленный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
267	<i>Medicago falcata</i> L.	Люцерна серповидная	Fabaceae	9 повсеместный	+		
268	<i>Medicago lupulina</i> L.	Люцерна хмелевидная	Fabaceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
269	<i>Medicago sativa</i> L.	Люцерна посевная	Fabaceae	9 повсеместный	+		
270	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Марьянник гребенчатый	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+		
271	<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke	Дрема белая, луговая	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
272	<i>Melilotus albus</i> Medik.	Донник белый	Fabaceae	9 повсеместный	+		
273	<i>Melilotus officinalis</i> L. (Pall.)	Донник лекарственный	Fabaceae	9 повсеместный		+	
274	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl	Мерингия бокоцветная	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
275	<i>Myosotis caespitosa</i> K.F. Schultz	Незабудка дернистая	Boraginaceae	9 повсеместный	+		
276	<i>Myosotis imitata</i> Serg.	Незабудка подражающая, душистая	Boraginaceae	8 ограниченный	+		
277	<i>Myosotis palustris</i> (L.) L.	Незабудка болотная	Boraginaceae	9 повсеместный	+		
278	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Мягковолосник водяной	Caryophyllaceae	6 редкий		+	
279	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Уруть мутовчатая	Haloragaceae	9 повсеместный	+		
280	<i>Naumburgia thyrsiflora</i> (L.) Reichenb.	Наумбургия кистецветная	Primulaceae	9 повсеместный	+	+	
281	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Неслия метельчатая	Brassicaceae	8 ограниченный	+		
282	<i>Nonea pulla</i> (L.) DC.	Нонея темно-бурая	Boraginaceae	9 повсеместный	+		
283	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	Кубышка желтая	Nymphaeaceae	8 ограниченный	+		
284	<i>Nymphaea candida</i> J. Presl.	Кувшинка чисто-белая, белая водяная лилия	Nymphaeaceae	8 ограниченный	+		
285	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	Кувшинка малая	Nymphaeaceae	6 редкий	+		
286	<i>Oberna behen</i> (L.) Ikonn.	Хлопушка обыкновенная	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
287	<i>Odontites vulgaris</i> Moench	Зубчатка обыкновенная, поздняя	Scrophulariaceae	9 повсеместный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
288	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Омежник водяной	Apiaceae	6 редкий	+		
289	<i>Orhis militaris</i> L.	Ятрышник шлемоносный	Orchidaceae	3 (R)	+		+
290	<i>Origanum vulgare</i> L.	Душица обыкновенная	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
291	<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl.	Заразиха эльзасская	Orobanchaceae	6 редкий	+		
292	<i>Otites wolgensis</i> (Hornem.) Grossh.	Ушанка волжская	Caryophyllaceae	8 ограниченный	+		
293	<i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	Клюква мелкоплодная	Vacciniaceae	8 ограниченный	+		
294	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	Остролодочник волосистый	Fabaceae	8 ограниченный	+		
295	<i>Padus avium</i> Mill.	Черемуха обыкновенная	Rosaceae	9 повсеместный	+		
296	<i>Paeonia anomala</i> L.	Пион марьин корень	Paeniaceae	9 повсеместный	+		
297	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Вороний глаз четырёхлиственный	Trilliaceae	9 повсеместный	+		
298	<i>Parnassia palustris</i> L.	Белозор болотный	Parnassiaceae	9 повсеместный	+	+	
299	<i>Pedicularis dasystachys</i> Schrenk	Мытник мохнатоколосый	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+		
300	<i>Pedicularis elata</i> Willd.	Мытник высокий	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+		
301	<i>Pedicularis karoii</i> Freyn	Мытник Каро, болотный	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+	+	
302	<i>Pedicularis sibirica</i> Vved.	Мытник сибирский	Scrophulariaceae	6 редкий	+		
303	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray	Горец земноводный	Polygonaceae	нет		+	
304	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F. Gray	Горец развесистый	Polygonaceae	8 ограниченный	+		
305	<i>Petasites frigidus</i> (L.) Fries	Белокопытник холодный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
306	<i>Peucedanum morisonii</i> Bess. ex Spreng.	Горичник Морисона	Apiaceae	9 повсеместный	+		
307	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Горичник болотный	Apiaceae	8 ограниченный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
308	<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rauschert	Двукосточник тростниковый	Poaceae	9 повсеместный	+		
309	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	Тимофеевка степная	Poaceae	9 повсеместный	+		
310	<i>Phleum pratense</i> L.	Тимофеевка луговая	Poaceae	9 повсеместный	+		
311	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	Зопник клубненосный	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
312	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Тростник южный	Poaceae	9 повсеместный	+	+	
313	<i>Pilosella echiioides</i> (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip.	Ястребиночка румяноковая	Asteraceae	8 ограниченный	+		
314	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Бедренец обыкновенный	Apiaceae	9 повсеместный	+		
315	<i>Plantago cornuti</i> Gouan	Подорожник Корнута	Plantaginaceae	8 ограниченный	+	+	
316	<i>Plantago major</i> L.	Подорожник большой (обыкновенный)	Plantaginaceae	9 повсеместный	+	+	
317	<i>Plantago maritima</i> L.	Подорожник приморский, солончаковый	Plantaginaceae	8 ограниченный	+		
318	<i>Plantago maxima</i> Juss. ex Jacq.	Подорожник наибольший	Plantaginaceae	8 ограниченный	+		
319	<i>Plantago media</i> L.	Подорожник средний	Plantaginaceae	9 повсеместный	+		
320	<i>Plantago urvillei</i> Opiz	Подорожник Урвилла, степной	Plantaginaceae	9 повсеместный	+		
321	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Любка двулистная	Orchidaceae	6 редкий	+		
322	<i>Pleurospermum uralense</i> Hoffm.	Реброплодник уральский	Apiaceae	9 повсеместный	+		
323	<i>Poa angustifolia</i> L.	Мятлик узколистный	Poaceae	9 повсеместный	+		
324	<i>Poa nemoralis</i> L.	Мятлик лесной	Poaceae	9 повсеместный	+		
325	<i>Poa palustris</i> L.	Мятлик болотный	Poaceae	9 повсеместный	+		
326	<i>Poa pratensis</i> L.	Мятлик луговой	Poaceae	9 повсеместный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
327	<i>Poa urssulensis</i> Trin.	Мятлик урскульский	Poaceae	8 ограниченный	+		
328	<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	Спорыш обыкновенный	Polygonaceae	9 повсеместный	+	+	
329	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Спорыш птичий	Polygonaceae	9 повсеместный	+		
330	<i>Populus tremula</i> L.	Тополь дрожащий, осина	Salicaceae	9 повсеместный	+	+	
331	<i>Potamogeton compressus</i> L.	Рдест сплюснутый	Potamogetonaceae	6 редкий	+		
332	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Рдест злаковый	Potamogetonaceae	6 редкий	+		
333	<i>Potamogeton lucens</i> L.	Рдест блестящий	Potamogetonaceae	6 редкий	+		
334	<i>Potamogeton macrocarpus</i> Dobroch.	Рдест крупноплодный	Potamogetonaceae	6 редкий	+		
335	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Рдест гребенчатый	Potamogetonaceae	9 повсеместный	+		
336	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Рдест пронзеннолистный	Potamogetonaceae	8 ограниченный	+		
337	<i>Potentilla anserina</i> L.	Лапчатка гусиная	Rosaceae	9 повсеместный	+	+	
338	<i>Potentilla argentea</i> L.	Лапчатка серебристая	Rosaceae	9 повсеместный	+		
339	<i>Potentilla multifida</i> L.	Лапчатка многонадрезная	Rosaceae	9 повсеместный	+		
340	<i>Potentilla norvegica</i> L.	Лапчатка норвежская	Rosaceae	6 редкий	+		
341	<i>Potentilla tanacetifolia</i> Willd. ex Schlecht.	Лапчатка рябинколистная	Rosaceae	6 редкий	+		
342	<i>Primula cortusoides</i> L.	Первоцвет кортузовидный	Primulaceae	6 редкий	+		
343	<i>Primula Longiscapa</i> Ledeb.	Первоцвет длинностебельный	Primulaceae	9 повсеместный	+		
344	<i>Ptarmica salicifolia</i> (Bess.) Serg.	Чихотная трава иволистная	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
345	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	Бескильница расставленная	Poaceae	9 повсеместный	+		
346	<i>Puccinellia dolicholepis</i> V. Krecz.	Бескильница длинночешуйная	Poaceae	8 ограниченный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
347	<i>Puccinellia gigantea</i> (Grossh.) Grossh.	Бескильница гигантская	Poaceae	8 ограниченный	+		
348	<i>Puccinellia hauptiana</i> V. Krecz.	Бескильница Гаупта	Poaceae	9 повсеместный	+		
349	<i>Puccinellia kulundensis</i> Serg.	Бескильница кулундинская	Poaceae	8 ограниченный	+	+	
350	<i>Puccinellia tenuissima</i> Litv. ex V. Krecz.	Бескильница тончайшая	Poaceae	8 ограниченный	+		
351	<i>Puccinellia waginiae</i> Bubnova	Бескильница Вагиной	Poaceae	8 ограниченный	+		
352	<i>Pulmonaria dacica</i> Simonk.	Медуница (медунка, легочница) мягчайшая	Boraginaceae	9 повсеместный	+		
353	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	Прострел раскрытый	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
354	<i>Pyrola media</i> Sw.	Грушанка средняя	Pyrolaceae	8 ограниченный	+		
355	<i>Ranunculus acris</i> L.	Лютик едкий	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
356	<i>Ranunculus gmelinii</i> DC.	Лютик Гмелина	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
357	<i>Ranunculus lingua</i> L.	Лютик языковидный	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
358	<i>Ranunculus monophyllus</i> Ovcz.	Лютик однолистный	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
359	<i>Ranunculus polyrhizos</i> Steph.	Лютик многокорневой	Ranunculaceae	8 ограниченный	+		
360	<i>Ranunculus repens</i> L.	Лютик ползучий	Ranunculaceae	9 повсеместный	+	+	
361	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Лютик ядовитый	Ranunculaceae	9 повсеместный	+	+	
362	<i>Ranunculus radicans</i> C.A. Mey	Лютик укореняющийся	Ranunculaceae	2 (V)	+		+
363	<i>Rhinanthus aestivalis</i> (N. Zing.) Schischkin et Serg.	Погремок летний	Scrophulariaceae	8 ограниченный		+	
364	<i>Ribes nigrum</i> L.	Смородина черная	Grossulariaceae	9 повсеместный	+	+	
365	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Bess.	Жерушник земноводный	Brassicaceae	6 редкий	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
366	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.	Жерушник болотный	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
367	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	Роза иглистая	Rosaceae	9 повсеместный	+		
368	<i>Rosa majalis</i> Herm.	Шиповник майский	Rosaceae	9 повсеместный	+		
369	<i>Rubus arcticus</i> L.	Княженика, поляника	Rosaceae	6 редкий	+		
370	<i>Rubus chamaemorus</i> L.	Морошка, малина приземистая,	Rosaceae	6 редкий	+		
371	<i>Rubus idaeus</i> L.	Малина обыкновенная	Rosaceae	9 повсеместный	+		
372	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяника каменистая	Rosaceae	9 повсеместный	+		
373	<i>Rumex acetosella</i> L.	Щавелек обыкновенный	Polygonaceae	9 повсеместный		+	
374	<i>Rumex aquaticus</i> L.	Щавель водяной	Polygonaceae	8 ограниченный	+		
375	<i>Rumex maritimus</i> L.	Щавель приморский	Polygonaceae	9 повсеместный	+	+	
376	<i>Rumex pseudonatronatus</i> (Borb.) Borb. ex Murb.	Щавель ложносолончаковый	Polygonaceae	8 ограниченный	+		
377	<i>Rumex rossicus</i> Murb.	Щавель русский	Polygonaceae	6 редкий	+		
378	<i>Rumex stenophyllus</i> Ledeb.	Щавель узколистный	Polygonaceae	8 ограниченный	+		
379	<i>Salicornia europaea</i> L.	Солерос европейский	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+	+	
380	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	Ива Бебба	Salicaceae	9 повсеместный	+		
381	<i>Salix caprea</i> L.	Ива козья	Salicaceae	9 повсеместный	+		
382	<i>Salix cinerea</i> L.	Ива пепельная	Salicaceae	9 повсеместный	+	+	
383	<i>Salix dasyclados</i> Wimm.	Ива шерстисто побеговая	Salicaceae	9 повсеместный		+	
384	<i>Salix pentandra</i> L.	Ива пятитычинковая	Salicaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
385	<i>Salix rosmarinifolia</i> L.	Ива розмаринолистная, сибирская	Salicaceae	9 повсеместный	+	+	
386	<i>Salix viminalis</i> L.	Ива корзиночная	Salicaceae	9 повсеместный	+	+	
387	<i>Salsola collina</i> Pall.	Солянка холмовая	Chenopodiaceae	9 повсеместный	+		
388	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Кровохлебка лекарственная	Rosaceae	9 повсеместный	+		
389	<i>Saussurea amara</i> (L.) DC.	Соссюрея горькая, горькуша	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
390	<i>Saussurea salsa</i> (Pall.) Spreng.	Соссюрея солончаковая	Asteraceae	8 ограниченный	+		
391	<i>Scirpus hippolyti</i> V. Krecz.	Камыш Ипполита	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
392	<i>Scirpus lacustris</i> L.	Камыш озерный	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
393	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	Камыш укореняющийся	Cyperaceae	5 критический	+		
394	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C. Gmelin	Камыш Табернемонтана	Cyperaceae	9 повсеместный	+	+	
395	<i>Scolochloa festucacea</i> (Willd.) Link	Тростянка овсяницеvidная	Poaceae	8 ограниченный	+	+	
396	<i>Scorzinera parviflora</i> Jacq.	Козелец мелкоцветковый	Asteraceae	8 ограниченный	+		
397	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Шлемник обыкновенный	Lamiaceae	9 повсеместный	+		
398	<i>Scutellaria scordiifolia</i> Fisch. ex Schrank	Шлемник скордиелистный	Lamiaceae	8 ограниченный	+		
399	<i>Sedum telephium</i> L.	Очиток пурпуровый	Crassulaceae	9 повсеместный	+		
400	<i>Senecio congestus</i> (R.Br.) DC.	Крестовник скученный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
401	<i>Senecio erucifolius</i> L.	Крестовник эруколистный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
402	<i>Senecio integrifolius</i> (L.) Clairv.	Крестовник цельнолистный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
403	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Крестовник Якова	Asteraceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
404	<i>Senecio nemorensis</i> L.	Крестовник дубравный	Asteraceae	9 повсеместный	+		
405	<i>Serratula coronata</i> L.	Серпуха обыкновенная, венценосная	Asteraceae	9 повсеместный	+		
406	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Жабрица порезниковая, гранатник	Apiaceae	9 повсеместный	+		
407	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	Щетинник зеленый	Poaceae	9 повсеместный	+		
408	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh.	Смолевка зеленоцветковая	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
409	<i>Silene multiflora</i> (Waldst. et Kit.) Pers.	Смолевка многоцветковая	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
410	<i>Sinapis arvensis</i> L.	Горчица полевая	Brassicaceae	6 редкий	+		
411	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	Гулявник Лезеля	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
412	<i>Solanum kitagawae</i> Schonbeck-Temesy	Паслен Китагавы	Solanaceae	9 повсеместный	+		
413	<i>Solanum nigrum</i> L.	Паслен черный	Solanaceae	9 повсеместный	+		
414	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Золотарник обыкновенный, золотая розга	Asteraceae	9 повсеместный	+		
415	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Осот полевой	Asteraceae	9 повсеместный	+		
416	<i>Sonchus palustris</i> L.	Осот болотный	Asteraceae	3 (R)	+	+	+
417	<i>Sparganium erectum</i> L.	Ежеголовник прямой	Sparganiaceae	6 редкий	+	+	
418	<i>Spergularia marina</i> (L.) Grieseb.	Торичник приморский, солончаковый	Caryophyllaceae	6 редкий	+		
419	<i>Spiranthes amoena</i> (Bieb.) Spreng.	Скрученник приятный	Orchidaceae	6 редкий	+		
420	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Многокоренник обыкновенный	Lemnaceae	6 редкий	+		
421	<i>Stachys palustris</i> L.	Чистец болотный	Lamiaceae	9 повсеместный	+	+	
422	<i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh.	Звездчатка толстолистная	Caryophyllaceae	8 ограниченный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
423	<i>Stellaria graminea</i> L.	Звездчатка злаковая	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+	+	
424	<i>Stellaria holostea</i> L.	Звездчатка ланцетовидная	Caryophyllaceae	3 (R)	+		+
425	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Звездчатка средняя, мокрица	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
426	<i>Stellaria palustris</i> Retz.	Звездчатка болотная	Caryophyllaceae	9 повсеместный	+		
427	<i>Stratiotes aloides</i> L.	Телорез обыкновенный	Hydrocharitaceae	6 редкий	+		
428	<i>Suaeda corniculata</i> (C.A. Mey.) Bunge str.	Сведа рожконосная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+		
429	<i>Suaeda prostrata</i> Pall.	Сведа стелющаяся	Chenopodiaceae	8 ограниченный	+	+	
430	<i>Tamarix laxa</i> Willd.	Гребенщик рыхлый	Tamaricaceae	3 (R)	+		+
431	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Пижма обыкновенная	Asteraceae	9 повсеместный	+		
432	<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hahd.-Mazz.	Одуванчик бессарабский	Asteraceae	8 ограниченный	+		
433	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg. s.l.	Одуванчик обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
434	<i>Thalictrum flavum</i> L.	Василисник желтый	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
435	<i>Thalictrum minus</i> L. s.l.	Василисник малый	Ranunculaceae	9 повсеместный	+		
436	<i>Thalictrum simplex</i> L.	Василисник простой	Ranunculaceae	9 повсеместный	+	+	
437	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Телиптерис болотный	Thelypteridaceae	9 повсеместный	+	+	
438	<i>Thesium refractum</i> C.A. Mey.	Ленец сибирский	Santalaceae	6 редкий	+		
439	<i>Thesium repens</i> Ledeb.	Ленец ползучий	Santalaceae	6 редкий	+		
440	<i>Thlaspi arvense</i> L.	Ярутка полевая	Brassicaceae	9 повсеместный	+		
441	<i>Tragopogon orientalis</i> L.	Козлобородник восточный	Asteraceae	9 повсеместный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
442	<i>Trifolium lupinaster</i> L.	Клевер люпиновый	Fabaceae	9 повсеместный	+		
443	<i>Trifolium pratense</i> L.	Клевер луговой	Fabaceae	9 повсеместный	+	+	
444	<i>Trifolium repens</i> L.	Клевер ползучий	Fabaceae	9 повсеместный	+		
445	<i>Triglochin maritimum</i> L.	Триостренник приморский	Juncaginaceae	8 ограниченный	+		
446	<i>Triglochin palustre</i> L.	Триостренник болотный	Juncaginaceae	9 повсеместный	+		
447	<i>Tripolium vulgare</i> Nees	Триполиум обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный	+	+	
448	<i>Trommsdorffia maculata</i> (L.) Bernh.	Прозанник, Пазник крапчатый	Asteraceae	9 повсеместный	+		
449	<i>Turritis glabra</i> L.	Башенница голая	Brassicaceae	6 редкий	+		
450	<i>Typha angustifolia</i> L.	Рогоз узколистный	Typhaceae	9 повсеместный	+	+	
451	<i>Typha latifolia</i> L.	Рогоз широколистный	Typhaceae	9 повсеместный	+		
452	<i>Typha laxmanii</i> Lepech.	Рогоз Лаксмана	Typhaceae	9 повсеместный	+	+	
453	<i>Urtica cannabina</i> L.	Крапива коноплевая	Urticaceae	9 повсеместный	+		
454	<i>Urtica dioica</i> L.	Крапива двудомная	Urticaceae	9 повсеместный	+	+	
455	<i>Urtica urens</i> L.	Крапива жгучая	Urticaceae	9 повсеместный	+		
456	<i>Urticularia vulgaris</i> L.	Пузырчатка обыкновенная	Lentibulariaceae	9 повсеместный	+	+	
457	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Брусника	Vacciniaceae	8 ограниченный	+		
458	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Голубика	Vacciniaceae	8 ограниченный	+		
459	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Черника	Vacciniaceae	8 ограниченный	+		
460	<i>Valeriana officinalis</i> L. s.l. (<i>Valeriana dubia</i> Bunge)	Валериана лекарственная (Валериана сомнительная)	Valerianaceae	8 ограниченный	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			2003 год	2013 год	Красная книга
461	<i>Valeriana officinalis</i> L. s.l. (<i>Valeriana rossica</i> P. Smirn.)	Валериана лекарственная (Валериана русская)	Valerianaceae	6 редкий	+		
462	<i>Veronica anagallis- aquatica</i> L.	Вероника ключевая	Scrophulariaceae	9 повсеместный	+	+	
463	<i>Veronica krylovii</i>	Вероника Крылова	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+		
464	<i>Veronica longifolia</i> L.	Вероника длиннолистная	Scrophulariaceae	9 повсеместный	+		
465	<i>Veronica scutellata</i> L.	Вероника щитковая	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+		
466	<i>Veronica spicata</i> L.	Вероника колосистая	Scrophulariaceae	9 повсеместный	+		
467	<i>Veronica spuria</i> L.	Вероника ненастоящая	Scrophulariaceae	8 ограниченный	+		
468	<i>Vicia amoena</i> Fisch.	Горошек приятный	Fabaceae	9 повсеместный	+		
469	<i>Vicia cracca</i> L.	Горошек мышиный	Fabaceae	9 повсеместный	+		
470	<i>Vicia megalotropis</i> Ledeb.	Горошек крупнолодочковый	Fabaceae	8 ограниченный	+		
471	<i>Vicia sativa</i> L.	Горошек посевной	Fabaceae	6 редкий	+		
472	<i>Vicia sepium</i> L.	Горошек заборный	Fabaceae	9 повсеместный	+		
473	<i>Vicia sylvatica</i> L.	Горошек лесной	Fabaceae	8 ограниченный	+		
474	<i>Viola canina</i> L.	Фиалка собачья	Violaceae	9 повсеместный	+		
475	<i>Viola hirta</i> L.	Фиалка волосистая	Violaceae	9 повсеместный	+		
476	<i>Viola stagnina</i> Kit.	Фиалка персиколистная	Violaceae	6 редкий	+		
				ИТОГО	462	94	10

Территория памятника природы представляет собой уникальный естественный природный комплекс лесных, луговых и водно-болотных сообществ.

Таблица 3

Основные растительные сообщества памятника природы

Растительное сообщество	Процент от общей площади, %
Лесные заболоченные березово-осоковые сообщества	22,1
Тростниковое болото	33,0
Лесные заболоченные березово-ивово-разнотравно-осоковые сообщества	14,5
Ивово-осоковые сообщества с подростом березы	25,9
Заболоченные ивово-тростниковые сообщества	4,6




Рис. 2. Карта-схема растительности памятника природы

Краткие сведения о животном мире (список основных видов)
(по результатам инвентаризации)

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Хвостатые – Caudata

Семейство Углозубые – Hynobiidae

Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii (Dybowsky, 1870). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Семейство Саламандровые – Salamandridae

Обыкновенный тритон – Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Отряд Бесхвостые – Anura

Семейство Жабы – Bufonidae

Серая жаба – Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области предпочитает лесные ландшафты, особенно сосняки, чередующиеся с полосами болот (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Семейство Настоящие лягушки – Ranidae

Остромордая лягушка – Rana arvalis (Nilsson, 1842). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Наиболее обычный вид амфибий, по всей территории распространён в Новосибирской области (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Многочисленный вид.

Озёрная лягушка – Rana ridibunda (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области встречается с 1990-х гг. в пределах Ордынского и Сузунского районов (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Нами не отмечена. Встреча на территории памятника природы крайне маловероятна.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – Squamata

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Живородящая ящерица – *Zootoca vivipara* (Jacquin, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области населяет леса разных типов, где придерживается окраин болот, берегов лесных речек, зарастающих вырубок и гарей, опушек, полян, тропинок, просек (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Немногочисленный вид.

Семейство Ужеобразные – Colubridae

Обыкновенный уж – *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В пределах Новосибирской области распространён, главным образом, в районах, прилегающих к реке Оби и её притокам (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Семейство Гадюковые – Viperidae

Обыкновенная гадюка – *Vipera berus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области населяет лесостепную и лесную зону к северу и востоку от оз. Чаны (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Обычный вид.

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes

Семейство Гагаровые – Gaviidae

Чернозобая гагара – *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758). (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Западной Сибири распространён практически по всей территории, на север – до южных тундр (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится в основном в северных районах, спорадически распространена в степной и лесостепной зонах (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий гнездящийся вид (0,03 особи/га водоёмов, 2 пары).

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes

Семейство Поганковые – Podicipedidae

Красношейная поганка – *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU A2abce+3bce+4abce (уязвимый вид) В Западной Сибири распространена от лесотундры до степи (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится преимущественно, в лесной и лесостепной зонах, в восточных районах не отмечена (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий гнездящийся вид (0,13 особи/га открытой водной поверхности, 8 пар).

Чомга – *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена по всей территории, но более обычна в степных и лесостепных районах. Обычный гнездящийся вид.

Серощёкая поганка – *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена преимущественно в степных и лесостепных районах. Обычный гнездящийся вид.

Черношейная поганка – *Podiceps nigricollis* (Brehm, 1831). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена преимущественно в степных и лесостепных районах. Обычный гнездящийся вид.

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Семейство Цаплевые – Ardeidae

Выпь большая – *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Обычный гнездящийся вид.

Серая цапля – *Ardea cinerea* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области наиболее обычна в лесостепных и степных районах. Обычный гнездящийся вид.

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Гуменник – *Anser fabalis* (Latham, 1787). (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Красная книга Российской Федерации – II категория. Широко распространён в тундровой и таёжной зонах Западной Сибири (Рябицев, 2008). В Новосибирской области в настоящее время не гнездится, а встречается во время миграции, наиболее часто – в Барабинском, Купинском, Здвинском, Купинском, Доволенском, Каргатском, Кочковском и Колыванском районах (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Убинское озеро и его окрестности представляют собой одно из важнейших мест скопления гуменника на пролёте в Новосибирской области – здесь в 2001-04 гг. во время пролёта отмечали до 5000 птиц (Ключевые, 2006). Указан при создании памятника природы. Нами не встречен. Очевидно, обычный пролётный вид.

Пискулька – *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU A2bcd+3bcd+4bcd (уязвимый вид). В Сибири гнездится в лесотундре и тундре, на пролёте отмечается в Новосибирской области, в том числе на оз. Убинское и окрестных водоёмах (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность

мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Нами не отмечен. Очевидно, редкий пролётный вид.

Лебедь-шипун – *Cygnus olor* (J.F. Gmelin, 1789). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Новосибирской области проходит северо-восточная граница распространения вида в Западной Сибири, отмечается в степной и лесостепной зонах (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,08 особи/га водоёмов), возможно гнездование 2-3 пар.

Красноносый нырок – *Netta rufina* (Pallas, 1773). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Новосибирской области проходит северо-восточная граница распространения вида в Западной Сибири, отмечается в степной и лесостепной зонах (Красная книга, 2008). Редкий вид (0,09 особи/га водоёмов), возможно гнездование единичных пар.

Лебедь-кликун – *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области наиболее обычен в северных и центральных районах. Редкий гнездящийся и обычный пролётный вид.

Серый гусь – *Anser anser* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Новосибирская область – один из основных очагов размножения вида в пределах Российского ареала (Кривенко и Виноградов, 2001). Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Кряква – *Anas platyrhynchos* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена по всей территории, одна из самых обычных уток. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Серая утка – *Anas strepera* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в южных районах. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Широконоска – *Anas clypeata* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Чирок-свистун – *Anas crecca* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории, но на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Шилохвость – *Anas acuta* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных и центральных районах. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Связь – *Anas penelope* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Чирок-трескунок – *Anas querquedula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории, весьма обычный вид. Немногочисленный гнездящийся вид.

Красноголовый нырок – *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании наиболее обычен в южных районах. Обычный гнездящийся вид.

Хохлатая чернеть – *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена по всей территории. Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный гоголь – *Vulpes clangula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Обычный пролётный и летующий вид, возможно гнездование.

Луток – *Mergellus albellus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Обитает на водоёмах лесной, лесотундровой и лесостепной зон, где в целом редок или немногочислен (Рябицев, 2008). Редкий пролётный вид.

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Скопиные – Pandionidae

Скопа – *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. В Новосибирской области летнее пребывание зафиксировано вблизи оз. Чаны, оз. Убинское, в долине Оби и северных районах области (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Очень редкий вид – нами отмечено 5 особей в июне 2013 г. (0,001 особи/га).

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Большой подорлик – *Aquila clanga* (Pallas, 1811). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Красную книгу РФ – II категория. Красный список МСОП – VU C2a(ii) (уязвимый вид). Большой подорлик распространён в степной, лесостепной и большей части лесной зоны от Восточной Европы до Приморья (Рябицев, 2008). В Новосибирской области

гнездится в основном в северных и центральных районах, в большинстве других встречается во время миграций. Редкий вид, численность которого в центральных районах медленно восстанавливается (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,002 особи/га). Нами встречены 8 взрослых птицы. Предполагается гнездование 3-4 пар. Природные условия памятника природы в целом благоприятны для обитания данного вида.

Беркут – *Aquila chrysaëtus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Гнездится преимущественно на крайнем севере и юго-востоке области, в остальных районах может отмечаться на кочёвках и зимовке (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Нами отмечена 1 неполовозрелая особь на северном побережье Убинского озера в 3 км к востоку от с. Чёрный Мыс.

Орлан-белохвост – *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – V категория. Красный список МСОП – LR/nt (проблемный вид, близкий к уязвимым). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, на север – до южных тундр (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится в основном в северных районах и в окрестности оз. Чаны. В большинстве других встречается во время миграций. Численность, вероятно, стабильна (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Редкий вид – отмечено 10 особей (0,002 особи/га). Гнездится, очевидно, не менее 4-5 пар.

Луговой лунь – *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Красный список МСОП – LC (вызывающий наименьшие опасения). В Западной Сибири распространён от степей до южной тайги (Рябицев, 2008). В Новосибирской области встречен во всех административных районах, но по всей территории редок (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,001 особи/га).

Обыкновенный осоед – *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири – немногочисленная птица лесной зоны (Рябицев, 2008). Очень редкий гнездящийся вид.

Чёрный коршун – *Milvus migrans* (Boddaert, 1783). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Вид широко распространён в Западной Сибири, один из наиболее многочисленных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Ястреб-перепелятник – *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Широко

распространён в Западной Сибири, один из самых обычных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Обыкновенный канюк – *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Широко распространён в Западной Сибири, один из самых обычных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Болотный лунь – *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Обычный вид хищных птиц, особенно в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Полевой лунь – *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от степей до южной тундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Соколиные – *Falconidae*

Дербник – *Falco columbarius* (Linnaeus, 1758). (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Дербник широко распространён в Северной Евразии и Северной Америке, где встречается от тундр до степей (Рябицев, 2008). В Новосибирской области является слабоизученным, малочисленным, спорадически распространённым видом (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,006 особи/га). Предполагается гнездование 10-15 пар.

Кобчик – *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Красный список МСОП – NT (вид, близкий к угрожаемому). В Сибири кобчик спорадически распространён в лесной, лесостепной и степной зонах, более обычен в лесостепи (Рябицев, 2008). Для Новосибирской области является малочисленным, местами обычным видом, численность подвержена колебаниям (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Очень редкий вид (0,005 особи/га). Предполагается гнездование 10-12 пар.

Чеглок – *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной лесотундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Обыкновенная пустельга – *Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степей до юга тундровой зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Курообразные – Galliiformes

Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Белая куропатка – *Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Согласно Красному списку МСОП численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от лесостепи до тундры, в лесостепной зоне и южной тайге редка или отсутствует (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Тетерев – *Lyrurus tetrix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Вид широко распространён в лесостепной и лесной зоне Западной Сибири (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Рябчик – *Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Населяет лесную зону Евразии, в Западной Сибири является самой обычной лесной куриной птицей (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Фазановые – Phasianidae

Перепел – *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается на север до южной части лесной зоны, где держится преимущественно, на полях и пойменных лугах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Семейство Журавлиные – Gruidae

Серый журавль – *Grus grus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Барабинская низменность – один из ключевых районов гнездования серого журавля в России (Птицы СССР, 1987). Немногочисленный гнездящийся и обычный пролётный вид.

Семейство Пастушковые – Rallidae

Коростель – *Crex crex* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири наиболее обычен в лесостепи и на юге лесной зоны (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Погоныш – *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север до средней тайги, но наиболее обычен в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Лысуха – *Fulica atra* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность

мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги, но наиболее обычна в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Пастушок водяной – *Rallus aquaticus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён, преимущественно, в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Ржанковые – Charadriidae

Тулес – *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён в тундре и лесотундре (Рябицев, 2008). Немногочисленный пролётный и летующий вид.

Золотистая ржанка – *Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена в тундре и лесотундре (Рябицев, 2008). Редкий пролётный вид.

Бурокрылая ржанка – *Pluvialis dominica* (Müller, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена в тундре (Рябицев, 2008). Редкий пролётный вид.

Малый зуёк – *Charadrius dubius* (Scopoli, 1786). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от северной тайги до степи (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся (на берегах Убинского озера) и пролётный вид.

Галстучник – *Charadrius hiaticula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён в тундре, лесотундре и северной тайге (Рябицев, 2008). Обычный пролётный вид.

Камнешарка – *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается в северной тундре (Рябицев, 2008). Редкий пролётный вид.

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Большой кроншнеп – *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красный список МСОП – NT (находящийся в состоянии, близком к угрожаемому) МСОП-12. В Сибири распространён от степей до северной тайги (Рябицев, 2008). Особи степной

популяции сибирского большого кроншнепа гнездятся в юго-западной части Новосибирской области: на юге лесостепной зоны и в степной зоне (Красная книга, 2008). Редкий гнездящийся вид (0,01 особи/га).

Чибис – *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён в лесной, лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Черныш – *Tringa ochropus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Западной Сибири распространён в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся или летующий вид.

Фи́фи – *Tringa glareola* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от тундр до степи, но в южных районах на гнездовании редка (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Травник – *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в степной, лесостепной и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Щеголь – *Tringa erythropus* (Pallas, 1764). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в тундре, лесотундре и северной тайге, на остальной территории встречается во время миграций (Рябицев, 2008). Немногочисленный пролётный вид.

Поручейник – *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в степной, лесостепной и южной части лесной зоны, местами обычная птица (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Перевозчик – *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от южной тундры до степей (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Мородунка – *Xenus cinerea* (Güld, 1775). Согласно Красному списку МСОП вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от южной тундры до степей (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Обыкновенный бекас – *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий

наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от тундр до степей (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Дупель – *Gallinago media* (Latham, 1787). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории NT (близкий к угрожаемому), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от тундры до лесостепной зоны (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Лесной дупель – *Gallinago megala* (Swinhoe, 1861). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Западной Сибири обитает, преимущественно, в восточной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Большой веретенник – *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758). (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Западной Сибири распространён на север, преимущественно, до средней тайги. Наиболее обычен в лесостепи и степи (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Турухтан – *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён по всей территории, но гнездится, преимущественно, в лесотундре и тундре (Рябицев, 2008). Редкий летующий и обычный пролётный вид. Возможно гнездование отдельных пар.

Кулик-воробей – *Calidris minuta* (Leisler, 1812). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Гнездится в тундровой зоне, на пролёте встречается на водоёмах других зон (Рябицев, 2008). Немногочисленный пролётный вид.

Белохвостый песочник – *Calidris temminckii* (Leisler, 1812). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Гнездится в тундровой и лесотундровой зонах, на пролёте встречается на водоёмах других зон (Рябицев, 2008). Немногочисленный пролётный вид.

Чернозобик – *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Гнездится в тундровой зоне, на пролёте встречается на водоёмах других зон (Рябицев, 2008). Немногочисленный пролётный вид.

Краснозобик – *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции растёт (The IUCN, 2012). Гнездится в тундровой зоне, на пролёте встречается на водоёмах других зон (Рябицев, 2008). Немногочисленный пролётный вид.

Круглоносый плавунчик – *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири гнездится в лесотундре и тундре, в остальных районах

обычен на кочёвках и в период миграций (Рябицев, 2008). Немногочисленный летующий вид, на пролёте обычен.

Семейство Чайковые – Laridae

Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus (Pallas, 1773). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – V категория. Красный список МСОП-96 – LC (вызывающий наименьшие опасения). В Новосибирской области гнездование отмечено на островах оз. Чаны и Новосибирского водохранилища, неполовозрелые и холостые птицы отмечаются в летнее время на богатых рыбой водоёмах лесостепной и степной зон (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид – в прибрежной части оз. Убинское отмечены группы из 20 и 30 птиц.

Озёрная чайка – Larus ridibundus (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степной зоны до средней тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Сизая чайка – Larus. canus (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степной зоны до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Малая чайка – Larus minutus (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена, преимущественно, в лесостепи и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Крачковые – Sternidae

Речная крачка – Sterna hirundo (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири гнездится от северной тайги до степей (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Чёрная крачка – Chlidonias niger (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

Семейство Голубиные – Columbidae

Большая горлица – Streptopelia orientalis (Latham, 1790). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространена в лесной и лесостепной зонах к востоку от Уральских гор (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Сизый голубь – Columba livia (Gmelin, 1789). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири является типичным синантропом – встречается только в населённых пунктах или ближайших окрестностях (Рябицев, 2008). Нами не отмечен. Обитание на территории памятника природы крайне маловероятно.

Клинтух – Columba oenas (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes

Семейство Кукушковые – Cuculidae

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Сибири распространена широко – от степи до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Глухая кукушка – Cuculus saturatus (Blyth, 1843). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространена от лесостепи до лесотундры (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд СOVOобразные – Strigiformes

Семейство Совиные – Strigidae

Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis (Pallas, 1771). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Длиннохвостая неясыть распространена в хвойных и смешанных лесах Евразии от Скандинавии до Чукотки (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится, преимущественно, в северных и восточных районах. Численность изучена слабо, возможно её увеличение (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). На территории памятника природы возможны встречи во время кочёвок и зимовка.

Бородатая неясыть – Strix nebulosa (Forster, 1772). (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Бородатая неясыть встречается в лесной зоне северных и умеренных широт Евразии и Северной Америки (Рябицев, 2008). В Новосибирской области отмечается в северной и юго-восточной частях, малочисленный вид (Красная книга, 2008). Согласно МСОП,

численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Нами вид не отмечен. На территории памятника природы возможны встречи во время кочевок и зимовка.

Ушастая сова – *Asio otus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Болотная сова – *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Дятлообразные – Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae

Большой пёстрый дятел – *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной тайги и, отчасти, лесотундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Малый пёстрый дятел – *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной тайги и, отчасти, лесотундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Седой дятел – *Picus canus* (Gmelin, 1788). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от лесостепи до средней тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Жаворонковые – Alaudidae

Полевой жаворонок – *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север до южной тундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Трясогузковые – Motacillidae

Лесной конёк – *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён, в основном, в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белая трясогузка – *Motacilla alba* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие

опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Желтоголовая трясогузка – *Motacilla citreola* (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена крайне неравномерно в тундре, северной и южной тайге, лесостепи и степи (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Жёлтая трясогузка – *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Серый сорокопут – *Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Красный список МСОП – LC (вызывающий наименьшие опасения). В Западной Сибири серый сорокопут распространён от лесотундры до степной зоны, всюду редок или очень редок (Рябицев, 2008). Распространён по всей территории Новосибирской области, однако, численность везде низка, в последние десятилетия, по-видимому, сократилась (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Очень редкий вид (0,002 особи/га), предполагается гнездование. В целом местные условия благоприятны для обитания сорокопута.

Обыкновенный жулан – *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Иволговые – Oriolidae

Обыкновенная иволга – *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Скворцовые – Sturnidae

Обыкновенный скворец – *Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Сибири встречается до северной тайги (Рябицев, 2008). Встречен во время послегнездовых миграций, обычный вид. Гнездование маловероятно.

Семейство Врановые – Corvidae

Ворон – *Corvus corax* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность

мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории (Рябицев, 2008). Немногочисленный вид.

Серая ворона – *Corvus cornix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Грач – *Corvus frugilegus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север до лесотундры, но избегает сплошных лесных массивов (Рябицев, 2008). Обычный вид, отмечается во время послегнездовых кочёвок.

Галка – *Corvus monedula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до юга северной тайги, распределение неравномерное, более обычна вблизи населённых пунктов (Рябицев, 2008). Немногочисленный вид, отмечается во время послегнездовых кочёвок.

Сорока – *Pica pica* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Сойка – *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от островных лесов северной степи до юга северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Свиристелевые – Bombycillidae

Обыкновенный свиристель – *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири на гнездовании наиболее многочислен в лесотундровой зоне и северной тайге, в период кочёвок встречается по всей территории (Рябицев, 2008). Нами не встречен. На территории памятника природы встречается, видимо, на кочёвках, существует вероятность гнездования.

Семейство Славковые – Sylviidae

Камышевка-барсучок – *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Садовая камышевка – *Acrocephalus dumetorum* (Blyth, 1849). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий

наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до южных границ северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Индийская камышевка – *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до юга лесной зоны (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Славка-завирушка – *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до южной тундры (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Серая славка – *Sylvia communis* (Latham, 1787). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Пеночка-теньковка – *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Многочисленный гнездящийся вид.

Пеночка-весничка – *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от северной степи до тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Певчий сверчок – *Locustella certhiola* (Pallas, 1811). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается в лесной, лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Пятнистый сверчок – *Locustella lanceolata* (Temminck, 1840). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Серая мухоловка – *Muscicapa striata* (Pallas, 1764). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от северной степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Дроздовые – *Turdidae*

Обыкновенный соловей – *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от северной степи до южной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Варакушка – *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Рябинник – *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, кроме тундр и открытых степей (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Белобровик – *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, кроме арктических тундр и степей (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Черноголовый чекан – *Saxicola torquata* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от степей до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Луговой чекан – *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от степей до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Суторовые – *Paradoxornithidae*

Длиннохвостая синица – *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от северной степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Синицевые – *Paridae*

Большая синица – *Parus major* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Буроголовая гаичка – *Parus montanus* (Baldenstein, 1827). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий

наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Белая лазоревка – *Parus cyanus* (Pallas, 1770). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена в степной, лесостепной и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Лазоревка – *Parus caeruleus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на восток до Тюмени (Рябицев, 2008). Нами не отмечена. Встреча на территории памятника природы крайне маловероятна.

Семейство Воробьиные – Passeridae

Полевой воробей – *Passer montanus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, в меньшей степени, чем домовый воробей, связан с человеческими поселениями (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Домовый воробей – *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён по всей территории в населённых пунктах, обитает только рядом с человеческим жильём (Рябицев, 2008). Нами не отмечен. Пребывание на территории памятника природы крайне маловероятно.

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Зяблик – *Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от лесных островов в степи до лесотундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Вьюрок – *Fringilla montifringilla* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от лесных островов в тундре до лесостепи (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Черноголовый щегол – *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от севера степи до средней тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенная чечётка – *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN,

2012). В Западной Сибири распространена от южной части лесной зоны до тундры (Рябицев, 2008). Встречается только на кочёвках, обычна.

Обыкновенная чечевица – *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от степи до тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Урагус – *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён в степной, лесостепной и лесной зонах на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный снегирь – *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от южной части лесной зоны до южной тундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный кочующий вид, гнездование не отмечено.

Семейство Овсянковые – Emberizidae

Дубровник – *Emberiza aureolus* (Pallas, 1773). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – CE A2acd+3cd+4acd (вид, находящийся на грани полного исчезновения). В Западной Сибири дубровник распространён от северной тайги до северной части степной зоны (Рябицев, 2008). В Новосибирской области до конца 1980-х гг. был обычным и многочисленным видом, в 1990-2000-х гг. численность резко сократилась, как и в других районах Сибири (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). На территории памятника природы гнездятся единичные пары (0,001 пары/га), может отмечаться в период пролёта.

Полярная овсянка – *Schoeniclus pallasi* (Cabanis, 1851). Красный список МСОП – LC (вызывающий наименьшие опасения). В Западной Сибири распространена от тундры до северной тайги. Изолированный очаг гнездования расположен в северной части лесостепи (Рябицев, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). На территории памятника природы гнездятся единичные пары (0,002 особи/га).

Обыкновенная овсянка – *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степей до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белошапочная овсянка – *Emberiza leucosephala* (Gmelin, 1771). Согласно Красному списку МСОП вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от участков леса в степной зоне до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Камышовая овсянка – *Schoeniclus schoeniclus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Землеройкообразные – Soricomorpha

Семейство Землеройковые – Soricidae

Обыкновенная бурозубка – *Sorex araneus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обитатель различных ландшафтов от тундр до степей (Юдин, 1989). Многочисленный вид.

Средняя бурозубка – *Sorex caecutiens* (Linnaeus, 1788). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Предпочитает леса таёжного типа с хорошо развитым моховым покровом (Юдин, 1989). Нами не отмечена.

Малая бурозубка – *Sorex minutus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Кутора обыкновенная – *Neomys fodiens* (Pennant, 1771). Согласно Красному списку МСОП вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Наиболее обычна в лесной зоне. Заселяет берега водоёмов, предпочитая небольшие речки и ручьи (Юдин, 1989). Редкий вид.

Отряд Хищные – Carnivora

Семейство Собачьи – Canidae

Обыкновенная лисица – *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Семейство Куны – Mustelidae

Горностай – *Mustela erminea* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Ласка – *Mustela nivalis* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Колонок – *Mustela sibirica* (Pallas, 1773). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Степной хорь – *Mustela eversmanii* (Lesson, 1827). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Американская норка – *Neovison vison* (Schreber, 1777). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Акклиматизирована в СССР в 1920-50-хх гг., к настоящему времени широко распространилась, в том числе в лесной и лесостепной зонах (Бобров и др., 2008). Немногочисленный вид.

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Семейство Оленьи – Cervidae

Сибирская косуля – *Capreolus pygargus* (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Лось – *Alces alces* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). По сведениям, полученным от местных жителей, немногочисленный вид.

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha

Семейство Заячьи – Leporidae

Заяц-беляк – *Lepus timidus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Отряд Грызуны – Glires

Семейство Беличьи – Sciuridae

Обыкновенная белка – *Sciurus vulgaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Бурундук – *Tamias sibiricus* (Laxmann, 1769). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Семейство Мышовковые – Sicistidae

Лесная мышовка – *Sicista betulina* (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Семейство Мышиные – Muridae

Полевая мышь – *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Семейство Хомяковые – *Cricetidae*

Красно-серая полёвка – *Myodes rufocanus* (Sundevall, 1846). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Нами не отмечена.

Красная полёвка – *Myodes rutilus* (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Водяная полёвка – *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Обыкновенная полёвка – *Microtus arvalis* (Pallas, 1778). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Нами не отмечена.

Узкочерепная полёвка – *Microtus gregalis* (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Полёвка-экономка – *Microtus oeconomus* (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Многочисленный вид.

Ондатра – *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Акклиматизирована в России в 1920-60-х гг., широко распространена от степей до лесотундры (Бобров и др., 2008). Обычный вид.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

КЛАСС INSECTA – НАСЕКОМЫЕ

Отряд Collembola – Ногохвостки

Семейство Hypogastruridae – Гипогаструриды

Ceratophysella succinea (Gisin, 1949) – Африканский колючий богомол.

Hypogastrura ripperi (Gisin, 1952).

Hypogastrura vernalis (Carl, 1901) – Гипогаструра весенняя.

Семейство Isotomidae - Изотомиды

Desoria olivacea (Tullberg, 1871).

Isotoma viridis (Bourlet, 1839) – Изотома зеленая.

Proisotoma minima (Absolon, 1901) – Произотома малая.

Семейство Tomoceridae – Томоцериды

Tomocerus minutus (Tullberg, 1876).

Tomoceras vulgaris (Tullberg, 1871) – это разновидность коллембол с удлинённым телом.

Семейство Entomobryidae – Чешуйчатые подуры

Lepidocyrtus lignorum (Fabricius, 1793).

Willowsia buski (Lubbock, 1870) – Влажный коллембол.

Entomobrya lanuginosa (Nicolet, 1841).

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые (Бабочки)

Семейство Hesperidae – Толстоголовки

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – Толстоголовка Палемон.

Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829) – Толстоголовка желтая лесная.

Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – Толстоголовка запятая.

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) – Толстоголовка Морфей.

Muschampia tessellum (Hübner, 1803) – Толстоголовка мозаичная.

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) – Толстоголовка лесная.

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – Толстоголовка мальвовая.

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Толстоголовка тире.

Семейство Papilionidae – Парусники

Papilio machaon Linnaeus 1758 – Махаон.

Семейство Pieridae – Белянки

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – Зорька.

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Боярышница.

Colias chrysotheme (Esper 1781) – Золотистая желтушка.

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – Луговая желтушка.

Colias palaeno (Linnaeus, 1761) – Торфяная желтушка.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Лимонница.

Leptidea morsei (Fenton, 1882) – Восточная беляночка.

Leptidea amurensis (Ménétriés, 1859) – Беляночка амурская.

Leptidea reali (Reissinger, 1990) – Беляночка Реале.

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Горошковая беляночка.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – Капустница или белянка капустная.

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Брюквенница.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Репница.

Pontia callidice (Hübner, 1800) – Белянка каллидика.

Pontia edusa (Fabricius, 1777) – Белянка резедовая.

Семейство Nymphalidae – Нимфалиды

Aglaia io (Linnaeus, 1758) – Дневной павлиний глаз.

Aglaia urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница.

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Пестрокрыльница изменчивая.

Argynnis (Fabriciana) adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) – Перламутровка Адиппа.

Argynnis (Fabriciana) Niobe (Linnaeus, 1758) – Перламутровка Необа.

Argynnis (Mesoacidalia) aglaja (Linnaeus, 1758) – Перламутровка Аглая.

Argynnis raphia (Linnaeus, 1758) – Большая лесная перламутровка.

Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus, 1767) – Перламутровка Дия.

Boloria (Clossiana) Euphrosyne (Linnaeus, 1758) – Перламутровка Эфрозина.

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) – Перламутровка таволжанка.
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – Шашечница Матурна.
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – Перламутровка полевая.
Lasiommata deidamia (Eversmann, 1851) – Краеглазка дейдамия.
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – Ленточник тополевый.
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) – Шашечница Аталия.
Melitaea britomartis (Assmann, 1847) – Шашечница верониковая.
Melithea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) – шашечница Феба.
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – Пеструшка таволговая.
Neptis Sappho (Pallas, 1771) – Пеструшка Сапфо.
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – Траурница.
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) – Многоцветница.
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница с-белое.
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Репейница.

Семейство *Satyridae* – Бархатницы

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – Глазок цветочный
Chazara briseis (Linnaeus, 1764) – Бархатница Бризеида
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – Сенница луговая
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) – Сенница Геро
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Сенница обыкновенная
Coenonympha tullia (Muller, 1764) – Сенница туллия
Erebia aethiops (Esper, 1777) – Чернушка–эфиопка
Erebia ligea (Linnaeus, 1758) – Чернушка обыкновенная
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – Малая крупноглазка
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) – Краеглазка печальная
Lopinga achine (Scopoli, 1763) – Краеглазка придорожная
Melanagria russiae (Esper, 1783) – Пестроглазка русская
Minois dryas (Scopoli, 1763) – Дриада

Семейство *Lycaenidae* – Голубянки

Ahlbergia frivaldszkyi (Kindermann in Lederer, 1853) – Голубянка Фривальдского.

Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) – Голубянка Артаксеркс.
Aricia eumedon (Esper, 1780) – Голубянка Эвмедон.
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) – Малинница.
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) – Голубянка весенняя.
Cupido (Everes) alcetas (Hoffmannsegg, 1804) – Голубянка Альцет.
Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771) – Голубянка короткохвостая.
Cupido minimus (Fuessly, 1775) – Голубянка карликовая.
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) – Голубянка лесная.
Glaucopsyche lycormas (Butler, 1866) – Голубянка Ликорм.
Lycaena dispar (Haworth, 1802) – Червонец непарный.
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) – Червонец пятнистый.
Lycaena tityrus (Poda, 1761) – Многоглазка титир.
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) – Червонец огненный.
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) – Голубянка черноватая.

Plebejus Argus (Linnaeus, 1758) – Голубянка Аргус.

Polyommatus amandus (Schneider, 1792) – Голубянка приятная.

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – Голубянка икар.

Satyrus pruni (Linnaeus, 1758) – Хвостатка черемуховая.

Семейство Sphingidae – Бражники

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) – Липовый бражник.

Deilephilia porcellus (Linnaeus, 1758) – Винный бражник.

Семейство Geometridae – Пяденицы

Carsia sororiata sororiata (Hübner, 1813) – Пяденица болотная. Только в рьямах.

Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) – Большая зеленая пяденица.

Семейство Notodontidae – Хохлатки

Cerura (Apocerura) erminea (Esper, 1783) – Белая гарпия.

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) – Лунка серебристая.

Семейство Arctiidae – Медведицы

Arctia caja (Linnaeus, 1758) – Медведица кайя.

Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) – Медведица сетчатая.

Eilema complana (Linnaeus, 1758) – редкий лакей, моль из семейства Erebidae.

Eilema griseola (Hübner, 1803) – Лишайница сероватая.

Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) – Лишайница желтая.

Pelusia muscerda (Hufnagel, 1766) – Лишайница мышинная.

Pericallia matronula (Linnaeus 1758) – Медведица хозяйка.

Семейство Noctuidae – Совки

Acronicta (Triaena) psi (Linnaeus, 1758) – Стрельчатка пси.

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – Совка восклицательная.

Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) – Сока озимая.

Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) – Совка василистниковая.

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) – Голубая орденская лента.

Helotropha leucostigma (Hübner, 1808) – Совка касатиковая.

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – Металловидка капля.

Plusia festucae (Linnaeus, 1758) – Метловидка злаковая.

Tholera decimalis (Poda, 1761) – Совка плевельная белополосая.

Xanthia (Cirrha) icteritia (Hufnagel, 1766) – Совка золотистая малинная.

Семейство Lemoniidae – Желтые шелкопряды

Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermüller, 1775) – Коконопряд одуванчиковый.

Семейство Lasiocampidae – Коконопряды.

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) – Коконопряд травяной.

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) – Дубовый коконопряд.

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) – Малинный коконопряд.

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые (Жуки)

Семейство Carabidae – Жужелицы

Agonum (Agonothorax) sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – Быстрок шеститочечный.

Amara aenea (De Geer, 1774) – Тускляк бронзовый.

Calathus (Neocalathus) melanocephalus (Linnaeus 1758) – Моховик черноголовый.

Carabus (Megodontus) violaceus (Linnaeus, 1758) – Жужелица фиолетовая.

Carabus (Morphocarabus) regalis (Fischer von Waldheim, 1822) – Совка золотистая малинная.

Cylindera (Cylindera) germanica (Linnaeus, 1758) – Скакунчик германский.

Platynus assimile (Paykull, 1790) – Быстрок схожий.

Pterostichus (Argutor) vernalis (Panzer, 1796) – Птеростих весенний.

Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783) – Птеростих черный.

Семейство Tenebrionidae – Чернотелки

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) – Грибояд темный.

Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761) – Медляк песчаный.

Pedinus femoralis (Linnaeus, 1767) – Медляк кукурузный.

Tenebrio obscurus (Fabricius, 1792) – Хрущак темный.

Upis ceramboides (Linnaeus, 1758) – Чернотелка лесная.

Семейство Scarabaeidae – Хрущи

Cetonia (s.str.) aurata (Linnaeus, 1758) – Бронзовка золотистая.

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) – Навозник обыкновенный.

Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) – Западный майский хрущ.

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – Жук-носорог.

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – Бронзовка вонючая.

Protaetia (Eupotosia) affinis affinis (Andersch, 1797) – Бронзовка золотистая.

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) – Восковик перевязанный.

Семейство Coccinellidae – Божьи коровки

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – Коровка двуточечная.

Calvia (Anisocalvia) quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – Четырнадцатипятнистая коровка.

Coccinella hieroglyphica (Linnaeus, 1758) – Коровка узорчатая.

Coccinella magnifica (Redtenbacher, 1843) – редкая семиточечная божья коровка.

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) – Коровка семиточечная.

Hippodamia variegata (Goeze, 1777) – Коровка изменчивая.

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Четырнадцатиточечная коровка.

Semiadalia notata (Laicharting, 1781) – Семиадалия приметная.

Семейство Chrysomelidae – Листоеды

Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763) – Листояд ясноточный.

Chrysomela (Chrysomela) populi (Linnaeus 1758) – Краснокрылый тополёвый листояд.

Семейство Cerambycidae – Усачи

Lamia textor (Linnaeus, 1758) – Толстяк ивовый.

Leptura (Rutpela) maculata (Poda, 1761) – Лептура пятнистая.

Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) – Лептура зеленая.

Monochamus rosenmuelleri (Cederjelm, 1798) – Усач черный еловый.

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – Пахита четырехпятнистая.

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – Лептура бурая.

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) – Скрипун осиновый.

Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) – Лептура рыжая.

Семейство Elateridae – Щелкуны

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – Щелкун серый.

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) – Щелкун окаймленный.

Семейство Curculionidae – Долгоносики

Cleonis pigra (Scopoli, 1763) – Долгоносик чертополоховый.

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera

Семейство Aphidae – Пчелиные

Пчела-плотник – *Xylocopa valga* (Gerstaecker, 1872). (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красный список МСОП – LC. Редкий вид, встречаются единичные экземпляры.

Шмель армянский – *Bombus armeniacus* (Radoszkowski, 1877). (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – EN. Нами не отмечен. Встречи данного вида на территории памятника природы крайне маловероятна, поскольку он предпочитает обитать на участках настоящих степей и остепнённых опушках боров, данные местообитания на территории отсутствуют.

Bombus pascuorum (Scopoli 1763) (= *agrorum* (Fabricius 1787) – Шмель полевой.

Bombus serratatus (Morawitz, 1888) – Шмель пластинчатозубый.

Bombus hortorum (Linnaeus 1761) – Шмель садовый.

Семейство Formicidae – Муравьи

Camponotus (*Camponotus*) *herculeanus* (Linnaeus 1758) – Муравей древоточец-красногрудый.

Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) – Муравей блестящий.

Formica (*Raptiformica*) *sanguinea* (Latreille, 1798) – Муравей кровавый.

Formica (*Serviformica*) *fusca* (Linnaeus, 1758) – Муравей лесной бурый.

Formica rufa (Linnaeus, 1761) – Муравей лесной рыжий.

Lasius (*Cautolasius*) *flavus* (Fabricius, 1782) – Муравей земляной желтый.

Lasius niger (Linnaeus, 1758) – Муравей черный.

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) – Мирмика красная.

Семейство Diprionidae – Пилильщики гребнеусые

Diprion pini (Linnaeus, 1758) – Пилильщик сосновый.

Семейство Tenthredinidae – Пилильщики настоящие

Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758) – Пилильщик зеленый.

Tenthredo (*Eurogaster*) *mesomelas* (Linnaeus, 1758) – Пилильщик лесной.

Семейство Sphecidae – Роющие осы

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) – вид роющих ос рода Аммофила.

Семейство Crabronidae – Роющие осы

Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761) – вид песочных ос из подсемейства Bembicinae (триба Bembicini).

Crossocerus elongatulus (Vander Linden, 1829) – является перепончатокрылым изв песочной осе семьи.

Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758) – Крабронида мрачная.

Семейство Pompilidae – Дорожные осы

Anoplius (Arachnophroctonus) viaticus (Linnaeus, 1758) – Аноплий бурый, или помпил дорожный, или обыкновенная дорожная оса — вид дорожных ос.

Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771) – Батозонел ящеричный.

Семейство Chrysididae – Осы-блестянки

Holopyga atoenula (Dahlbom, 1845) – род ос-блестянок из подсемейства Chrysidinae (Elampini).

Chrysis ignita (Linnaeus, 1758) – Блестянка пламенно-красная.

Семейство Vespidae – Складчатокрылые осы

Vespa crabro (Linnaeus, 1758) – Шершень.

Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) – Оса обыкновенная.

Polistes nimpha (Christ, 1791) – Полист нимфа.

Отряд Diptera – Двукрылые (Мухи)

Семейство Culicidae – Кровососущие комары

Aedes cinereus (Meigen, 1818).

Anopheles (Anopheles) messeae (Falleroni, 1926) – вид кровососущих комаров из подсемейства малярийных.

Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi, 1890).

Culex pipiens (Linnaeus, 1758) – Подвальный комар.

Семейство Simuliidae – (Мошки)

Simulium vulgare (Dorogostaisky, Rubtsov & Vlasenko, 1935) – вид мелких двукрылых насекомых рода *Simulium* из семейства Мошки (Simuliidae).

Simulium transiens (Rubtsov, 1940).

Семейство Tabanidae – Слепни

Chrysops nigripes (Zetterstedt, 1838) – Златоглазик черноногий.

Chrysops pictus (Meigen, 1820) – Златоглазик украшенный.

Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758) – Дождевка обыкновенная.

Tabanus autumnalis (Linnaeus, 1761) – Слепень серый.

Tabanus bovinus (Linnaeus, 1758) – Слепень бычий.

Семейство Syrphidae – Журчалки (Цветочные мухи)

Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758) – Журчалка красивая.

Epistrophe diaphana (Zetterstedt, 1843).

Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) – Лесная пчеловидка.

Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805) – вид мух-журчалок из подсемейства Eristalinae.

Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758) – Меланостома меллина.

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) – Журчалка обыкновенная.

Volucella bombylans (Linnaeus, 1758) – Журчалка шмелевидная.

Семейство Asilidae – Ктыри

Dioctria atricapilla (Meigen, 1804) – Ктырь-ястребница.

Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758) – Ляфрия горбатая.

Machimus rusticus (Meigen, 1820) – род двукрылых насекомых из семейства ктырей.

Asilus crabroniformis (Linnaeus, 1758) – Морской хищник.

Семейство Ceratopogonidae – Мокрецы

Culicoides (Culicoides) pulicaris (Linnaeus, 1758) – Мокрец жгучий.

Culicoides (Culicoides) punctatus (Meigen, 1804).

Семейство Tipulidae – Комары долгоножки

Tipula (Tipula) paludosa (Meigen, 1830) – Вредная долгоножка.

Отряд Odonata – Стрекозы

Семейство Gomphidae – Дедки

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) – Дедка рогатый.

Семейство Corduliidae – Бабки

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) – Бабка блестящая.

Epithea bimaculata (Charpentier, 1825) – Эпитека двупятнистая.

Macromia amphigena (Selys, 1871) = *Macromia sibirica* (Djakonov, 1926) – Длинка сибирская.

Somatochlora alpestris (Selys, 1840) – Зеленотелка альпийская.

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) – Зеленотелка арктическая.

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) – Зеленотелка блестящая.

Семейство Aeschnidae – Коромысла

Aeshna crenata (Hagen, 1856) – Коромысло сибирское.

Aeshna mixta (Latreille, 1805) – Коромысло маленькое.

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) – Коромысло большое.

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) – Коромысло камышовое.

Aeshna serrata (Hagen, 1856) – Коромысло пильчатое.

Aeshna subarctica (Walker, 1908) – Коромысло северное.

Aeshna viridis (Eversmann, 1836) – Коромысло зеленое.

Семейство Lestidae – Лютки

Lestes dryas (Kirby, 1890) – Лютка дриада.

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) – Лютка свирепая.

Lestes virens (Charpentier, 1825) – Лютка осенняя.

Sympetma paedisca (Brauer, 1882) – Серолютка обыкновенная.

Семейство Calopterygidae – Красотки

Calopteryx splendens (Harris, 1782) – Красотка блестящая.

Семейство Libellulidae – Настоящие стрекозы

Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) – Стрекоза красная.

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – Плоскобрюх четырёхпятнистый.

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) – Стрекоза жёлтая.

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) – Стрекоза обыкновенная.

Семейство Coenagrionidae – Стрелки

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) – Стрелка вооруженная.

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) – Стрелка копьеносная.

Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894) – Стрелка Иогансона.

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) – Стрелка весенняя.

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) – Стрелка девушка.

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) – Стрелка изящная.

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) – Меняшка кубконосная.

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) – Тонкохвост изящный.

Отряд Orthoptera – Прямокрылые

Семейство Tettigoniidae – Кузнечики

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) – Зелёный кузнечик.

Tettigonia cantans (Fuessli, 1775) – Кузнечик певчий.

Семейство Acrididae – Саранчовые

Tetrix tenuicornis (Stahlberg, 1893) – Прыгунчик тонкоусый.

Arcyptera (Pararcyptera) microptera (Fischer de Waldheim, 1833).

Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) – Крестовая кобылка.

Отряд Dermaptera – Уховертки

Семейство Forficulidae – Уховертки

Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) – Уховертка обыкновенная.

Отряд Homoptera – Равнокрылые

Семейство Aphrophoridae – Пенницы

Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) – Пенница слюнявая.

Семейство Membracidae – Горбатки

Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758) – Горбатка обыкновенная.

Семейство Cicadellidae – Цикадки

Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) – Зелёная цикадка.

Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые

Семейство Gerridae – Гребляки

Corixa dentipes (Thomson, 1869) – Гребляк зубчатоногий.

Семейство Naucoridae – Плавты

Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) – Плавт обыкновенный.

Семейство Notonectidae – Гладыши

Notonecta (Notonecta) glauca (Linnaeus, 1758) – Гладыш обыкновенный.

Семейство Miridae – Слепняки

Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767).

Closterotomus bicalvatus (Herrich-Schäffer, 1835).

Семейство Lygaeidae – Земляные клопы

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) – Лигей пятнистый.

Семейство Coreidae – Ромбовики

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) – Краевик окаймлённый.

Семейство Pentatomidae – Щитники

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) – Щитник линейчатый.

Aelia klugii (Hahn, 1833) – Остроголовый клоп.

Aelia sibirica (Reuter, 1884).

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) – Щитник ягодный.

Eurydema (Eurydema) oleracea (Linnaeus, 1758) – Клоп рапсовый.

Palomena prasina (Linnaeus, 1761) – Щитник зелёный древесный.

Семейство Scutelleridae – Черепашки

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) – Маврская черепашка.

Семейство Reduviidae – Хищнецы

Reduvius personatus (Linnaeus, 1758) – Грязный хищнец, или ряженный хищнец, или редувий ряженный.

Семейство Gerridae – Водомерки

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) – Водомерка прудовая.

Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые**Семейство Chrysopidae – Златоглазки**

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) – Златоглазка перламутровая.

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира**

№ п/п	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
	Растения				
1.	Лук красноватый	<i>Allium rubens</i> Schrad. Ex Willd.	4 (I)	-	-
2.	Венерин башмачок настоящий	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	3 (R)	3 (R)	LC
3.	Венерин башмачок крупноцветковый	<i>Cypripedium macranthon</i> Sw.	3 (R)	3 (R)	-
4.	Гвоздика широковетвистая	<i>Dianthus ramosissimus</i> Pall. Ex Poir.	3 (R)	-	-
5.	Манник складчатый	<i>Glyceria plicata</i> (Fries) Fries	0 (Ex)	-	-
6.	Ятрышник шлемоносный	<i>Orhis militaris</i> L.	3 (R)	3 (R)	-
7.	Лютик укореняющийся	<i>Ranununculus radicans</i> C.A. Mey.	2 (V)	-	-
8.	Осот болотный	<i>Sonchus palustris</i> L.	3 (R)	-	LC
9.	Звездчатка ланцетовидная	<i>Stellaria holostea</i> L.	3 (R)	-	-
10.	Гребенщик рыхлый	<i>Tamarix laxa</i> Willd.	3 (R)	-	-
	Животные				
11.	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-
12.	Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	3	2	VU A2abce+3 bce+4abce
13.	Гуменник	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	3	2	-
14.	Пискулька	<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	2	2	VU A2bcd+3b cd+4bcd
15.	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789)	3	-	-

№ n/n	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
16.	Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	3	-	-
17.	Скопа	<i>Pandion haliaëtus</i> (Linnaeus, 1758)	3	3	-
18.	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	3	2	VU C2a(ii)
19.	Беркут	<i>Aquila chrysaëtus</i> (Linnaeus, 1758)	2	3	-
20.	Орлан-белохвост	<i>Haliaëetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	2	5	LR/nt
21.	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
22.	Дербник	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	-
23.	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	3	3	NT
24.	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i> (Linnaeus, 1758)	2	2	-
25.	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	2	-	NT
26.	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-
27.	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaëtus</i> (Pallas, 1773)	2	5	LC
28.	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i> (Pallas, 1771)	4	-	-
29.	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i> (J.R. Forster, 1772)	3	-	-
30.	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
31.	Дубровник	<i>Emberiza aureola</i> (Pallas, 1773)	2	2	CE A2acd+3c d+4acd
32.	Пчела-плотник	<i>Xylocopa valga</i> (Gerstaecker, 1872)	3	-	LC
33.	Шмель армянский	<i>Bombus armeniacus</i> (Radoszkowski, 1877)	3	2	EN